

أقرأ هذه النشرة الدوائية بعناية قبل أن تبدأ في تناول جانيوميت وفي كل مرة تكرره، ربما كانت تحتوي على معلومات جديدة. إن تفقك هذه المعلومات عن الحاجة إلى التحدث مع طبيبك عن حالتك الحالية أو علاجك، إذا كانت لديك أية أسئلة عن جانيوميت، فاسأل الطبيب أو الصيدلي.

ما أهم المعلومات التي يجب أن أعرفها عن جانيوميت؟

١. **الحمض اللبني، من المحتمل أن ينشأ الميكوريزم - أحد المواد الدوائية في جانيوميت، - بحالة نادرة ولكن خطيرة ومميتة أحياناً تُسمى الحمض اللبني (أو ترم حمض اللاكتيك في الدم)، والحمض اللبني حالة طبية خطيرة يجب علاجها في المستشفى.** يجب عليك الاتصال بالطبيب على الفور إذا كنت تشعر في أي من الأعراض التالية التي تدل على احتمال الإصابة بالحمض اللبني، إذا كنت:

- تشعر بالبرودة على مستوى الذراعين والساقين.
- تشعر بالدوار أو الدوخة.
- تعاني من تقلبات أو عدم انتظام ضربات القلب.
- تعاني من ضعف أو التعب الشديد.
- تعاني من ألم غير اعتيادي (غير طبيعي) في العضلات.
- تعاني من صعوبة في التنفس.
- تعاني من غثاس أو بخراس شديد.
- تعاني من الألم في البطن أو عنقان أو في..

معظم الأشخاص الذين أُصيبوا بالحمض اللبني بعد استعمال الميكوريزم كانوا يعانون من حالات أخرى تسببت مع الميكوريزم بالحمض اللبني، أُخبر طبيبك في حال كنت مصاباً بأي من الحالات التالية لأنك أكثر عرضة للإصابة بالحمض اللبني عند استعمال جانيوميت في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من مشكلات حادة في الكلى أو تكررت لكلى لديك بعض الإجراءات بالأمعة السنية التي تعطلت حفاك بمدة ملونة.
- إذا كنت تعاني من مشكلات في الكلى.
- إذا كنت تتناول في شارب الكحول بصورة منتظمة أو منتظمة.
- إذا كنت تعاني من أمراض الكلى الحادة أو ضعف الكلى.
- إذا كنت تتناول في شارب الكحول بصورة منتظمة أو منتظمة.
- إذا كنت تعاني من أمراض الكلى الحادة أو ضعف الكلى.
- إذا كنت تتناول في شارب الكحول بصورة منتظمة أو منتظمة.
- إذا كنت تتناول في شارب الكحول بصورة منتظمة أو منتظمة.

أفضل وسيلة لتوفيرية من الإصابة بالحمض اللبني بسبب الميكوريزم تُعتمد بخارج طبيبك في حال كنت تعاني من أية مشكلة من المشكلات المدرجة أعلاه من المحتمل أن يقرر طبيبك التوقف عن إعطائك جانيوميت لفترة من الوقت في حال كنت مصاباً بأي من تلك الحالات.

يمكن لجانيوميت أن يتسبب بغير تلك من الآثار الجانبية الخطيرة، أُنظر لفقرة بعنوان "ما هي الآثار الجانبية الممكنة لجانيوميت؟".

٢. **التهاب البنكرياس** الذي يُحتمل أن يكون شديداً ويؤدي إلى الوفاة. هناك مشكلات طبية مميتة تحدث أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس:

- التهاب البنكرياس
- حمضات في المرارة (حمضات صفراوية)
- تاريخ من الامتلاء على الكبد
- ارتفاع لاثلي الغلبيريدي في الدم

توقف عن تناول جانيوميت واتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من ألم شديد ولا يزول في منطقة المعدة (البطن). ربما تشعر بالألم يأتي من البطن باتجاه الظهر أو في عنق أو في البطن. وهي أعراض تشير إلى احتمال الإصابة بالتهاب البنكرياس.

٣. **قصور القلب، قصور القلب، بطين في ذلك لا يوضح الدم جيداً بما فيه الكفاية.**

- تورم وتضيق كحظف أو أصابعية في القدمين، خاصةً عند كنت في وضعية المشي.
- تورم أو انتفاخ الموالد، خاصةً في القدمين أو الكاحلين أو الساقين.
- زيادة الوزن بسرعة غير اعتيادية.
- قبك غير اعتيادي.
- هذه الأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بقصور في القلب.

ما هو جانيوميت؟

- جانيوميت عبارة عن دواء يؤخذ بوصفة طبية، ويحتوي على دوائين يتم وصفهما لمرض السكري هما سيتاجليبين (جانيوميت[®]) وميتفورمين. يمكن استخدام جانيوميت إلى جانب الأدوية الغذائية والتغذية لتقليل السكر في الدم عند اتباعين المتخصصين بمرض السكري من النوع الثاني.
- جانيوميت ليس للأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الأول.
- جانيوميت ليس للأشخاص المصابين بالحمض الكيتوني السكري (زيادة الكيتونات في الدم أو البول).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس في الماضي، فليس من المعروف إذا كانت عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس أثناء تناول جانيوميت أو لا.
- ومن غير المعروف إذا كان جانيوميت آمناً وفقاً لاستخدامه للأشخاص الذين تتل أصغرهم من ١٨ عاماً.

من الذي يجب ألا يتناول جانيوميت؟
لا تتناول جانيوميت إذا:

- كنت تعاني من مشكلات حادة في الكلى.
- كنت تعاني من حساسية لأي من مكونات جانيوميت. انظر نهاية هذه النشرة الدوائية للاطلاع على القائمة الكاملة لمكونات جانيوميت.
- يمكن لأعراض الحساسية الخطيرة تجاه جانيوميت أن تشمل الطفح الجلدي، بقر حمراء ناتئة عن سطح الجلد (شرى) أو تورم الوجه واللسان والحنك الذي قد يسبب صعوبة في التنفس أو البلع
- كنت مصاباً بالحمض الكيتوني السكري. انظر لفقرة بعنوان "ما هو جانيوميت؟".

ما المعلومات التي يجب إبلاغها لطبيب قبل تناول جانيوميت؟

قبل أن تتناول جانيوميت، أخبر طبيبك إذا كنت:

- تعاني أو عانيت من التهاب البنكرياس.
- تعاني من مشكلات حادة في الكلى.
- تعاني من مشكلات في الكلى.
- تشعر في شرب الكحول بصورة منتظمة أو متقطعة.
- إذا كان سيتم حقنك بصبغة أو مادة ملونة لإجراء أشعة سينية، ربما سيكون عليك التوقف عن استخدام جانيوميت لفترة قصيرة. أسأل الطبيب عن الوقت المناسب للتوقف عن تناول جانيوميت والوقت المناسب لمعاداة استخدامه. انظر لفقرة بعنوان "ما أهم المعلومات التي يجب أن أعرفها عن جانيوميت؟".

تعاين من أي حالات طبية أخرى.

مضاد أو تطعيمات أو لقاحات أو أي دواء أخرى.

مضاد أو تطعيمات أو لقاحات أو أي دواء أخرى.

مضاد أو تطعيمات أو لقاحات أو أي دواء أخرى.

مضاد أو تطعيمات أو لقاحات أو أي دواء أخرى.

مضاد أو تطعيمات أو لقاحات أو أي دواء أخرى.

مضاد أو تطعيمات أو لقاحات أو أي دواء أخرى.

مضاد أو تطعيمات أو لقاحات أو أي دواء أخرى.

ما هي الآثار الجانبية الممكنة لجانيوميت؟

ظهرت آثار جانبية خطيرة عند الأشخاص الذين يتناولون جانيوميت من أيًا من المكونات الدوائية التي يحتوي عليها جانيوميت. تظهر آثار خطيرة في دم. إذا كنت تتناول جانيوميت مع دواء آخر يمكن أن يسبب انخفاض السكر في الدم، يزيد احتمال إصابته بانخفاض السكر في الدم. إذا كنت تتناول جانيوميت مع دواء آخر يمكن أن يسبب انخفاض السكر في الدم، يزيد احتمال إصابته بانخفاض السكر في الدم. إذا كنت تتناول جانيوميت مع دواء آخر يمكن أن يسبب انخفاض السكر في الدم، يزيد احتمال إصابته بانخفاض السكر في الدم.

الوخة
التعرق
الضعف
التعب
الجوع
الإثنيك
الصلبية

تفاعلات حساسية خطيرة: إذا بدأت طبع أعراض الحساسية الخطيرة، توقف عن تناول جانيوميت واتصل بطبيبك فوراً. انظر لفقرة بعنوان "من الذي يجب ألا يتناول جانيوميت؟". من المحتمل أن يعطيك طبيبك دواءً لعلاج تفاعلات الحساسية ويصف لك دواءً آخر لعلاج السكري.

مشكلات في الكلى، في تحتاج أحياناً إلى تعديل كلى.
الم في المعامل، يمكن لبعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية تدعى مثبطات إنزيم البيبتيد ثنائي البنيد الريع (DPP-4 inhibitors)، أحد الأدوية الموجودة في جانيوميت، أن يصابوا بالأم حادة أحياناً في المعامل، اتصل بطبيبك على الفور إذا شعرت بالأم حادة في المعامل.

تفاعل جلدي. يمكن لبعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية تدعى مثبطات إنزيم البيبتيد ثنائي البنيد الريع (DPP-4 inhibitors)، أحد الأدوية الموجودة في جانيوميت، أن يصابوا بتفاعل جلدي يدعى الفقاع الفقاعي، وهي حالة يحتمل أن تستدعي العلاج في المستشفى. اتصل بطبيبك على الفور إذا ظهرت عليك تورم أو تآكلت البشرة الخارجية من الحظف. إن كنت مصاباً بالمرض فاسأل طبيبك على الفور إذا كنت تتناول جانيوميت.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لجانيوميت تشمل:

- آسداد أو سيلان الأنف والتهاب الحلق
- عوزي الجهاز التنفسي العلوي
- نقص سكر الدم عند استخدام جانيوميت بالتزامن مع أدوية معينة مثل السلفونيل يوريا أو الأسولين.
- الغزوات، اضطراب المعدة، عسر الهضم
- الضعف
- الطفيل والقيء
- الصداع
- الإسهال

ان تناول جانيوميت مع الأكل يمكن أن يساعد في تقليل من الآثار الجانبية الشائعة للميكوريزم على المعدة والتحدث مع طبيبك. تحدث مع طبيبك. اضطرر أثناء المدة التي تبدأ في وقت لاحق أثناء العلاج. ربما تتل على مشاكل أكثر خطورة.

من المحتمل أن تكون الجانيوميت أنه أقل جاذبة أخرى، بما فيها كوزم البدين أو المسالين. يمكن أن يحدث تورم البدين أو المسالين إذا كنت تتناول جانيوميت في جيبز رويجيتازون (Avandia). مشاعر زور وميليزون نوع آخر من أدوية السكري.

ان الآثار الجانبية أعلاه ليست جميع الآثار الجانبية المحتملة لجانيوميت، للحصول على مزيد من المعلومات، اسأل طبيبك أو الصيدلي. أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية تزعجك أو غير اعتيادية أو لا تزال.

كيفية حفظ جانيوميت؟

يحفظ جانيوميت في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٠ درجة مئوية.

يحفظ جانيوميت وجميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

معلومات عامة عن استخدام جانيوميت

توصف الأدوية أحياناً لأشخاص مختلفة عن تلك المتكورة في النشرة الدوائية. لا تستخدم جانيوميت لحالة لم يوصف من أجهزها. لا تعط جانيوميت لأشخاص آخرين حتى إن كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعان منها، فقد لا يضرهم.

نفس النشرة الدوائية ملخص لأهم المعلومات عن جانيوميت. إذا أردت أن تعرف المزيد من المعلومات عن جانيوميت، تحدث مع طبيبك.

ما هي مكونات جانيوميت؟

المواد الفعالة: سيتاجليبين وميتفورمين.
المواد غير الفعالة: بولي فينيل بيروليدين، ثوريل، سلفات الصوديوم، فوسفات ستيريل الصوديوم.
يحتوي شماغ القرص على المواد غير الفعالة التالية: بولي فينيل الكحول، بولي إيثيلين جليكول، تلك، ثاني أكسيد التيتانيوم، أكسيد الحديد الأحمر وأكسيد الحديد الأسود.

ما هو مرض السكري من النوع الثاني؟

مرض السكري من النوع الثاني هو حالة مرضية حيث لا يُنتج مقداراً كافياً من الأنسولين، ولا يعمل الأنسولين الذي ينتجه الجسم على النحو المتعود. يمكن أيضاً أن يقوم بتنتاج مقدار كبير جداً من السكر في تلك الحالة يترافق السكر (الجلوكوز) في الدم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلات طبية خطيرة.

كيفية يتم تزويد جانيوميت؟

يتم تزويد جانيوميت ٥٠ ملجم و ٥٠٠ ملجم و ١٠٠٠ ملجم على شكل كروتونة تحتوي على علامة أثرطمة يحتوي كل منها على سبع حبات. لرشد بالضرورة أن تكون جميع العبوات موقوفة.

لرشد المالكه لحقن التسويق:

- مورك شارب و دوم كورس،
- وان مورك دوليف، من صرب ١٠٠٠، وايت هوس ستائن،
- ١٨ صوبه ريكو، ٠١٧٤.
- الولايات المتحدة الأمريكية

الرشد المنصنة:

باتيون بروتو ريكو
سبوت رود ٢٠٧ كم
بوتون ريكو، ٠١٧٤

الرشد المصدرة للتشاهلة:

مورك شارب و دوم بي، في حلزايك، جولندا

تاريخ أخر مراجعة لهذه النشرة: ٢٠١٧ / ٨

- الدواء مستحضر يواثر على صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات يعرفك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالذواء ونفعه وضرره
- لا تفتح عند العلاج المحظ لك من تقاء نفسك
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية

لا تكرر الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
الحداد الصيدلانية العرب

مجلس وزراء الصحة العرب
الحداد الصيدلانية العرب