

حالفس

- اتبع الوصفة الطيبة بدقة وطوري
- الاستخدام وتعليمات الصيدلي الـ  
باعك الدـّواء.
- الطبيب والصيدلي هما خبريان  
الأدوية وفوائدها ومخاطرها
- لا تقطع فترة العلاج الموصوفة لك  
تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة الطيبة
- استشارة الطبيب.

احفظ بجميع الأدوية بعيداً  
عن متناول الأطفال

## مجلس وزراء الصحة العرب

المكونات الأخرى لاكتوز، سليلوز دقيق البَلُور، نشا الصوديوم (النوع "أً")، الماغنسيوم.

التوافر / أحجام العبوات لا يتم توافرها إلا في الصيدليات وصفة الطبيب.

أقراص 50 مجم: 28، 112. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

جهة التَّصْنِيع

فتوacial مع ص بك. ينطبق ص على الآثار هذه النَّشرة.

اريـخ الصـلاحـيـة عـبـوة.

نـفـاـل.

يُخزن في درجة مئوية.

الصيادي الخاص  
ضافية، فلديهما  
إلى المعلومات

شركة نوفارتس فارما إيه ج  
سويسرا

هذا منتج دولي؟  
- الدواء منتج يُؤثر على صحتك  
على نحو مخالف للتعليمات  
للخطر.

إذا لاحظت أية آثار طبيعك أو الصيدلاني ذلك أيضًا بشكل الجانبي غير المدرج معلومات إضافية لا يستخدم بعد انتهاء (EXP=) المطبوع على الفور إذا عانيت من حساسية بالعضلات أو امراض. وذلك لأنه في حالات مشاكل العضلات خطيرة، حلل العضلات (انحلال ي قد يسبب تلفًا بالباليوكون خطر تحلل العضلات اتس) أعلى في المرضي من تعليمات التخزين يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال

وحمایته من الرطوب  
حرارة تتعدي 30 در  
معلومات اضافية

غثيان أو فوهات في المعدة، أو انتفاخ البطن بالغازات.  
ألم شديد وانتفاخ في البطن، إسهال، انتفاخ البطن بالغازات.  
العلاج فوري، إدخال المريض إلى المستشفى.  
اتصل بطبيبي.  
ألم بالعضلات، ضعف بالعضلات.  
نادرة، قد تحدث نادرة، قد تحدث من ضمنها.  
الربيعيات، ثم الوفاة.  
(انحلال الرئتين).

فأكتر) وأول  
من مشاء  
الذين يعا  
الدرقية وإما  
 يول للجيتوتسين (دواء يستخدم  
 ضغط الدم)، إلى صعوبات في  
 س والبلع، وتورُّم الوجه أو الذراعين  
 العقين أو العينين أو الشفتين أو اللسان.

طويل الأمد. من المهم إجراء الفحوصات المنتظمة مع طبيبك؛ للتأكد من تحقيق العلاج للتأثير المغوب.

لا تُوقف العلاج بعقار جالفس إلا إذا طلب طبيبك منك ذلك.

إذا أغفلت تناول أحد الأقراص، فتناوله بمجرد أن تذكر، ثم تناول القرص التالي في اليوم التالي في الوقت المعتاد له.

لا تغير الجرعة الموصوفة من تلقاء نفسك.

إذا شعرت أن تأثير دوائرك أقوى من اللازم أو أقل من اللازم، فتحدد إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

الآثار الجانبية المحتملة قد تحدث الآثار الجانبية التالية عند تناول عقار جالفس:

شائعة (تأثير على مستخدم واحد إلى 10 مستخدمين من بين كل 100 مستخدم) دوحة، ارتجاف، غثيان، قشعريرة، حموضة (حرقة الفؤاد)، صداع، انخفاض مستوى السكر بالدم (نقص سكر الدم)، ضعف، تعرق شديد.

غير شائعة (تأثير على مستخدم واحد إلى 10 مستخدمين من بين كل 1000 مستخدم):

تناول عقار جالفس خلالها أثناء اليوم  
وكم عدد الأقراس التي عليك تناولها من  
عقار جالفس.  
في حال كان عقار جالفس هو الدواء  
الوحيد الذي تتناوله لعلاج مرض السكري  
من النوع 2، تبلغ الجرعة الموصى بها  
من عقار جالفس حينها قرصاً واحداً مرة  
واحدة أو مرتين يومياً.  
في حال تعين عليك أن تتناول أيضاً دواء  
يحتوي على المادة الفعالة ميتغورمين،  
تبلغ الجرعة الموصى بها من عقار جالفس  
حينها قرصاً واحداً مرتين يومياً.

التي تقلل مستويات السكر في الدم، تبلغ  
الجرعة الموصى بها من عقار جالفس  
حيث أنها فرصة واحدة أو مرتين  
وإذا حصل يومياً.

يجب عدم تجاوز الجرعة اليومية القصوى  
التي قدرها قرص واحد مرتين يومياً.  
لم يُحرّب استخدام عقار جالفس وأمانه في  
الأطفال والمرأة فين (الأطفال الذين تقل  
أعمارهم عن 18 عاماً); وعليه ينبغي ألا  
يتناول الأطفال والمرأة حقوقون عقار جالفس.  
يجب بلع الأقراص مع كوب من الماء.  
يمكن تناولها مع الطعام أو دونه.  
تناول عقار جالفس كل يوم طوال المدة  
التي وصفها طبيك. قد يكون العلاج

تحتوي أقراص عقار جالفس ع من 1 ملي مول (23 مجم) من بكل قرص، مما يجعلها "خال الصوديوم" تقريرًا.

آخر طبيبك أو الصيدلي الخام الحالات الآتية:

- إذا كنت تعاني من آية أمراض أخرى
- إذا كنت تعاني من آية حساسية
- إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى في ذلك الأدوية التي تحصل على وصفة طيبة).

في الدم (نقص جرعتك منهم من التهاب يتناولون عقار مرض اس هو مرض للحياة. توقف واستشر طبيبك مستمر بالبطن بقى؛ إذ قد البنكرياس.

عانيت من آلام

الحمل والرضاعة الطبيعية  
حالات نادرة، قد  
تليّرها، من ضمنها  
أسباب تلّف بالكلى.  
أثبتت حاملاً أثداء العلاج  
أثبتت حاملاً أثداء العلاج  
أثبتت حاملاً أثداء العلاج  
أثبتت حاملاً أثداء العلاج

- إلإ بـإذن صريح من طبيـك.
- الرضاعـة الطبيعـية
  - من غـير المـعـرـوفـ ما إذا كانت في
  - وهي المـادـة الفـعـالـة بـعـقـارـ جـالـفـسـ إـلـا بـعـدـ
  - إـلـىـ لـبـنـ الـأـمـ أـمـ لاـ يـجـبـ أـلـاـ تـتـناـولـ
  - جـالـفـسـ إـذـ كـنـتـ مـرـضـعـاـ.
- كـيـفـيـةـ تـناـولـ عـقـارـ جـالـفـسـ
  - سـيـخـرـكـ طـبـيـكـ بـالـأـوـقـاتـ التـ
- الـلـلاـكـتوـزـ يـرـجـىـ جـالـفـسـ إـلـاـ بـعـدـ
- مـعـرـفـاـ أـنـكـ لـاـ يـتـناـولـ
- جـبـ أـلـاـ يـتـناـولـ
- نـ مـشـاكـلـ وـرـاثـيـةـ
- لـ الـجـالـاـكـتوـزـ أـوـ
- مـاسـ اـصـلـ الـجـلـوكـوزـ
- الـفـسـنـ.

انخفاض مستوى السكر في الدم). سيقلل طعاماً إذا اقتضى الأمر.

تم الإبلاغ عن حدوث البينكرياس في المرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس. خطير وربما يكون مملاً عن تناول عقار جالفالج. إذا تعرضت لألم شديد، مصحوب أو غير مصحوب، تكون تعاني من التهاب البنكرياس إذا كنت تعاني من

العلاج الطبي فقط. اتباع نظامك الغذائي المعتاد، بما يكفي. لذا يمكن أن يكون العلاج طبيعياً أو الشخص يعاني من مرض السكري في حالات معينة.

<p>بالعطلات لا يمرر لها.</p>	<p>الطلات ف يجب ألا تمارس القيادة ت. ت.</p>
<p> تكون مشاكل العطلات تحل العطلات الذي قد يزداد الخطير في حال</p>	

من عقار جالفس إذا كنت  
لديهم وظائف الكلى غيري  
يحتوي هذا الدواء على  
عدم تناول أقراص عن  
محادثة طيبك إذا  
تتحمل سكريات معينة  
الأشخاص الذين يعانون  
نادرة تخص عدم ت  
نقص الالكتاز أو سوء  
الحالات توز أقراص عق

نظام غذائي وممارسة التمارين  
ما. يحتوي العقار على المادة  
ة فيلاجليبتين التي تقلل مستويات  
تر في الدم.

ما تكون مصاباً بمرض السُّكَّري من  
2، لا ينتج جسمك كمية كافية من  
ولين وأو ينتج كمية أكثر مما يجب  
الجلوكاجون. كما قد يكون تأثير  
ولين الذي ينتجه جسمك منخفضاً.

ولين مادة (يفرزها البنكرياس) تساعد  
ض مستوى السُّكَّر بالدم، لا سيما  
الوجبات. الجلوکاجون هي مادة

علم بها  
لا يعتمد  
السكر في الدم  
من المهم  
وممارسة التمارين  
يجب اتباع  
الاستشاري  
هذا الشأن

لا تتناول عقلاً  
لا تتناول عقلاً

بر؛ مما يزيد من مستويات السُّكُر  
يحفز عقار جالفس البنكرياس على  
الأنسولين ويقلل إفراز الجلوکاجون.