

Doliprane[®] 500 mg

PARACÉTAMOL

 Boîte de 16 comprimés à avaler
Adulte et enfant à partir de 27 kg

SANOFI 

Doliprane appartient à la famille des **antalgiques** (contre la douleur) et des **antipyrétiques** (contre la fièvre).

Doliprane contient du paracétamol (principe actif).

Doliprane soulage des douleurs d'intensité légère ou modérée et fait baisser la fièvre.

AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 500 mg

Indications

Prenez Doliprane en cas de fièvre ou douleurs telles que :

- maux de tête,
- états grippaux, courbatures,
- douleurs dentaires,
- règles douloureuses.

Contre-indications

Ne prenez jamais Doliprane en cas de :

- Allergie au paracétamol ou à l'un des autres composants (voir « Composition »).
- Maladie grave du foie.
- Allergie au blé. Cependant, Doliprane peut être pris en cas de maladie cœliaque car l'amidon de blé peut contenir du gluten mais seulement à l'état de trace.
- Enfant de moins de 6 ans (risque de fausse route et d'étouffement).

Précautions d'emploi

Consultez votre médecin

avant de prendre Doliprane :

- Si vous faites partie des patients pour lesquels la dose maximale de paracétamol est de 3 g/jour (voir « Dose maximale chez l'adulte »).
- en cas d'intolérance à certains sucres (maladies héréditaires rares).

Composition

Paracétamol, lactose (sucre se décomposant en galactose et en fructose), amidon de blé, amidon pré-gélatinisé, talc, carboxyméthylamidon, stéarate de magnésium.

Interactions

Consultez votre médecin, si vous prenez déjà un anticoagulant par voie orale. La prise de Doliprane aux doses maximales (4g/jour) pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée de l'INR.

Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol afin de ne pas dépasser la dose recommandée de paracétamol par jour.

Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments.

Grossesse / Allaitement

Vous pouvez utiliser Doliprane pendant la grossesse ou l'allaitement dans les conditions normales d'utilisation.

POUR BIEN PRENDRE DOLIPRANE 500 mg

Indications

Posologie

Présentation réservée à l'adulte et à l'enfant à **partir de 27 kg**. Pour les enfants de moins de 27 kg, il existe d'autres présentations dont le dosage est plus adapté.

Poids	Nombre de comprimés par prise	Délai minimum entre 2 prises	Nombre maxi de comprimés par jour
27 à 40 kg environ 8 à 13 ans	1	6 h	4
41 à 50 kg environ 12 à 15 ans	1	4 h	6
+ de 50 kg à partir de 15 ans environ	1 à 2 selon l'intensité de la douleur	4 h <hr/> 8 h en cas de maladie des reins	6 8 comprimés si douleur plus intense et seulement après avis de votre médecin

Doliprane contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent aussi, seul ou en association avec d'autres substances. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser la dose recommandée de paracétamol par jour.

Dose maximale chez l'adulte :
Ne jamais prendre plus de 8 comprimés par jour (soit 4 g de paracétamol).

Ne jamais prendre plus de 6 comprimés par jour (soit 3 g de paracétamol) en cas de :

- poids inférieur à 50 kg (voir tableau)
- maladie du foie ou maladie grave des reins
- consommation abusive et répétée d'alcool, ou arrêt récent
- déshydratation
- malnutrition chronique, période de jeûne,

amaigrissement récent, âge supérieur à 75 ans, ou supérieur à 65 ans avec une maladie de longue durée, SIDA, hépatite virale chronique, mucoviscidose, maladie de Gilbert.

Durée de traitement

Ne continuez pas le traitement sans l'avis de votre médecin si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'aggravation.

Mode d'emploi

Avalez le comprimé avec une boisson (eau, lait, jus de fruit).

Renouvellement : pour éviter que la douleur ou la fièvre ne revienne, vous devez prendre vos comprimés régulièrement y compris la nuit en respectant l'intervalle entre 2 prises.

Oubli : si vous avez oublié de prendre une dose, ne prenez pas de double dose pour compenser.

Surdosage

En cas d'ingestion d'une quantité supérieure à la dose recommandée de Doliprane, consultez immédiatement les urgences.

Le surdosage en paracétamol peut être à l'origine d'atteintes du foie, du cerveau, du pancréas, du rein ainsi que d'un coma et peut entraîner le décès, notamment chez les jeunes enfants et les patients décrits en « Dose maximale chez l'adulte » pour lesquels la dose maximale est de 3 g/jour.

Dans les 24 premières heures, les principaux signes sont : nausées, vomissements, perte d'appétit, douleurs abdominales, pâleur.

TOUT AU LONG DU TRAITEMENT

Effets indésirables

RAREMENT RÉACTION ALLERGIQUE

Boutons et/ou rougeurs sur la peau, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer (oedème de Quincke), malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique). Dans ces cas, arrêtez immédiatement le traitement et consultez rapidement votre médecin ou les urgences.

Ne prenez plus jamais de médicament contenant du paracétamol.

TRÈS RAREMENT EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES CUTANÉS.

EXCEPTIONNELLEMENT

Diminution du nombre de certaines cellules du sang : globules blancs, plaquettes avec saignement possible du nez ou des gencives. Dans ces cas, consultez votre médecin.

FRÉQUENCE NON CONNUE

Troubles du fonctionnement du foie qui peuvent être plus importants chez les patients décrits en « Dose maximale chez l'adulte » pour lesquels la dose maximale est de 3 g/jour.

Diminution importante de certains globules blancs pouvant provoquer des infections graves (agranulocytose), éruption cutanée en plaques rouges arrondies avec démangeaison et sensation de brûlure, laissant des taches colorées et pouvant apparaître aux mêmes endroits en cas de reprise du médicament (érythème pigmenté fixe).

Dans ces cas, consultez votre médecin.

En cas d'apparition d'un effet indésirable mentionné ou non dans cette notice, prévenez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez aussi les déclarer directement par le site internet www.ansm.sante.fr ; vous contribuez ainsi à fournir plus d'informations sur la sécurité du médicament.

Vie quotidienne

La consommation d'alcool est déconseillée.

Examens médicaux

Signalez que vous prenez Doliprane si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre (glycémie) dans le sang.

Nouveaux traitements

Signalez systématiquement que vous prenez déjà Doliprane, afin d'éviter les interactions médicamenteuses.

Surveillance

EN CAS D'HÉPATITE VIRALE AIGÜÈ

Cessez le traitement et consultez votre médecin.

INFORMATIONS PRATIQUES

Élimination

Ne jetez pas les médicaments au tout-à-l'égout ou dans les ordures ménagères. Apportez-les à votre pharmacien. Ces mesures permettent de protéger l'environnement.

Date de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : mars 2012/v1.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact

Pour toute question sur ce médicament, contactez :

sanofi-aventis France - 1-13 boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France

0800 222 555 numéro vert (depuis l'étranger **+33 (0) 1 57 63 23 23**).

Fabriqué par SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - 14100 Lisieux - France

CONSEILS - ÉDUCATION SANITAIRE

Que faire en cas de fièvre ?

Au-delà de 38 °C, on parle de fièvre.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire ou à faire boire votre enfant fréquemment.

Pour améliorer l'efficacité du traitement, découvrez votre enfant, faites-le boire et ne le laissez pas dans un endroit trop chaud.

Avec Doliprane 500 mg, la fièvre doit baisser rapidement. Consultez immédiatement votre médecin si :

- des signes inhabituels apparaissent
- la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave
- la fièvre est associée à des maux de tête et/ou des vomissements.

Que faire en cas de douleur ?

La douleur est ressentie différemment selon les personnes.

Avec Doliprane 500 mg, la douleur doit céder rapidement. Dans tous les cas, consultez immédiatement votre médecin si :

- il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement
- la douleur est violente, inattendue et brutale (« serrant » la poitrine par exemple) ou si elle revient régulièrement
- d'autres signes apparaissent : malaise général, fièvre, gonflement inhabituel de la zone douloureuse, diminution de la force dans un membre
- la douleur vous réveille la nuit.

Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Lisez-la attentivement et conservez-la. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. Ne dépassez pas la date limite d'utilisation figurant sur la boîte. Tenez ce médicament hors de portée et de la vue des enfants.

Doliprane® 500mg
PARACÉTAMOL

 **Boîte de 16 comprimés à avaler**
Adulte et enfant à partir de 27 kg

SANOFI 