

CAMPHO-PNEUMINE AMINOPHYLLINE

SUPPOSITOIRES

COMPOSITION:

Adultes: aminophylline 0.15g, gaïacol glycolate d'éthyle 0.26g, camphre 0.1g, eucalyptol 0.05g, amyléine HCl 0.01g, suppicire q.s.p.

Enfants: aminophylline 0.06g, gaïacol glycolate d'éthyle 0.12g, camphre 0.04g, eucalyptol 0.03g, suppicire q.s.p.

PROPRIÉTÉS PHARMACODYNAMIQUES:

Les suppositoires Campho-Pneumine Aminophylline associent aux antiseptiques des voies respiratoires:

gaïacol glycolate d'éthyle, eucalyptol et camphre, un antispasmodique bronchique: l'aminophylline, qui permet de traiter les diverses affections broncho-pulmonaires s'accompagnant de dyspnée.

Les dérivés terpéniques (camphre et eucalyptol) peuvent abaisser le seuil épileptogène.

INDICATIONS:

Affections broncho-pulmonaires dyspnéisantes:

- Trachéites, trachéo-bronchites, bronchites s'accompagnant de gêne respiratoire, bronchites asthmatiformes.
- Toux spasmodiques et coqueluchoïdes.
- Affections respiratoires des personnes âgées.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

1 à 3 suppositoires par jour. La durée du traitement est limitée à 3 jours.

CONTRE-INDICATIONS:

- Hypersensibilité à l'une des substances actives ou à l'excipient;
- Enfants de moins de 30 mois;
- Enfants ayant des antécédents d'épilepsie ou de convulsions fébriles;
- Antécédent récent de lésion anorectale.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Ce médicament n'est pas recommandé pendant la grossesse ni durant l'allaitement.

EFFETS INDÉSIRABLES:

Comme tous les médicaments, Campho-Pneumine Aminophylline peut provoquer des effets indésirables.

Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est sévère ou ne disparaît pas: douleurs épigastriques, diarrhée, maux de tête, agitation, insomnie, irritabilité.

Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin: vomissements, tachycardie, arythmie, convulsions, éruption cutanée.

Compte tenu de la présence de camphre et d'eucalyptol, et en cas de non-respect des doses préconisées, il existe un risque de convulsions chez l'enfant.

SURDOSAGE:

Une utilisation répétée et prolongée peut entraîner des brûlures rectales. En cas d'ingestion accidentelle ou mésusage chez l'enfant, il existe un risque de troubles neurologiques.

Si nécessaire, un traitement symptomatique approprié doit être mis en place dans une unité de soins spécialisée.

PRÉSENTATION:

Les suppositoires Campho-Pneumine Aminophylline sont présentés sous deux formes:

Adultes (à partir de 15 ans).

Enfants (de 3 ans à 15 ans).

Boîte de 8 et 12 suppositoires.