

معلومات لمستخدم الدواء - النشرة الداخلية للمستحضر الصيدلاني:

## بروغراف® ٥٠٠ ملغم، ١ ملغم وه ملغم كبسولات صلبة

تاكروليماس احادي الهيدرات

اقرأ هذه النشرة جيداً قبل استخدام أو تناول هذا الدواء

- استخدم هذه النشرة لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.
- إذا كانت لديك أية أسئلة تتعلق بهذا المستحضر، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.
- لا تدم صرّف هذا الدواء، كل بنا على وصفة طبية، فلا تعالجه لأي شخص آخر إلا بعد موافقة حتى لو كان يعاني من نفس الأعراض.
- يرجى الاتصال بالطبيب للعلاج أو الصيدلي في حال زيادة عدد الأدوية المستخدمة للمرضى.

تتضمن هذه النشرة معلومات مفصلة باستخدام البروغراف® المعروف باسم بروغراف.

تحتوي هذه النشرة على:

١. ما هو بروغراف وما هي دواعي استخدامه
٢. قبل القيام بتناول أو استخدام بروغراف
٣. الأعراض الجانبية
٤. ظروف تخزين بروغراف
٥. معلومات إضافية

٦. ما هو بروغراف وما هي دواعي استخدامه

يغني بروغراف إلى حدٍ كبير عن الأدوية المستخدمة في علاج أمراض القلب، ويعزز الأعضاء (على سبيل المثال، الكلى، أو القلب)، مجوّل جهاز المناعة في جسمك إن مرض العضو الجيد. يستخدم بروغراف للسيطرة على الإصابة بالتهاب في الجسم لتتمكن من تقليل الشعور بالآلام.

كما لا يستطيع بروغراف بالتوافق مع الأدوية الأخرى التي تعمل على خفض ضغط الدم أو أي صخر آخر أو إذا لم تكنك أية علاجات سابقة كنت تتأخذها من السيطرة على هذه الإصابة يمكن أيضاً أن يملئ بروغراف للرض المستمر لتكبد الزرع والكلب أو أي صخر آخر أو إذا لم تكنك أية علاجات سابقة كنت تتأخذها من السيطرة على هذه الإصابة الناعية بعد الزرع.

٢. قبل القيام باستخدام بروغراف

مواقع استعمال بروغراف:

- إذا كنت تعاني من حساسية لتاكروليموس أو لأي من المواد المستخدمة في تركيبة بروغراف.
- إذا كنت تعاني من حساسية لأي من المضادات الحيوية التي تنتسب للماكوليولات (مثل الأيزثروميسين، كلاريثروميسين، جوساميسين).
- الاحتفظات عند استخدام بروغراف،
- تحدث مع طبيبك قبل استخدام بروغراف.
- سوف تحتاج إلى تناول بروغراف كل يوم طالما كنت بحاجة لتكبد المناعة قبل رفض العضو المزروع، يجب أن تبقى على اتصال منتظم مع طبيبك.
- قد يرفض طبيبك في إجراء عدد من الفحوصات كل أثناء تناول بروغراف (بما في ذلك فحوصات الدم، البول، ووظيفة القلب وفحوصات البصر والفحوصات العصبية) من وقت لآخر. إن هذا أمر طبيعي جداً وسوف يساعد الطبيب في تحديد الجرعة الأنسب لك من بروغراف.
- يرجى تجنب تناول أية لعلاجات عشبية، على سبيل المثال نبات سانت جونز (هايبريكيوم بيريفوراتوم) أو أي من المستحضرات العشبية الأخرى لأن هذا قد يؤثر على فعالية وجرة بروغراف التي تحتاج تناولها. إذا كنت في شك يرجى استشارة الطبيب قبل تناول أي مستحضرات عشبية.
- إذا كنت تعاني من اضطرابات في الكبد أو تعاني من مرض يمكن أن يؤثر على الكبد، الرجاء اخبار الطبيب إن قد يؤثر ذلك على جرعة بروغراف التي تتلقاها.
- إذا كنت تشعر بالآلام شديدة في البطن مصحوبة بآعراض أخرى، مثل: القيء، الغثان أو آلام البطن.
- إذا كنت تعاني من الإسهال أكثر من يوم واحد، الرجاء اخبار الطبيب، لأنه قد يكون من الضروري تعديل جرعة بروغراف التي تتلقاها.
- إذا كنت تعاني من تغيير في النشاط الكهربي للقلب والذي يسمى "تمديد الفترة القابلة كوي تي".
- يمنع مبالغ من التعرض لأشعة الشمس وأشعة فوق البنفسجية أثناء تناول بروغراف من خلال ارتداء الملابس الواقية المناسبة واستخدام كريم واقي الشمس مع حماية عالية من الشمس.
- إذا كنت بحاجة لأخذ أية لقاح، الرجاء إبلاغ الطبيب مسبقاً، سوف يصف طبيبك حول أفضل الإجراءات المناسبة.
- تم الإبلاغ عن ازدياد خطورة حدوث الاضطرابات الكثرارية العصبية لدى المرضى الذين يتناولون بروغراف. إسأل طبيبك عن الاستشارة المتخصصة لهذه الاضطرابات.

التفاعلات الدوائية مع الأدوية الأخرى أو الأغذية والمشروبات الغذائية

- يجب استشارة الطبيب قبل استخدام بروغراف إذا كنت تأخذ أو أخذت مؤخراً أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.
- يمكن أن تتناول مستويات بروغراف في الدم بعض الأدوية الأخرى التي تتأخذها، ويمكن أن تتناول مستويات الدم للأدوية الأخرى بروغراف، وقد يتسبب ذلك بإيقاف بروغراف، أو زيادة جرعة الدواء، تحديد، بما في أن ترفض طبيبك إذا كنت تأخذ أو أخذت مؤخراً أدوية مثل:
  - الأدوية المضادة للقلربات والمضادات الحيوية (خاصة المضادات المسماة الماكوليوات) التي تستخدم لعلاج العدوى مثل الكيتيكونازول، الفلوكونازول، الأيتراكونازول، الفلوريديازول، الكيتريمازول، الأيزثروميسين، الجوساميسين، والرفامبيسين.
  - مشتقات بروتياز فيروس نقص المناعة البشرية (مثل نيتازوفير، فلنيتافير، فلنيتافير، ساكوينافير) التي تستخدم لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية.
  - مشتبات بروتياز فيروس التهاب الكبدى ج (مثل الترافيبور، وبوسبيريفير، وبوسبيريفير التي تستخدم لعلاج عدوى التهاب الكبد الوبائي ج.
  - أدوية علاج حمى التيفوئيد وأدوية العلاج المضاد (مثل أوميدوزول، أوتريودوزول، ج سيستينين)
  - مضادات آلام، التي تستخدم لعلاج الغثان وآلام (مثل ستيركويد).
  - مضاد الحموضة فيروكسيد المنجسيوم والألومنيوم، الذي يستخدم لعلاج الحموضة.
  - العلاجات الهرمونية بيثينيل إستراديول (مثل حبوب منع الحمل) أو أناتول.
  - الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب مثل نيفيديين، نيكارديين، ديلتايزاميل وفيراباميل.
  - العقاقير المضادة لاضطراب نظم القلب (اميدوزول) التي يستخدم للسيطرة على عدم انتظام ضربات القلب (رقابت غير متكافئة للقلب).
  - الأدوية المعروفة باسم "الستيونات"، المستخدمة في علاج ارتفاع الكالسيوم والعدوى الثلاثية.
  - أدوية الصرع مثل الفلوريميثال، والفلوريميثال.
  - المضبوطات القلبية مثل ديتازينولون.
  - مضاد الكوليك فلانزونون.
  - المستحضرات العصبية التي تحتوي على نبتة سانت جونز وورث (هايبريكيوم بيريفوراتوم) مثل مستحضرات شيسانترا سفينانثرا.
- أخبر طبيبك إذا كنت تأخذ أو بحاجة إلى أخذ أيوبيرون، الأيزثروميسين، بي، أو مضادات الفرومسات (مثل أسيكلوفير). قد يؤدي أخذ هذه الأدوية مع بروغراف إلى تفاقم اضطرابات الكلى أو الجهاز العصبي.
- يحتاج الكثير أيضاً إلى العلاج بعد إذا كنت تأخذ مكملات البوتاسيوم ودراد البول الموفرة للبوتاسيوم (مثل الملبوريدي، تراي أميترين أو السيلوبولاكسون). بعض الأدوية المسكدة للألم (السماة بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل أيبوفروفين)، مضادات التشنج، أو الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم لمرض السكري، أثناء أخذك بروغراف.
- إذا كنت بحاجة إلى أي تطعيم، الرجاء اخبار طبيبك مسبقاً.
- تناول بروغراف مع الطعام والمشروبات
- يمكن تناول بروغراف في معدة فارغة قبل ساعة على الأقل أو بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من تناول الطعام.
- تجنب تناول الاربوب فورت أو عصير الجريب فروت، أثناء استخدام بروغراف.

المحلل والهرماعة

يرجى استشارة طبيبك إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أوتعقدن إنك حاملأ أو تخططين ذلك قبل البدء بتناول بروغراف.

يقفز بروغراف في حليب الثدي، لذلك يجب أن لا تقومي بالإرضاء أثناء استخدامه.

يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دوا.

تأثير بروغراف على القيادة واستخدام الآلات

لا تقم بالقيادة أو استخدام أية أدوات أو آلات إذا كنت تشعر بالدوار أو الغثاس، أو إذا أصبحت غير قادر على الرؤية بوضوح بعد تناول بروغراف، تصبح فرصة حدوث هذه الآثار أكبر إذا كنت تأخذ مكملات الكالسيوم مع بروغراف.

معلومات هامة حول بعض مكونات بروغراف

يحتوي بروغراف على اللاكتوز، ينبغي أخذ هذا بعين الاعتبار إذا أخركك الطبيب بعدم احتماك للسكريات، أخبر طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

٣. طريقة إستخدام بروغراف

استخدم بروغراف تماماً كما وصفه الطبيب، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

تأكد من حصولك على نفس الدواء، من تاكروليموس في كل مرة تقوم بصرف وصفة طبية. إذا قرأ زرع شخصاً آخر وصفة طبية، لا تأخذ جرعة من بروغراف الخاص بك على تغيير دواك من تاكروليموس إلى نوع مختلف.

يجب أخذ هذا الدواء مرتين يومياً، إذا تغير شكل الدواء عن المعتاد، أو إذا تغيرت تعليمات الجرعة، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي في أقرب وقت ممكن للتأكد من أن لديك الدواء المناسب.

سقط الطبيب بتحديد الجرعة الإبتدائية لتع رفض العضو المزروع وذلك وفقاً لوزن جسمك، بشكل عام، ستزاول الجرعات الأولية بعد الزرع مباشرة بين ٥٠-٧٥. إلى ٠٣-٠٤ ملغم لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً اعتماداً على العضو المزروع.

تعتمد الجرعة على حالتك الصحية العامة وعلى نوع أدوية كنت تتلقاها، على سبيل مة، يجب فحص الدم بشكل متكرر لتحديد الجرعة الصحيحة وتعديلها مع وقت لآخر، وسوف طبيبك يخفض جرعة بروغراف بمجرد أن تستقر حالتك، سيخبرك طبيبك بعدد وكيفية أخذ الكبسولات بالتدريج.

يؤخذ بروغراف عن طريق الفم مرتين يومياً، وذلك صباحاً ومساءً، بشكل عام، يجب أن تتناول بروغراف على معدة فارغة قبل ساعة على الأقل أو بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من تناول الطعام.

يجب إبلاغ الكيوسلات بكلها مع كوب من الماء.

تناول الكيوسلات فوراً بعد إخراجها من العبوة، تجنب تناول الجريب فروت أو عصير الجريب فروت، أثناء استخدام بروغراف.

الجرعة الزائدة من بروغراف

إذا كنت قد تناولت الكثير من بروغراف دون قصد، اتصل بطبيبك أو بإتفر قسم طوارئ في المستشفى على الفور.

نسيان تناول جرعة بروغراف

نسيب أخذ كيوسلات بروغراف في موعدها، انتظر حتى موعد الجرعة التالية ومن ثم تابع تناولها كالمسابق، لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة النسيبة.

وقف العلاج الخاص من بروغراف قد يزيد من خطر رفض العضو المزروع لا تتوقف عن علاجك ما لم يخبرك طبيبك بذلك.

لاستفسار أو مزيد من المعلومات عن استخدام هذا الدواء، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية

- مثل جميع الأدوية، قد يسبب بروغراف بعض الأعراض الجانبية، إلا أنها قد لا تصيب جميع المرضى.
- يسبغ بروغراف أية الجسم الفاعلية بهدف منع رفض جسمك للعضو المزروع، وبالتالي تصبغ طرفة الجسم الفاعلية ضد الإصابة بالعدوى، فيصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أثناء تناول بروغراف، مثل عدوى الجلد، المعدة والأمعاء، الرئتين والسانك البولية.
- قد تظهر لديك أعراض جانبية شديدة، من ضمنها الأعراض الجانبية المذكورة التالية، أخبر طبيبك في الحال إذا عانيت أو تعتقد أنك تعاني من أي منها:
  - العدوى الانتهازية (كثديية، طفرية، قريسية، وأولية)؛ إسهال لفترة طويلة؛ الحمى والتهاب اللق.
  - تم الإبلاغ عن حدوث أزم حادة وخبيثة بعد العلاج نتيجة لتكبد المناعة.
  - الفروية؛ طفيلة المضطجات التخارية وهي حالة تتميز بآحصى وكدمات الجلد والتي قد تظهر كقطا حمرء صغيرة جداً، مع أو بدون بثور شديد غير مبرر، ارتباك، آضفار البيضاء العنيزن (الزرقاق) مع آراض الفشل الكهوي القاع والفقاد (مع عدم إخراج البول).
  - تم الإبلاغ عن حالات من عدم تئسج خدلا الدم الحمراء القلبي (انخفاض ضغط الدم الحمراء) وقرع الدم الانتحالي (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء) بسبب التحلل غير الطبيعي المتراكم مع (الحمى). قد لا تظهر لديك أية أعراض أو اعتماداً على شدة الحالة فإنك قد تشعر بال تعب، الخمول، شوب غير طبيعي في الجلد، حمى في اللثى، دوخة، صداع، آلام في الصدر، بيرةودة في اليدين والقدمين.
  - حالات من ندررة الحجابيا (انخفاض شديد في عدد خلايا الدم البيضاء) المصوب بقرحات في الفم، الحمى والإصابة بالعدوى). قد لا تظهر لديك أية أعراض أو قد تشعر حمى مفاجئة، نقصان أو التهاب اللق.
  - ردود فعل تحسسية وتفاعلية مع الأعراض التالية، طفح جلدي مع حكة فاشرة (مغشاة)؛ تورم في اليدين، القدمين، الكاحل، الوجه، الشفتين، اللق أو الحلق (والذي قد يسبب صعوبة في البلع أو التنفس) وقد تشعر بقدان الوعي.
  - متلازمة متلازمة الدم أو الحلق (التهاب الحلق، انخفاض لاصحاح الدمء، تغير الحالة العقلية، نوبات، واضطرابات بصرية.
  - مرض الفم القاط (التهال الأملح)، تغير في رسة ضربات القلب، انخفاض ضغط الدم، فقر خلايا الدم الحمراء) وفقر الدم الانتحالي (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء) بسبب التحلل غير الطبيعي المتراكم مع (الحمى). قد لا تظهر لديك أية أعراض أو اعتماداً على شدة الحالة فإنك قد تشعر بال تعب، الخمول، شوب غير طبيعي في الجلد، حمى في اللثى، دوخة، صداع، آلام في الصدر، بيرةودة في اليدين والقدمين.
  - متلازمة انحلال الدم البوريي، وهي حالة تصعبها الأعراض التالية: قلة أو عدم إخراج البول (الفشل الكهوي الحاد)، التعب الشديد، آضفر الجلد أو العنيزن البورمان، كدمات غير طبيعية أو ترقيد، وعلامات الإصابة بالعدوى.
- وظائف غير كافية لبعض الأعضاء.

الأعراض الجانبية التالية قد تحدث أيضاً عند تناول بروغراف

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على أكثر من شخص واحد من بين كل ١٠ أشخاص):

- زيادة نسبة السكر في الدم، داء السكري، وزيادة البوتاسيوم في الدم
- صعوبة في النوم
- الارتعاش، الصداع
- ارتفاع ضغط الدم
- الإسهال، الغثان
- اضطرابات الكبد
- الآثار الجانبية الشائعة (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠ أشخاص):

الآثار الجانبية الشائعة (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠ أشخاص):

أعراض اللق، الارتباك، التوهان، الكتابة، تغيرات في المزاج، الكوابيس، الهوسية، والاضطرابات العقلية.

نوبات، اضطرابات في الوعي، وخز (مؤلمة في بعض الأحيان) في اليدين والقدمين، دوخة، اعتلال في القدرة على الكتابة، واضطرابات الجهاز العصبي.

تعليم الزوية، زيادة الحساسية للضوء، واضطرابات العين.

صوت طنين في الأذنين



- انخفاض ضغط الدم أو الأربعة القلبية، زيادة سرعة ضربات القلب.
- تريف، آسداد جزئي أو كلي في الأوعية الدموية، انخفاض ضغط الدم.
- ضيق في التنفس، تورم أو انتفاخ في السجعة الرئتي، تجمع السوائل حول الرئة، التهاب البلعوم، السعال، وآعراض شبيهة بالانفلونزا.
- التهابات أو تقرحات تسبب آلام في البطن، أو الإسهال، تريف في المعدة، التهاب أو تقرحات في الفم، تجمع السوائل في البطن، القيء، آلام البطن، غير الهضم، الإسهال، الانتفاخ، تسيل البطن، البراز الرخو، مشاكل في المعدة.
- تغيرات في إزيمات و عمل الكلى، آضفر الجلد بسبب مشاكل في الكبد، تلف أنسجة الكبد، والتهاب الكبد.
- الكحة، الطفح الجلدي، فقدان الشعر، حب الشباب، زيادة التعرق.
- آلم في المفاصل، الآطراف أو الظهر، وتشنجات في العضلات.
- تصبح وظائف الكلى غير كافية، انخفاض إنتاج البول، وعدم القدرة على التبول أو التبول المزم.
- الصداع، تورم العينين، تورم أو انتفاخ في السجعة الرئتي، تجمع السوائل في الجسم، الآلام، وعدم الراحة، زيادة إفراز الدمع، الشعور بالاضطراب درجة الحرارة.
- الآثار الجانبية غير الشائعة (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل ١٠٠ شخص):

- تورم في تثنج الدم، انخفاض في عدد جميع أنواع خلايا الدم.
- الغثاف، انخفاض البوتزين أو السكر في الدم، زيادة الفوسفات في الدم.
- الغيبوية، تريف في الدماغ، السكتة الدماغية، الشلل، اضطرابات الدماغ، اعتلالات في النكلم واللغة، مشاكل في الذاكرة.
- عدم وضوح الرؤية بسبب تغيرات في عدسة العين.
- اعتلال في السمع.
- عدم انتظام ضربات القلب، وقف ضربات القلب، انخفاض في أداء القلب، اضطراب في عضلة القلب، تضخم عضلة القلب، زيادة في قوة نبض القلب، تضيق قلب غير طبيعي، وعدم ضربات القلب والتشنج غير طبيعيتين.

تسبب بعض الآثار الجانبية الشائعة (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

- زيادة في كثافة الشعر
- العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.
- الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

- زيادة في كثافة الشعر
- العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.
- الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

زيادة في كثافة الشعر

العنيزن، البهوش، التورم بسبب قى الصدر، انخفاض الحركة، التقرحات.

الآثار الجانبية الشائعة جداً (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠٠ شخص):

<b>مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلية العرب</b>
<b>إن هذا دواء</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بعرضك للخطر.</li> <li>• إن بيع بقية وصفة وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.</li> <li>• إن الطبيب وصيدلانيهما ملتا الخبيران بالدوا، وينبغي وضرها.</li> <li>• لا تعط طفلا دون السن المحددة لك من تلقاء نفسك.</li> <li>• لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.</li></ul>



لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

Rev. 12/2017