

لقيفار ٥٠٠ ملغ، ١٠٠ قرص مغلف**لقيفار ١٠٠ ملغ، ١٠٠ قرص مغلف**

- اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل القيام بتناول هذا الدواء حيث أنها تحتوي على معلومات مهمة لك.
- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إليها لاحقاً.
 - في حال وجود أي تساؤلات لديك، يفضل استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي.
 - لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. ولا ينبغي بك أن تتعطه لأحد آخر حتى لو ظهرت عليه نفس أعراض مرضك فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.

- إذا أصبت بأثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي.

ما الذي تحتويه هذه النشرة

١. ما هو لقيفار وما هي دواعي استعماله

٢. ما هي طريقة تناول لقيفار

٣. الأعراض الجانبية المحتملة

٤. طريقة تخزين لقيفار

٥. محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى

٦. ما هو لقيفار وما هي دواعي استعماله

لقيفاراسيتام هو دواء يستخدم لمعالجة نوبات الصرع.

يتم وصف لقيفار

بمفرده للبالغين والمراهقين من سن ١٦ عاماً الذين تم تشخيصهم حديثاً بالصرع. لمعالجة أحد أنواع الصرع. الصرع هو حالة مرضية عامة في المريض من نوبات متكررة. يستخدم لقيفاراسيتام لمعالجة نوع من أنواع الصرع حيث تصيب النوبات في البداية جائياً واحداً فقط من الدماغ ولكن يمكن أن تمند لاحقاً إلى جزاء أكبر يطال الدماغ كليهماً (نوبة صرع جزئية مع تعميم ثانوي أو من دونه). لقد وصف لك الطبيب المعالج لقيفاراسيتام لتقليل عدد النوبات.

إلى جانب أدوية أخرى مضادة للصرع المعالجة:

- نوبات الصرع الجزئية مع تعليم أو من دونه عند البالغين والمراهقين والأطفال والرضع من عمر شهر واحد.

- نوبات الصرع العضلي (عشرة حضارة سريعة تشبه الصدمة تصيب أحد العضلات أو مجموعة من العضلات) عند البالغين والمراهقين من سن ١٦ عاماً الذين يعانون من الصرع الرمادي العامي (النوبات الكثيرة، بما في ذلك فقدان البالغين والمراهقين من سن ١٦ عاماً الذين يعانون من الصرع العام مجهول السبب (نوع الصرع الذي يعتقد أن له سبباً واثني)).

٧. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول لقيفار

لا تتناول لقيفار

إذا كان لديك حساسية تجاه لقيفاراسيتام، مشتقات بيروليدون أو تجاه أي من مكونات هذا الدواء الأخرى (المدرجة في القسم ١).

التحذيرات والاحتياطات

استشر الطبيب المعالج قبل تناول لقيفار

٨. إن كنت تعاني من أمراض في الكلى، اتبع تعليمات طبيبك، الذي يمكنه أن يقررما إذا كان يجب تعديل جرعتك.

٩. إن لا تلاحظ أي بطء في النمو أو تطور غير متوقع للبلوغ عند طفلك، يرجى الاتصال بطبيبك.

١٠. عدد قليل من الأشخاص الذين يتناولون مضادات الصرع مثل لقيفارقد رادتهم أفكار للاحضار الضرر بأنفسهم أو الانتحار إن ظهرت على أي اعراض للأكتئاب وأو التفكير في الانتحار، يرجى الاتصال بطبيبك.

١١. إن عانت أنت أو أحد أفراد عائلتك سابقاً من عدم انتظام ضربات القلب (يمكن رؤيته في تخطيط القلب الكهربائي)، أو إن كنت تعاني من مرض وأو تتناول علاجاً يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأضطراب نظم القلب أو أواختلال الأملاح لديك.

١٢. الآثار غير الطبيعية، الشعور بالانزعاج أو أن أصبحت ردة فعلك أكثر عدوانية من المعتاد، وإن لاحظت أنت أو عائلتك وأصدقاؤك تغيرات مهمة في مزاجك أو سلوكك.

١٣. تناول لقيفار

نادرًا ما تتفاقم نوباتك أو تحدث بوتيرة أكبر خاصة خلال الشهر الأول من بدء العلاج أو بعد زيادة الجرعة. إن واجهت أيّاً من هذه الأعراض الجديدة أثناء تناول لقيفار، استشر طبيبك في أقرب وقت ممكن.

الأطفال والمراهقون

١٤. يوصي بوصف لقيفار وما هي دواعي استعماله

أكبر طبيبك أو الصيدلي إن كنت تتناول أو تتناول مؤخراً وقد تناول أي دواء آخر. لا تتناول دواء ماكروغول (دواء يستخدم مليناً للأمعاء) قبل ساعة واحدة أو بعد ساعة واحدة من تناول لقيفاراسيتام لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان ثانية.

الحمل والرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تعتقدين أنك حامل أو تحظين بإنجاب طفل، استشيري طبيبك قبل تناول هذا الدواء. لا يمكن استخدام لقيفاراسيتام أثناء الحمل. إلا أن اعتبره طبيبك ضرورياً بعد إجراء تقييم دقيق.

يجب أن توقف علاجك دون مناقشة هذا الأمر مع طبيبك.

لا يمكن استبعاد خطر حدوث عيوب خلقية لجنينك بشكل كامل.

لا ينصح بالإرضاخ أثناء العلاج.

القيادة واستخدام الآلات

قد يضعف لقيفار تركيزك على القيادة أو استخدام أي أدوات أو آلات. لأنه قد يجعلك تشعر بالناس. تزداد احتمالية حدوث ذلك في بداية العلاج أو بعد زيادة الجرعة. يجب أن تقود السيارة أو تستخدimates الآلات الأخرى إن كنت على القيام بمثل هذه الأنشطة.

يحتوي لقيفار على الصوديوم

يحتوي لقيفار (٥٠٠ ملغ و١٠٠ ملغ) على أقل من ١ ملليمول صوديوم (٣ ملغم) لكل قرص. وهذا يعني يشكل أساسياً 'خلال من الصوديوم'.

١٥. ما هي طريقة تناول لقيفار

اتبع دائمًا إرشادات طبيبك أو الصيدلي بدقة عند تناول هذا الدواء. واستشر طبيبك أو الصيدلي إن كنت غير متأكد.

العلاج المساعد والعلاج الأحادي (للأشخاص الذين يبلغون من العمر ١٦ عاماً أو أكثر)

١٦. البالغون (الذين يبلغون من العمر ١٦ عاماً أو أكثر) والمراهقون (من ١٦ إلى ١٧ عاماً) بوزن ٥٠ كلغ أو أكثر:

تناول الجرعة الموصى بها: بين ١٠٠ ملغ و٣٠٠ ملغ كل يوم.

عندما يبدأ بتناول لقيفار للمرة الأولى، سيصل لك الطبيب المعالج جرعة صغيرة خلال أسبوعين قبل أن يصف لك الحد الأدنى من الجرعة التي تناولتها يومياً.

على سبيل المثال، إذا كانت جرعتك اليومية ١٠٠ ملغ، ستكون الجرعة الأولية المخفضة ٥٠٠ ملغ يومياً. وسيتم زيادة الجرعة تدريجياً لتصل إلى ١٠٠٠ ملغ يومياً بعد أسبوعين.

طريقة تناول الدواء

ابتلع أقراص لقيفار مع كمية كافية من السوائل (مثل كوب من الماء). يمكنك تناول لقيفار مع الطعام أو من دونه. بعد تناوله عن طريق الفم، قد يكون لقيفاراسيتام طعم مماثل.

مدة العلاج

١٧. يستخدم لقيفار بصفته علاجاً ممزيناً. يجب أن تستمر في تناول لقيفار طبلاً المدة الزمنية التي وصفها لك طبيبك.

١٨. لا تتوقف عن علاجك دون استشارة طبيبك لأن ذلك قد يزيد من حدوث نوباتك.

١٩. إذا كنت تعاني من الآثار الجانبية المحيطة لجرعة زائدة من لقيفار وهي النعاس، الانفعال، العدوانية، انخفاض نسبة اليقظة، تثبيط التنفس والغيبوبة.

٢٠. احصل بطبيبك إن تناولت كمية من الأقراص أكبر مما ينفي لك. سيقوم طبيبك بتحديد أفضل علاج ممكن للجرعة الزائدة.

٢١. إن نسيت تناول لقيفار:

اتصل بطبيبك إن نسيت تناول جرعة واحدة أو أكثر.

٢٢. لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المفروضة.

إذا توقفت عن تناول لقيفار:

إذا توقفت عن العلاج، يجب إيقاف لقيفار تدريجياً لتجنب زيادة حدوث النوبات. إن قررت طبيبك إيقاف علاجك بلقيفار، فسوف يرشدك بشأن إن كانت لديك أي أسلحة أخرى حول طريقة استخدام هذا الدواء. أسأل طبيبك أو الصيدلي.

٢٣. الأعراض الجانبية المحتملة

قد يسبب هذا الدواء مثل سائر الأدوية، آثاراً جانبية إلا أنها قد لا تصيب الجميع.

أخير طبيبك على الفور، أو اذهب إلى قسم مستشفى، إن واجهت أيّاً من العوارض التالية:

٢٤. ضعف الشعور بدوره خفيف أو بالodoxe أو صعوبة في التنفس، حيث قد يدل ذلك على وجود رد فعل تحسسي خطير(نفقي).

٢٥. تورم الوجه، الشفتين، اللسان والحلق (وذمة كوبينك).

٢٦. أعراض شديدة بالإلتوافوندا وطفح جلدي على الوجه تتبعها طفح جلدي متعدد مصحوب بارتفاعات الدم، وارتفاع نسبية أحد أنواع خلايا الدم البيضاء (فرط الحمضيات) (متلازمة رد الفعل الدوائي مع فطر الحمضيات أي متلازمة DRESS).

٢٧. أغصان مثل انخفاض إنتاج الماء، التعب، الغثيان، القيء، التشنُّش، والتلوّم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين، حيث قد يدل ذلك على اخراج مفاجئ في وظائف الكلى.

٢٨. طفح جلدي قد يؤدي إلى ظهور ثبور تبدو هدفية زائدة من لقيفار وهي النعاس، الانفعال، العدوانية، انخفاض نسبة اليقظة، تثبيط التنفس والغيبوبة.

٢٩. إن نسيت تناول لقيفار:

اتصل بطبيبك إن نسيت تناول جرعة واحدة أو أكثر.

٣٠. لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المفروضة.

إذا توقفت عن تناول لقيفار:

إذا توقفت عن العلاج، يجب إيقاف لقيفار تدريجياً لتجنب زيادة حدوث النوبات. إن قررت طبيبك إيقاف علاجك بلقيفار، فسوف يرشدك بشأن إن كانت لديك أي أسلحة أخرى حول طريقة استخدام هذا الدواء. أسأل طبيبك أو الصيدلي.

٣١. قد يسبب هذا الدواء الآثار الجانبية المحيطة

قد يسبب لقيفار على الفور، أو تجاه أيّاً من العوارض التالية:

٣٢. ضعف الشعور بدوره خفيف أو بالodoxe أو صعوبة في التنفس، حيث قد يدل ذلك على وجود رد فعل تحسسي خطير(نفقي).

٣٣. تورم الوجه، الشفتين، اللسان والحلق (وذمة كوبينك).

٣٤. أحدهما من الأعراض المفاجئة التي تظهر في أول يوم.

٣٥. تشنُّش، والتلوّم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين، حيث قد يدل ذلك على وجود رد فعل تحسسي خطير(نفقي).

٣٦. إن تناول لقيفار قد يزيد من احتمالية حدوث نوباتك.

٣٧. لا تتناول لقيفار إن كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، الصدر والأطراف، صعوبة في السيطرة على الحركات، وفترحة.

٣٨. محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى

على ماذا يحتوي لقيفار:

٣٩. المادة الفعالة هي لقيفاراسيتام ٥٠٠ ملغ من لقيفار.

٤٠. المكونات الأخرى هي:

٤١. غلاف القرص: كروسكارباميلو الصوديوم، بوفيدون، سيليكلايكربونيك، المغنيسيوم، ستيبار المغنيسيوم.

٤٢. غلاف القرص: كحول الالولي فيبييل، بولي إيثيلين جليكول، تلك، ثاني أكسيد التيتانيوم (لقيفار، ٥٠٠ ملغ و١٠٠ ملغ) وأكسيد الحديد الأصفر (لقيفار، ٥٠٠ ملغ).

كيف يدوٍ شكل لقيفار ومحتوياته العبوة

إن أقراص لقيفار، ٥٠٠ ملغ المغلفة هي أقراص صفراء اللون، مستطيلة الشكل ومسطحة.

إن أقراص لقيفار، ١٠٠ ملغ المغلفة هي أقراص بيضاء اللون، مستطيلة الشكل ومسطحة.

٤٣. تتوفر أقراص لقيفار، ٥٠٠ ملغ / ١٠٠ ملغ في عبوات تحتوي على ١٠٠ قرص مغلف.

الشركة المصنعة ومالك حقوق التسويق

فامالين ش.م.ل. - لبنان

الصندوق البريدي ٩٢٠١ جديدة المتن، لبنان

البريد الإلكتروني: pharmaline@maliaigroup.com

الموقع الإلكتروني: www.pharmaline.com.lb

رقم تسجيل لقيفار، ٥٠٠ ملغ / ١٠٠ ملغ في لبنان: ١٤١٢٣

رقم تسجيل لقيفار، ١٠٠ ملغ، ١٠٠ قرص مغلف في لبنان: ١٤١٢٣

٤٤. إن هذا الدواء

٤٥. إن الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتوجيهات بعرضك للخطر.

٤٦. اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المذكورة في هذا الدواء وفيضه وضرره.

٤٧. لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقائكم نفسك.

٤٨. لا تكرر صرف الدواء بدون استثناء الطبيب.

٤٩. احفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.