

# abbvie

**النشرة الداخلية :معلومات للمستخدم**

# كوميبيجان(٢)

**٢مج/مليلتر + ٥ مج /مليلتر، قطرة للعين، محلول**

بريمونيدين تارترات و تيمولول

**برجاه قراءة هذه النشرة بأكملها بعناية قبل البدء في استعمال هذا الدواء لانها تحتوي معلومات هامة لك.**

- احفظ بهذه النشرة، ربما تحتاج أن تقرأها مرة أخرى.
- إن كان لديك مزيد من الأسئلة، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء موصوف لك شخصياً ، ولا ينبغي أن تغطي منه الآخرين، لأنه قد يسبب لهم الأذى حتى إذا كانت أعراضهم مشابهة لأعراضك.
- إذا اشتدت أي من الآثار الجانبية، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، برجاء إبلاغ طبيبك أو الصيدلي .راجع الجزء ٤.

**في هذه النشرة:**

- ١. ما هو كوميبيجان وما هي استعمالاته
- ٢. ما يجب عليك معرفته قبل أن تستعمل كوميبيجان
- ٣. كيف تستعمل كوميبيجان
- ٤. الآثار الجانبية الممكنة
- ٥. كيف يتم تخزين كوميبيجان
- ٦. محتويات العبوة و معلومات أخرى

١. **ما هو كوميبيجان وما هي استعمالاته**

كوميبيجان هو قطرة للعين تُستخدم للسيطرة على الجلوكوما. وهو يحتوي على دوائين مختلفين (بريمونيدين و تيمولول) وكلهما يخفض الضغط المرتفع داخل العين. ينتمي بريمونيدين إلى مجموعة من الأدوية تسمى مستقبلات ألفا ٢ -الأدرينالية. وينتمي تيمولول إلى مجموعة من الأدوية تسمى حاصرات الببتا. الببتا. يوصى بإعطاء

كوميبيجان لخفض الضغط المرتفع داخل العين، عندما تكون قطرات العين المحتوية على حاصرات الببتا غير كافية.

تحتوي العين على سائل مائي رائق يغذي العين من الداخل. هذا السائل يتم صرفه من العين بصفة مستمرة ويتم استبداله بسائل جديد. إذا لم تتم عملية صرف السائل بالسرعة الكافية، فإن الضغط داخل العين يرتفع وقد يؤدي في النهاية إلى تلف في الرؤية. يعمل كوميبيجان على تقليل إنتاج السائل وزيادة صرفه. هذا يقلل الضغط داخل العين مع الاستمرار في تغذية العين.

- ٢. **ما يجب عليك معرفته قبل أن تستعمل كوميبيجان**

**لا تستعمل كوميبيجان:**

- إذا كانت لديك حساسية مفرطة تجاه **بريمونيدين تراترات، تيمولول، حاصرات الببتا** أو أي من **مكونات هذا الدواء الأخرى** (مذكورة في الجزء ٦). قد تضم أعراض التفاعل الأرجي (الحساسية) تورم الوجه، والشفاه والحنك، الأزيز التنفسي، الشعور بالإغواء، ضيق التنفس، الحكة أو تورد المنطقة المحيطة بالعين.
- إذا كانت لديك آذن أو فيما سبق مشاكل تنفسية مثل الربو، أو **التهاب قصبي (شعبي) انسدادى** مزمن شديد (مرض رئوي شديد قد يشبب الأزيز التنفسي، صعوبة التنفس و /أو السعال طويل البقاء).
- إذا كانت لديك مشاكل في القلب **مثل انخفاض معدل ضربات القلب، فشل قلبي، اضطرابات في ضربات القلب** (ما لم تكن تحت السيطرة بواسطة منظم ضربات القلب).
- إذا كنت تستعمل **مثبطات أحادي أمين أو كسيدر** أو أنواع معينة أخرى من **الأدوية المضادة للاكتئاب.**

إذا طلنت أن أي من هذه النقاط ينطبق عليك، لا تستعمل كوميبيجان إلا بعد أن نتحدث مرة أخرى مع طبيبك.

**تحذيرات واحتياطات**

تحدث إلى طبيبك قبل استعمال كوميبيجان:

- إذا كان لديك آذن أو حدث لديك في الماضي
  - أمراض قلب تاجية (يمكن أن تضم أعراضها ألم الصدر، أو تضيق الصدر، اللهاث أو الاختناق)، فشل قلبي، انخفاض ضغط الدم.
  - اضطرابات معدل ضربات القلب، على سبيل المثال، بطء ضربات القلب.
  - مشاكل تنفسية، ربو أو مرض رئوي انسدادى مزمن.
  - أمراض سوء دوران الدم (كداء رينود أو متلازمة رينود).
  - داء السكري لأن تيمولول من شأنه إخفاء علامات وأعراض انخفاض مستويات سكر الدم .
  - فرط نشاط الغدة الدرقية لأن تيمولول من شأنه إخفاء العلامات والأعراض.
  - مشاكل في الكلى أو الكبد.
  - ورم بالغدة الكظرية.
  - جراحة في العين لخفض الضغط داخل العين .
- إذا كنت تعاني أو عانيت من قبل من أي حساسية (مثل حمى القش، الإكزيما) أو أي تفاعل حساسية شديد، يجب أن تعرف أن الجرعة المعتادة من الأدرينالين التي تُستخدم للسيطرة على التفاعل الشديد قد تحتاج أن تُزاد.
- أخبر الطبيب قبل أن تخضع لجراحة بانك تستعمل كوميبيجان، لأن من شأن تيمولول تغيير مغول بعض الأدوية أثناء التخدير.

**الأطفال و المراهقين**

ينبغي ألا يستخدم كوميبيجان لدى الأطفال الأصغر سناً من عامين وينبغي ألا يستخدم بشكل اعتيادي لدى الأطفال من سنتين إلى ١٧ سنة.

**الأدوية الأخرى و كوميبيجان**

**يمكن لسكوميبيجان التأثير على أو التآثر من أدوية أخرى تتعاطاها، بما في ذلك قطرات أخرى للعين تُستخدم لعلاج الجلوكوما.** قم بإبلاغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تستعمل، أو استخدمت مؤخراً، أي أدوية أخرى، بما فيها الأدوية المستخدمة لأي حالة طبية، حتى إذا لم تكن لها صلة بحالتك العينية، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف بدون تذكرة طبية. هناك عدد من الأدوية التي قد تعيق كوميبيجان، وبناء عليه، فمن المهم أن تخبر طبيبك إذا كنت تتعاطى:

- مسكنات
- أدوية تساعد على النوم أو على مواجهة القلق
- أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم
- أدوية للحالات القلبية (على سبيل المثال، ضربات قلب غير طبيعية) كحصرات الببتا، ديجوكسين أو كينيدين (يستعملوا لعلاج حالات قلبية وبعض أنواع الملاريا [البزاء])
- أدوية لعلاج السكري أو ارتفاع سكر الدم
- أدوية تعالج الاكتئاب مثل فلوكسيتين و باروكسيتين
- قطرة أخرى للعين تستعمل لتخفيض الضغط المرتفع داخل العين (الجلوكوما)
- أدوية لعلاج التفاعلات الأرجية (الحساسية) الشديدة
- أدوية تؤثر على بعض الهرمونات في جسمك، مثل الأدرينالين والدوبامين
- أدوية تؤثر على العضلات الموجودة في أوعيتك الدموية
- أدوية تعالج خرقة المعدة أو قرح المعدة

إذا تغيرت جرعة أي من أدويتك الحالية أو إذا كنت تشرب الكحول بانتظام، سيكون عليك إخبار طبيبك.

إذا كنت ستخضع للتخدير، ينبغي عليك إخبار طبيبك أو طبيب أسنانك بأنك تتلقى كوميبيجان.

**الحمل والإرضاع**

إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلاً أو تظنين ربما أن تكوني حاملاً أو تخططين للحمل، استشري طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

لا تستعملي كوميبيجان إذا كنت حاملاً ما لم يقرر طبيبك أنه ضروري.

لا تستعملي كوميبيجان إذا كنت مرضعة. فقد يصل تيمولول إلى حليب الثدي. اطلبي نصيحة من طبيبك قبل أن تتعاطي أي دواء أثناء فترة الإرضاع.

**قيادة السيارة وتشغيل الآلات**

قد يسبب كوميبيجان النعاس أو التعب أو غشاوة في الرؤية في بعض المرضى. امتنع عن قيادة السيارة أو تشغيل أية أدوات أو آلات إلى أن تزول هذه الأعراض. إذا حدثت لك أي مشاكل استشر طبيبك.

**كوميبيجان يحتوي بنز الكونيوم كلوريد**

- هذا الدواء يحتوي على ٠.٢٥ مج بنز الكونيوم كلوريد في كل ٥ مل من المحلول والتي تعادل ٠.٠٥ مج/مل .
- كلوريد البنز الكونيوم ممكن أن يتم امتصاصه بواسطة العدسات اللاصقة اللينة وقد يؤدي ذلك إلى تغير لون العدسات اللاصقة. يجب إزالة العدسات اللاصقة قبل استعمال هذا الدواء وإعادة وضعها ١٥ دقيقة بعد استعمال الدواء.
- قد سبب كلوريد البنز الكونيوم تهيج في العين خاصة إن كنت تعاني من جفاف العين أو لديك مشاكل في القرنية (الطبقة الشفافة في مقمة العين). إذا شعرت شعور غير طبيعي في العين أو حرقان أو ألم في العين بعد استعمال الدواء اتصل بطبيبك مباشرة.

**كوميبيجان يحتوي على فوسفات**

هذا الدواء يحتوي على ٠٢.٩ مج من الفوسفات في كل 5 مل من المحلول والتي تعادل ١٠.٥٨ مج/مل.

إذا كنت تعاني من تلف شديد في الطبقة الشفافة الأمامية للعين (القرنية)، قد يسبب الفوسفات في حالات نادرة بقعة غائمة على القرنية نتيجة تراكم الكالسيوم أثناء العلاج.

٣. **كيف تستعمل كوميبيجان**

الزم دائماً بتعليمات طبيبك عند استعمال هذا الدواء. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد من طريقة الاستعمال. يجب ألا يستخدم كوميبيجان لدى الأطفال الذين يقل عمرهم عن سنتين. وينبغي ألا يستخدم بشكل اعتيادي لدى الأطفال والمراهقين (من سنتين إلى ١٧ سنة).

الجرعة المقررة هي نقطة واحدة من كوميبيجان، مرتين يومياً، بفارق حوالي ١٢ ساعة. لا تغير الجرعة ولا تتوقف عن استعمال الدواء بدون أن تتحدث مع طبيبك.

إذا كنت تستعمل قطرات أخرى للعين بجانب كوميبيجان، **يجب أن تمر خمس دقائق على الأقل** بين استعمال كوميبيجان والقطرات الأخرى.

**تعليمات خاصة بالاستعمال**

لا تستعمل الزجاجة إذا كانت سدادة الأمان على عنق الزجاجة مكسورة قبل أول استعمال.

اغسل يديك قبل فتح الزجاجة. أمل رأسك إلى الخلف وانظر إلى السقف.



- ١. اسحب الجفن السفلي برفق إلى الأسفل بحيث يتكون جيب صغير.
- ٢. اقلب الزجاجة بحيث تنجه إلى أسفل، واضغط عليها بحيث تنزل نقطة واحدة في كل عين تحتاج لعلاج.
- ٣. اترك الجفن السفلي، واغضض عينك.
- ٤. استمر في إغماض العين، واضغط بأصبعك على ركن العين (مكان التقاء العين بالأنف) لمدة دقيقتان. يساعد هذا على منع دخول كوميبيجان إلى بقية الجسم.

إذا لم تدخل النقطة في عينك، حاول مرة أخرى.

لتجنب التلوث، لا تدع طرف الزجاجة يلمس عينك أو أي شيء آخر. أعد الغطاء وأغلق الزجاجة فوراً بعد استعمالها.

**إذا تستعمل كمية أكبر مما ينبغي من كوميبيجان**

في البالغين

إذا استعملت كمية أكبر مما ينبغي من كوميبيجان، من المُستبعد أن يسبب ذلك أي أذى. استعمل الجرعة التالية في موعدما كالمعتاد. إذا شعرت بالقلق ناقش الأمر مع طبيبك أو الصيدلي.

في الرضع والأطفال

تم الإبلاغ عن عدة حالات من تجاوز الجرعة في رضع يتلقون بريمونيدين (أحد مكونات كوميبيجان) كجزء من العلاج الطبي للجلوكوما. تشمل الأعراض: اللميل للنعاس، الارتخاء، انخفاض درجة حرارة الجسم، الشحوب، صعوبات في التنفس. إذا حدث هذا، يجب الاتصال فوراً بالطبيب.

باللون والأطفال

إذا تم بلع كوميبيجان عن طريق الخطأ فسيكون عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

**إذا نسيبت أن تستعمل كوميبيجان**

إذا نسيبت أن تستعمل كوميبيجان، استعمل نقطة واحدة في كل عين تحتاج إلى علاج بمجرد أن تتذكره، أو راجع إلى نظامك المعتاد. لا تستعمل جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

**إذا توقفت عن استعمال كوميبيجان**

يجب استعمال كوميبيجان يومياً لكي يزاول مفعوله بشكل صحيح.

إذا كان لديك مزيد من الأسئلة عن استعمال هذا المنتج، الرجاء توجيهها إلى طبيبك أو الصيدلي.

٤. **الآثار الجانبية الممكنة**

شأنه شأن جميع الأدوية، قد يؤدي هذا الدواء إلى آثار جانبية، وإن كانت لا تحدث لجميع الأشخاص.

إذا تعرضت لأي من التأثيرات الجانبية التالية، رجاء الاتصال بطبيبك على الفور:

- فشل قلبي (على سبيل المثال، ألم الصدر) أو عدم انتظام ضربات القلب
- ارتفاع أو انخفاض في معدل ضربات القلب أو انخفاض ضغط الدم

تصيب العين

شائعة جداً (من الممكن أن تصيب أكثر من شخص من كل ١٠ أشخاص):

- احمرار أو خرقة العين
- شائعة (يمكن أن تصيب شخصاً من كل ١٠ أشخاص):
  - لسعة أو ألم في العين
  - تفاعل حساسية في العين أو الجلد المحيط بها
  - تشققات صغيرة على سطح العين (مع التهاب أو بدونه)
  - تورم واحمرار والتهاب الجفون
  - التهيج، أو الإحساس بوجود شيء داخل العين
  - حكة بالعين والجفن
  - جربيات أو بقع بيضاء على الطبقة الشفافة التي تغطي سطح العين
  - اضطرابات بصرية
  - تدميع
  - جفاف العين
  - أعين ديقة

غير شائعة(يمكن أن تصيب شخصاً من كل ١٠٠ شخص):

- صعوبة في الرؤية بوضوح
- تورم والتهاب الطبقة الشفافة التي تغطي سطح العين
- عيون متعبة
- حساسية للضوء
- ألم الجفن
- تحول لون الطبقة الشفافة التي تغطي سطح العين إلى الأبيض
- تورم أو مناطق من الالتهاب تحت سطح العين
- عوائم أمام العين

غير معروفة (لا يمكن تقديرها من المعلومات المتاحة):

- غشاوة في الرؤية

**تصيب الجسم**

شائعة (من الممكن أن تصيب حتى شخصاً من كل ١٠ أشخاص):

- ارتفاع ضغط الدم
- الاكتئاب
- النعاس
- الصداغ
- جفاف الفم
- التسفع العام

غير شائعة (يمكن أن تصيب حتى شخصاً من كل ١٠٠ شخص):

- الفلل القلبي
- عدم انتظام ضربات القلب
- الوذخة
- الإغواء
- جفاف الأنف
- اضطرابات في حاسة التذوق
- الغثيان
- الإسهال

غير معروفة (لا يمكن تقديرها من المعلومات المتاحة):

- ارتفاع معدل ضربات القلب أو انخفاضه
- انخفاض ضغط الدم
- تورد الوجه

قد تكون بعض هذه التأثيرات ناجمة عن تحسس (حساسية) تجاه أي من المكونات. شوهدت تأثيرات جانبية إضافية مع بريمونيدين أو تيمولول، وبالتالي، فمن الممكن حدوثها مع كوميبيجان.

شوهدت التأثيرات الجانبية الإضافية التالية مع بريمونيدين:

- التهاب داخل العين، حنقات صغيرة، صعوبة في النوم، أعراض شبيهة بنزلة البرد، ضيق التنفس، أعراض خاصة بالمعدة والهضم، تفاعلات أرجية (تحسسية) عامة، تفاعلات جلدية تضم التورد، تورم الوجه، طفح جلدي و حكة وتوسع الأوعية الدموية.

مثله مثل الأدوية الأخرى المستخدمة على العين، يمتص كوميبيجان (بريمونيدين /تيمولول) وصولاً إلى الدم. تيمولول هو المكون المحصر للببتا الموجود في كوميبيجان وامتصاصه قد يشبب تأثيرات جانبية مطابقة لتلك التي تنجم عن استعمال عوامل إحصار الببتا القفوية و /أو الوريدية. إلا أن معدل وقوع التأثيرات الجانبية أكثر انخفاضاً بعد الاستعمال الظاهري على العين مقارنة باستعمال الأدوية عن طريق الفم أو الحقن، على سبيل المثال. تضم التأثيرات الجانبية المدرجة تفاعلات شوهدت داخل فة محصرات الببتا عندما تُستخدم لعلاج حالات العين:

- التفاعلات الأرجية (التحسسية) المُعممة، بما فيها التورم تحت الجلدي (التي تصيب مناطق مثل الوجه والأطراف، والتي قد تسد المسلك الهوائي مما قد يشبب صعوبة في البلع أو التنفس)، الشرى (أو طفح جلدي وحكة)، الطفح الموضعي أو الشُعم، الحكة وتفاعل جلدي مفاجئ وشديد تهدد الحياة.
- انخفاض مستويات سكر الدم.
- صعوبة في النوم (أرق)، كوابيس، فقدان الذاكرة و الهلوسة.
- السكته الدماغية، انخفاض الإمداد الدموية إلى المخ، زيادة علامات وأعراض الوهن العضلي الوبيل

(اضطراب عضلي)، إحساس غير معتاد (كوخز الإبر).

التهاب القرنية، انفصال الطبقة الموجودة تحت الشبكية التي تحتوي على أوعية دموية بعد جراحة الترشيح مما قد يسبب اضطرابات بصرية، انخفاض حساسية القرنية، تآكل القرنية (تضرر الطبقة الأمامية لمقلة العين)، تدلي الجفن العلوي (مما يجعل العين نصف مغلقة)، الرؤية المزدوجة.

- ألم الصدر، الوذمة (تراكم السوائل)، تغيرات في نظم أو سرعة ضربات القلب، نوع من اضطرابات نظم القلب، النوبة القلبية والفشل القلبي.
- ظاهرة رينود، برودة اليان والقدمان.

- تضيق المسالك الهوائية بالرئتين (بالذات لدى المرضى الموجودة لديهم هذه الحالة في الأصل)، صعوبة في التنفس والسعال.
- غسر الهضم، ألم البطن التقيؤ.
- تساقط الشعر، طفح جلدي يبدو لونه أبيض فضي (طفح صدفي الشكل) أو تدهور الصدفية، والطفح الجلدي.
- ألم عضلي غير ناجم عن مجهود بدني.
- خلل وظيفي جنسي، انخفاض الشهوة الجنسية.
- ضعف العضلات أو إصابتهما بالإرهاق.

أعراض جانبيةة أخرى صدرت مع استعمال قطرات العيون المحتوية على الفوسفات:

تم الإبلاغ عن حالات تكلس القرنية في حالات نادرة جداً مع استخدام قطرات العين التي تحتوي على فوسفات في بعض المرضى الذين يعانون من تلف شديد في القرنية.

**الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية**

إذا أصبت بأي من التأثيرات الجانبية، تحدث إلى طبيبك، الصيدلاني أو الممرضة. يتضمن ذلك التأثيرات الجانبية التي لم يرد ذكرها في هذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ مباشرة عن التأثيرات الجانبية عبر نظام الإبلاغ الوطني. بإبلاغك عن التأثيرات الجانبية يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات المتعلقة بسلامة هذا الدواء.

**للتواصل مع وزارة الصحة:**

**الوكيت:**

**وزارة الصحة**

**الرقابة الدوائية والغذائية**

- البريد الإلكتروني: health@moh.gov.kw
- هاتف: ٩٦٥٢٤٨٧٧٤٢٠٢٥ + ٩٦٥٢٤٨٧٧٥٢٠١٥٢ +
- فاكس: ٩٦٥٢٤٨٦٥٤١٤ +

**الأرذن:**

**قسم الاستخدام الرشيد للدواء**

- العنوان: شفا بدران، شارع أحمد قطيشات، ٨١١٩٥١/١١١٨١، عمان، الاردن
- البريد الإلكتروني: jpc@jfd.a.jo
- فاكس: ٩٦٦٢٥١٣٣٠٠٠ +

**للاتصال ب AbbVie Biopharmaceutical GmbH:**

**الوكيت:**

الخط الساخن: ٩٦٥٢٢٠٥٢٠٢٤ +

البريد الإلكتروني: PV.MEA@abbvie.com

**الأرذن:**

الخط الساخن: ٩٦٦١٧٠١٢٢٩٤٦ +

البريد الإلكتروني: PV.MEA@abbvie.com

٥. **كيف يتم تخزين كوميبيجان**

يخفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول ومرأى الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية

احفظ الزجاجة في العبئة الخارجية لحمايتها من الضوء.

لا تستعمل أكثر من زجاجة في وقت واحد.

لا تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكورة على مُلصق الزجاجة وعلى العبئة الخارجية أمام العلامة "EXP". تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى آخر يوم في ذلك الشهر.

يجب أن تتخلص من الزجاجة بعد أربعة أسابيع من فتحها، حتى إذا تبقى بداخلها بعض النقط، وذلك لتجنب العدوى.

لمساعدتك على تذكر ذلك، اكتب تاريخ فتح الزجاجة في المسافة الخالية على العبئة.

لا ينبغي التخلص من الأدوية بإلقائها في مياه الصرف، أو مع القمامة المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم يعد لها استعمال. هذه الإجراءات تساعد على حماية البيئة.

٦. **محتويات العبوة و معلومات أخرى**

**محتويات كوميبيجان**

- المواد الفعالة هي بريمونيدين تارترات و تيمولول.
- يحتوي الملليتر الواحد من المحلول على ٢ ملليجرام بريمونيدين تارترات و تيمولول مالبات بما يكافئ ٥ ملليجرام تيمولول.
- المكونات الأخرى هي كلوريد بنز الكونيوم (مادة حافظة)، فوسفات صوديوم أحادي القاعدة أحمادي التميؤ، فوسفات صوديوم ثنائي القاعدة سياعي التميؤ، وماء منقى. يمكن إضافة كميات صغيرة من حمض الهيدروكلوريك أو هيدروكسيد الصوديوم لتصحيح الأس الهيدروجيني للمحلول (درجة الحموضة أو القلوية للمحلول).

**شكل كوميبيجان ومحتويات العبوة**

كوميبيجان هو قطرة للعين في شكل محلول رائق، لونه أصفر مائل إلى الأخضر، في زجاجة بلاستيكية ذات غطاء لولبي. كل زجاجة ممثلة إلى نصفها تقريباً، وتحتوي على ٥ مليلتر من المحلول. العبوات المتوفرة بها زجاجة واحدة أو ثلاث زجاجات. قد لا تكون كل أحجام العبوات متاحة في كل الأسواق.

**الجهة المسؤولة عن التصنيع و الجهة المسؤولة عن إصدار التشغيلة:**

أليرجان فارماسوتيكالس أيرلندا،

كاسليار رود،

وستنورت،

كو كايو،

أيرلندا.

**الشركة المالكة لحق التسويق:**

أبفي ليمتد

سيتي ويست بزنس كامبوس

دبلن ٢٤

أيرلندا

روجعت هذه النشرة آخر مرة في أبريل ٢٠٢٢

( **هذا دواء** )

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يُعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب، وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، و تعليمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما الخياريان بالدواء وبغوائه ومخاطره.
- لا تقطع من تلقاء نفسك مدة العلاج الموصوفة لك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- يجب حفظ الأدوية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيدالة العرب

# abbvie