

Extra

بانادول



بانادول إكسترا مع أوبتيروب

(أقراص مغلفة)

نشرة معلومات المريض

ما هو بانادول إكسترا مع أوبتيروب وما هي دواعي استعماله،

المكونات،

كل قرص يحتوي على: باراسيتامول ٥٠٠ ملغم، كافيين ٦٥ ملغم

المكونات الأخرى،

جوهرة القرص: نشاء مسبق التجلث، بوفيدين، كربونات الكالسيوم، كروسوفيدون، حمض الأجنثيك، مغنيزيوم ستيريات (صوديوم ميثيل، صوديوم إيثيل و صوديوم بروميد) باراهيدروكسيبنزوات.

غطاء القرص: ثاني أكسيد التيتانيوم، هايبروميلوز، ماکروجل، بوليبيروبوات ٨٠، شمع الكرنوبيا.

تحتوي أقراص بانادول إكسترا مع أوبتيروب على الباراسيتامول وهو مسكن للألم وخافض للحرارة، والكافيين الذي يعضف للتأثير المسكن للباراسيتامول.

يستخدم بانادول إكسترا مع أوبتيروب لعلاج الحرارة والألم البسيط إلى المعتدل مثل الصداع، الصداع النصفي، وآلم الأسنان، والالتهاب المفاصل، والروماتيزمي، وآلم الدورة الشهرية، ولعلاج الأعراض الناتجة عن نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق.

كيفية تناول بانادول إكسترا مع أوبتيروب،

للتناول عن طريق الفم فقط.

البالغين (بما في ذلك كبار السن) والأطفال الذين يزيد عمرهم عن ١٢ سنة، تناول قرصاً أو قرصين، كل ٤ - ٦ ساعات حسب الحاجة.

- لا تتناول أكثر من ٨ أقراص (٤٠٠٠ ملغم باراسيتامول/٥٢٠ ملغم كافيين) خلال ٢٤ ساعة.

- لا تتناول أكثر من مرة كل ٤ ساعات.

- لا تستخدم لأكثر من ٧ أيام بدون استشارة طبيبك.

الأطفال،

- لا يجوز إعطاؤه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٢ سنة.

قبل تناول بانادول إكسترا مع أوبتيروب،

أ - لا تتناول بانادول إكسترا مع أوبتيروب في حال:

كنت تعاني من حساسية مفرطة للباراسيتامول أو الكافيين أو لأي من مكونات المنتج.

ب - تناول بانادول إكسترا مع أوبتيروب بحذر في حال:

كنت مصاباً بقصور في الكبد أو الكلى، استشر طبيبك قبل تناول هذا المنتج.

• لا تتجاوز الجرعة المذكورة.

• إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت أو ظهرت أعراض جديدة، استشر الطبيب كون هذه الأعراض قد تشير إلى حالة خطيرة.

• هذا الدواء يحتوي على مادة الكافيين- تجنب الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين (مثل الشاي، القهوة والمشروبات المغلقة التي تحتوي على الكافيين) مع تناول هذا الدواء. وقد يؤدي تناول الكافيين بكميات عالية إلى صعوبة في النوم، والرعشة، والشعور بعدم الراحة في الصدر بسبب رجفة ضربات القلب.

• هذا المنتج يحتوي على الباراسيتامول. لا تستعمل مع أي أدوية أخرى تحتوي على الباراسيتامول.

• هذا المنتج يحتوي على الصوديوم ميثيل - الصوديوم إيثيل - والصوديوم بروميد باراهيدروكسي بنزوات (E217, E215, E219) التي قد تسبب الحساسية (ربما تتأخر)

• احفظ هذا المنتج وجميع الأدوية بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

ج - القيادة والعمل على الآلات: من المستبعد أن يكون له تأثير سلبي على القدرة على قيادة السيارات أو تشغيل الآلات.

د - العمل والرياضة: بسبب الكافيين الذي يحتوي عليه هذا المنتج، لا يجوز استعماله خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

هـ - تناول أدوية أخرى: يمكن تعزيز تأثير الأدوية المضادة للتجلط والوارفارين وغيرها من

الكومارينز إثر الاستعمال اليومي المطول المنتظم للباراسيتامول مع زيادة في خطر النزيف: الجرعات العرضية ليس لها أي تأثير ملحوظ.

توقف عن استعمال هذا المنتج واستشر طبيبك فوراً في حال،

• حدوث ردود فعل حساسية مثل الطفح الجلدي أو الحكة، وأحياناً مع مشاكل في التنفس أو تورم في الشفتين واللسان والحلق أو الوجه.

• حدوث طفح جلدي أو تشقش أو تقرحات في الفم.

• واجهت مسبقاً مشاكل في التنفس أو تشنّج قصبي مع تناول الأسبيرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويديّة، وحدثت ردة فعل مشابهة مع هذا المنتج.

• ظهور كدمات غير مبررة أو نزيف.

اتصل بطبيبك فوراً إذا علمت بأنك قد تجاوزت الجرعة المحددة.

الباراسيتامول

يجب اتخاذ تدابير طبية فوراً في حالة الجرعة المفرطة خشية حدوث تلف الكبد، حتى وإن لم تظهر أعراض الجرعة المفرطة.

تناول جرعات مفرطة عالية تتجاوز ١٠ غراماً من باراسيتامول قد يسبب تلف الكبد.

والأعراض المبكرة قد تشمل شعوب، وغثيان، وتقيؤ، (تعرق غزير)، وبعكة عامة.

الأدلة السريرية والمختبرية لتلف الكبد قد لا تكون واضحة إلا بعد ٤٨ إلى ٧٢ ساعة عقب الابتلاع. ينبغي أن تعالج الجرعة المفرطة فوراً عن طريق غسل المعدة يليها إعطاء الترياق

إن - أسيتيل سيستائين أو ميثيونين بالوريد دون انتظار نتائج مستويات الباراسيتامول في البلازما. ويجب توفير تدابير داعمة عامة. عادةً يجب إعطاء ترياق إضافي لتفادي

مستويات الباراسيتامول المرتفعة في البلازما والوقت المنقضي بعد التسهم. في جميع الحالات التي يشتبه فيها تناول جرعة مفرطة، تكون العناية الطبية العاجلة أمراً حاسماً

للكبار وكذلك للأطفال. حتى وإن لم تلاحظ أية علامات أو أعراض.

الكافيين،

قد تؤدي الجرعة المفرطة من الكافيين إلى ألم في المعدة، والتقيؤ، إدرار البول، سرعة ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، الأرق، وعدم الراحة، والإثارة، والعصبية، والهزات، والتشنجات.

ولا بد من الإشارة إلى أنه بالنسبة للأعراض الإكلينيكية الهامة من الجرعة الزائدة من الكافيين كي تحدث مع هذا المنتج، فإن الكمية المبتلعة لا بد وأن ترافق مع سمية خطيرة

• يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية.

• احفظه بعيداً عن الضوء والحرارة.

• هذا المنتج محمي في بئور مختمة، لا تستخدمه إذا كان هناك تلف في البئور.

هذا منتج دوائي

- الدواء هو منتج له تأثير على صحتك، و تناوله بشكل مغاير للتعليمات قد يعرضك للخطر.
- اتبع وصفة الطبيب بدقة وكذلك إرشادات الاستعمال المعطاة لك من الصيدلي.
- إن الطبيب والصيدلي كلاهما خبيرين في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا توقف فترة العلاج المحددة في الوصفة الطبية من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة من دون استشارة طبيبك.

احفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدالة العرب



GlaxoSmithKline

بانادول™ علامة مسجلة لمجموعة شركات جلاكوسميث كلاين.
صنّع من قبل جلاكوسميث كلاين دارنجانارن ليعتمد، أيرلندا.

Knockbrock Dunganvar Co.
Waterford, IRELAND.

تم التحديث على أساس GDS V2

تاريخ المراجعة، يناير ٢٠١٢