



بانادول سَيِّنْسْ أقراص كبسولية نشرة معلومات المريض

– في يزيد الباراسيتامول تركيزات الكورامينفيلوك
في ترتفع احتمالية التعرض لخطر الإصابة بالتهشم بالباراسيتامول في المرضى الذين يتناولون عقاقير أخرى ربما تكون
سامة لتلك أو عقاقير تعطر الإزيمات الميكروسومية الكبدية مثل الكحوليات ومضادات التشنجبات
– في بتأثر أفرار الباراسيتامول وتغير تركيزاته في البلازما عند إعطائه مع البروبيسويد
– يقل الباراسيتامول من امتصاص الباراسيتامول إذا أُعطى أثناء ساعة واحدة بعد تناول الباراسيتامول.
الرجاء إبلاغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول:
– فلوكساسيلين (مضاد حيوي) بسبب زيادة خطورة الإصابة بانسحاب في الدم والوسائل (الحماض الأضي المرتفع
الرقى الأيوني) والذي يجب أن نعالج به بأسرع وقت ممكن، وقد يحدث بصفة خاصة في حالة الإصابة بالصدور الكلوي
الحاد، والتشم (عدوى دموا البكتريا وسوموما في الدم، ما يؤدي إلى تلف العضو)، سوء التغذية، إيمان الكحول المزمن، وفي
حالة تناول الحد الأقصى للجرعة اليومية من الباراسيتامول.
لوحتظ التفاعلات التالية مع السويديفيريون:
– في تؤدي مضادات الاكتئاب مثل: مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ومثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين (MAOIs) إلى ارتفاع
خطر في ضغط الدم أو نوبة فرط ضغط الدم.
– في يؤدي تناول الزمان للنتجات التي تحوي على السويديفيريون هيدروكلوريد ومثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين (أو خلال
أسبوعين من وقف استخدام مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين) إلى نوبة فرط ضغط الدم.
– استخدام الدم الزمان بالزمان مع الأدوية المضرة للجهاز السيتوي (مثل: مثيلات الاحتقان، ومثبطات الشبيهة والمنهآت النفسية
الشبيهة بالأمفيتامين) التي تتداخل مع تفرص أمينات محاذي الودي السيتوي، قد تسبب في بعض الأحيان ارتفاعاً في ضغط الدم.
– في تعاكس المنجات التي تحوي على السويديفيريون تأثير فئات معينة من خاضعات ضغط الدم (مثل، مثبطات مستقبلات
بيتا، ومثبط دوبا، والبريزبرين، والديبريسكوبين، والغريتاينين)
– في الحقل والفرص:

يجب عدم استعمال هذا الدواء أثناء الحمل والرضاعة بدون استشارة طبيبك.
من يبيت للأشخاص السويديفيريون أثناء الحمل على الرغم من الانتشار الواسع لاستخدامه في سنين عديدة.
لذلك، يجب توخي الحذر من خلال مراقبة المنافع التي تتحملها عليها الحمل مع المخاطر المحتملة على الجنين.
في أفرار السويديفيريون في حليب الأم يكتمل عليه، أن تأثر تلك على الرضيع غير معروف.
هـ. **قيامة المركبات واستخدام الآلات:**
ينصص المرضى بعدم القدرة أو تشغيل الآلات في حال الشعور بدوخة.
التأثيرات الجانبية المحتملة
توقع أن استخدام هذا الدواء وانتشر طبيبك فوراً في الحالات التالية:

– في حالات نادرة جداً: نقص الصفائح الدموية، حساسية مفرطة، تفاعلات حساسية جلدية مفرطة تشمل على سبيل المثال لا
الحصر: تورخ الحنجر، وذمة وعائية، متلازمة ستيفنز جونسون والتهلل البشري الحشري الشمسي، تشنج قضي في
المرضى الذين لديهم حساسية تجاه الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى. احتلال وطفان الكبد...
السويديفيريون هيدروكلوريد:
– في تناول الأعراض أحياناً حساسية، وصعوبة النوم، والدوخة، وجفاف الفم، والغثان، والتقيؤ. وتعتبر الهلوسة من التفاعلات
النادرة. تشنج رقاب القلب، الغثان، زيادة في ضغط الدم (لوحتظ زيادة في ضغط الدم والجرعات الملحية من
السويديفيريون على لها أي تأثير ملحوظ على ضغط الدم)، والطفح الجلدي، والتهاب الجذع الشمسي (مثل التشنج القضي
والوذمة الوعائية).
– في ريدول بعد مرهولة مثل الهياج، والتصلل، والتهاب البول، واحتباس البول (التي يحدث عادة مع انسداد مجرى المثانة
مثل تضخم البروستاتا).

الجرعة الزائدة
أخطب المشورة الطبية فوراً في حال تناول جرعة زائدة، حتى إذا لم تظهر أعراض الجرعة الزائدة.
الباراسيتامول:
– في تؤدي الجرعة الزائدة من الباراسيتامول إلى الإصابة بشلل كبدي، وهو ما يتطلب الخضوع لزراعة كبد أو في يودي إلى الوفاة.
لوحتظ حدوث التهاب الكبد الحاد مع احتلال وطفان الكبد. يجب تقديم المعالجة الطبية الفورية في حال تناول جرعة زائدة، حتى
إذا لم تظهر أعراض الجرعة الزائدة.
في يستلزم الأمر تناول إن أسيتيل ميسيتين أو ميتونين.

– في تؤدي الجرعة الزائدة من السويديفيريون إلى أعراض نتيجة تخفيف الجهاز العصبي المركزي والقلب والأوعية الدموية.
على سبيل المثال: هياج، وتصلل، وهلاوس وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب. في الحالات الشديدة، قد يحدث ذهان،
وتشنجات، وجعيرة ونوبة فرط ضغط الدم. قد تنخفض مستويات البوتاسيوم في مصل الدم بسبب التغيرات خارج الخلية في مستوى
البوتاسيوم.
يجب أن يتألف العلاج من تدابير داعمة قياسية.
يجب أن تكون مضادات حيوية المضاعفات الطبية والغتية ونقص بوتاسيوم الدم.
تحذير بشأن تناول سبيس
يخطف في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.
مجمو الحجم: ٢٠ قرصاً (١٢ x قرصاً)
هذا الدواء يحميته شروط ملغتي. مثل: الشريط القاعقي أو كأي من الشريط القاعقي أو الغلاف الفويل مكمراً.

هناك منتج دوائي
الدواء هو منتج له غرضه على مسكته، ويتولاه بشكل مغاير لتعليمات أو يعرضه للخطر.
إنه يفتق ويستخدم بطريقة غير الصحيحة للاستخدام وتعليمات الصيدلي التي ياتح الدواء.
إنه يفتق ويستخدم للاستخدام بطرق غير الصحيحة للاستخدام وتعليمات الصيدلي التي ياتح الدواء.
لا تفرق فترة العلاج المحددة في الوصفة الطبية من تلقاء نفسك.
لا تكون نفسك من دون استشارة طبيبك.
أخطظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدلانية العرب

– في الدواء يعطى على الباراسيتامول والسويديفيريون... لا تستخدمه مع منتجات أخرى تحتوي على الباراسيتامول أو منتجات
مماثلة للاحتقان، بما في ذلك الأدوية السعالية وتزلات الرتر...
– أخطظ هذا الدواء وجميع الأدوية بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.
– في مراجعة طبيبك في حال استمرار الأعراض أو عدم تحسنها، أو تطهر أو ظهور أعراض جديدة.
ج. **شكول أدوية أخرى:**
– في يؤدي الاستخدام اليومي المنتظم لفترة طويلة للنتجات التي تحتوي على الباراسيتامول إلى تعزيز التأثير المضاد للتجلط لوارافرين
وغيره من الكومارينات، مع زيادة احتمالية التعرض لخطر الإصابة بزييف، ولكن لا تفرع أعراض العزئية تأثير ملحوظ
– في يزيد امتصاص الباراسيتامول في المعدة في يزيد إفرار المعدة، في سبيل المثال: الميتونول، الكوماراميد
– في ينخفض امتصاص الباراسيتامول بقل المواد التي تخفف إفراز المعدة، على سبيل المثال: البروبيتايلين ومضادات
الاكتئاب ذات الحماض المضادة للعلل الكوليني والمنشطات المنفردة

يجب توخي الحذر على:
باراسيتامول ٥٠٠ ملجم
سويديفيريون هيدروكلوريد ٣٠ ملجم
معلومات أخرى:
– في متنى، بوبودين، بيرجيتاينازيد، الشفاء بزوات الصوديوم، نشا الذرة، حمض الستريك.
– في يزيل احتقان الأنف.
– في مؤقت تخفيف التهاب الجيوب الأنفية ولام الجيوب الأنفية واحتقان الأنف وسيلان الأنف.
– في كانه أحد بعض الحماض، والصداد ويسكن ألم الجسم.

كيف تتناول بانادول سبيس ؟
– في البالغون والأطفال بعمر ١٢ عاماً فأكثر:
– في تناول قرصين كل ٦ ساعات، ولكن لا يجوز تناول أكثر من ثمانية أقراص خلال ٢٤ ساعة.
– في استمر طبيبك إذا استمرت الأعراض لأكثر من ٧ أيام.
– في يجب عدم تناول الدواء لأكثر من بضعة أيام في المرة الواحدة إلا بعد المشورة الطبية.
– في لا تتجاوز الجرعة المقررة أو متخل تكرار الجرعات المقررة.
– في أقل فصل زمني بين الجرعات: ٤ ساعات
– في يجب عدم تناول الأوكسيداز لأكثر من ٤٨ ساعة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ - ١٧ عاماً، إلا وفقاً لاستشارة طبية.
– في لا يجوز إعطاء للأطفال الذين أقل من ١٢ سنة.

في تناول عقار بانادول سبيس
لا. **في تناول بانادول سبيس في حال كنت:**
– في تعاني من الحساسية المفرطة للباراسيتامول أو السويديفيريون أو لأي من مكونات بانادول سبيس.
– في تعاني من ارتفاع خطر في ضغط الدم أو مرض خطير في الشريان التاجي.
– في تناول أدوية أخرى محذرة للجهاز السيتوي (مثل مثيلات الاحتقان، ومثبطات الشبيهة، والمنهآت النفسية الشبيهة
بالأمفيتامين).

تتناول أو قد تناولت خلال الأسبوعين المناسبات مثبطات المناعة (مثل مثيلات الاحتقان، ومثبطات الشبيهة، والمنهآت النفسية الشبيهة
بالأمفيتامين).
– في يجب عدم تناول هذا الدواء مع منتجات أخرى تحتوي على الباراسيتامول أو السويديفيريون أو أي من مكونات بانادول سبيس.
– في تعاني من ارتفاع خطر في ضغط الدم أو مرض خطير في الشريان التاجي.
– في تناول أدوية أخرى محذرة للجهاز السيتوي (مثل مثيلات الاحتقان، ومثبطات الشبيهة، والمنهآت النفسية الشبيهة
بالأمفيتامين).

ب. تناول بانادول سبيس بغير حق في حال:
– في يجب عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا المنتج في حال كنت:
– في مصاب بمرض في وظيفة الكبد أو قصور بسيط إلى متدل في الكلى
– في تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية، أو عدم انتظام دقات القلب، أو ارتفاع في ضغط الدم، أو زيادة نشاط الغدة
الثرقية، أو تخنص غدة البروستاتا، أو داء السكري، أو جلوكوما الزاوية المغلقة، أو ورم القولون.
– في تناول مثبطات مستقبلات بيتا أو أدوية أخرى مضادة لارتفاع ضغط الدم.
– في تعاني من حالات اشتداد الغثان، أو مثل تعفن الدم، أو التهاب الكبد حاد.
– في الإصابة بالحماض الأضي، تشمل أعراض الإصابة بالحماض الأضي:
– في الصدوية في التشنج والطفح والبرص، الغثان، التقيؤ، وفان الشبيهة
– في يجب توخي الحذر في حالة تناول الباراسيتامول بالزمان مع فلوكساسيلين بسبب زيادة خطر الإصابة بالحماض الأضي
المرضى الفرق الأوكسيداز (HAGMA)، خاصة لدى المرضى الحماض الكلوي الحاد، والتشم، وسوء التغذية
ومضاد أخرى لنقص الغثان (على سبيل المثال، إيمان الكحول المزمن)، وكذلك الذين يتناولون الحد الأقصى للجرعة
اليومية من الباراسيتامول. ينصح بالمراقبة الدقيقة، وفصل قلاب سنوي - دوكوسبرين في البول.

أصل بالظبط فوراً في حال شمرت بهذه الأعراض.
فوراً وطلب المشورة الطبية إذا حدثت القلوب الأفراري مع استخدام السويديفيريون. يجب التوقف عن تناول السويديفيريون
الإفراري.
– في تناول في حالات نادرة من متلازمة الاعتلال الدماغي الخلقي اللليل للارداد (PRES)/متلازمة تنصيق الأوعية
الدوية الدماغية اللليل للارداد (RCVS) مع استخدام الأدوية المضرة للجهاز السيتوي بما فيها السويديفيريون. وتشمل
الأعراض التي أبلغ عنها الدماغي الشديد، والغثان، والتقيؤ، والاضطرابات البصرية. تشنصت غالبية الحالات أو
تعافت خلال بضعة أيام بعد تقني العلاج المناسب. يجب التوقف عن تناول السويديفيريون وطلب المشورة الطبية فوراً إذا
حدثت إصابة بعلامات/أعراض متلازمة الاعتلال الدماغي الخلقي اللليل للارداد (PRES)/متلازمة تنصيق الأوعية الدموية
الدماغية اللليل للارداد (RCVS).

كانت هناك تقارير عن أحداث تنصيق الأوعية الدموية الجهازية الحادة باستخدام السويديفيريون. تشمل الأمثلة الهامة ما يلي:
– في متلازمة الشريان التاجي الحادة (ACS): تشمل الأعراض ألمًا مفاجئًا في الصدر، وصفيًا، وتعرفاً شديداً، وصعوبة في
التنفس أثناء الراحة.
– في التهاب القلوب الأفراري: تشمل الأعراض ألم البطن المفاجئة وتزييف المستقيم.
– في متلازمة الاعتلال الدماغي الخلقي اللليل للارداد (PRES)/متلازمة تنصيق الأوعية الدموية الدماغية اللليل للارداد
(RCVS): تشمل الأعراض الصداع الشديد، والغثان، والتقيؤ، والاضطرابات البصرية. تشنصت غالبية الحالات أو
تعافت خلال بضعة أيام بعد تقني العلاج المناسب.

يجب التوقف عن تناول السويديفيريون في الفور وطلب المشورة الطبية إذا حدثت إصابة بأي من علامات/أعراض تنصيق
الأوعية الدموية.
– في الإصابة بصداع شديد ومغاير.
– في يجب توخي الحذر في حالة تناول الدواء مع ٠,٦ ملجم من بزوات الصوديوم. لكل قرص وعلى المرضى المازمين بالإلال من الصوديوم في نظامهم
الغذائي أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار.

– في الدواء يعطى على الباراسيتامول والسويديفيريون... لا تستخدمه مع منتجات أخرى تحتوي على الباراسيتامول أو منتجات
مماثلة للاحتقان، بما في ذلك الأدوية السعالية وتزلات الرتر...
– أخطظ هذا الدواء وجميع الأدوية بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.
– في مراجعة طبيبك في حال استمرار الأعراض أو عدم تحسنها، أو تطهر أو ظهور أعراض جديدة.
ج. **شكول أدوية أخرى:**
– في يؤدي الاستخدام اليومي المنتظم لفترة طويلة للنتجات التي تحتوي على الباراسيتامول إلى تعزيز التأثير المضاد للتجلط لوارافرين
وغيره من الكومارينات، مع زيادة احتمالية التعرض لخطر الإصابة بزييف، ولكن لا تفرع أعراض العزئية تأثير ملحوظ
– في يزيد امتصاص الباراسيتامول في المعدة في يزيد إفرار المعدة، في سبيل المثال: الميتونول، الكوماراميد
– في ينخفض امتصاص الباراسيتامول بقل المواد التي تخفف إفراز المعدة، على سبيل المثال: البروبيتايلين ومضادات
الاكتئاب ذات الحماض المضادة للعلل الكوليني والمنشطات المنفردة