

باراماڈ

باراسيتامول 1 غ / 100 مل
 محلول للتسريب الوريدي، كيس متعدد الطبقات ذو 100 مل

المقادير:

- ـ الكلول والباليغ الذي يفوق وزنه 50 كغم : 1 غ من الباراسيتامول في الجرعة (بما يوافق 100 مل من محلول إلى حد 4 مرات في اليوم).
- ـ يجب أن لا تتجاوز الجرعة اليومية القصوى 4 غ.
- ـ الطفل أكثر 33 كغم (تقريباً 11 عاماً)، البالغ والكلول أقل من 50 كغم : 15/كم من الباراسيتامول في الجرعة (بما يوافق 1,5 غ من محلول/كم) إلى حد 4 مرات في اليوم.

- ـ يجب أن لا تتجاوز الجرعة اليومية القصوى 60 غ (بدون تجاوز 3 غ).
- ـ في كل الحالات يجب احتراز مدة زمنية لا تقل عن 4 ساعات بين كل جرعة.
- ـ يجب الأخذ بين الإعتبار كل الأدوية المحتوية على الباراسيتامول والبروباسيتامول.

- طريقة الاستعمال:**
- ـ الحقن داخل الوريد : يتم استعمال محلول الباراسيتامول بالحقن عبر التسريب الوريدي لمدة 15 دق.
 - ـ لدى الطفل، كمية محلول الباراسيتامول هي 1,5 غ/كم/الجرعة.

- يجب التقىد بوصفة الطبيب.**
- ـ الجرعة الزائدة من باراماڈ : عادة ما تظهر الآثار الجانبية خلال 24 ساعة الأولى، منها: غثيان، فيء، انعدام الشهية، شحوب و خطر إصابة الخلايا الكبدية.

- ـ أصل فوراً بطيئيك أو الصيدلاني.
- ـ بتسليان استعمال جرعة من باراماڈ : لا شيء.

- جـ. التوقف عن استعمال باراماڈ :** لا شيء.

- في حالة وجود أي ملاحظات حول استعمال هذا الدواء، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني.**
- ـ **4ـ. الآثار الجانبية من غير مرغوب فيها:** مثل أي دواء يمكن لباراماڈ أن يؤدي إلى ظهور تأثيرات غير مرغوب فيها رغم عدم ملاحظتها عند كل استعماله لهذا الدواء.

- ـ في حالات نادرة (أقل من 1/10000 وأقل من من 1/1000) : فاق، إنخفاض في ضغط الدم أو تغيرات بيولوجية: ارتفاع غير عادي للانزيمات الكبدية.

- ـ في حالات نادرة جداً (أقل من 1/10000) : طفح جلدي أو ردود فعل أرجحية خطيرة. يجب التوقف على الفور عن استعمال الدواء و استشارة الطبيب.

- ـ الشعور بالألم و حرق في موقع الحقن قد تكون مرتبطة بسرعة بداية التسريب الوريدي. لوحظت حالات احمرار الجلد، هبة الحرارة، حكة و ارتفاع غير طبيعي لانظام القلب في حال تفاقم أي من هذه التأثيرات أو ظهور تأثيرات غير مرغوب فيها غير مذكورة في هذه النشرة، يجب الاتصال بالطبيب أو الصيدلاني.

- 5ـ. طرروف تغزير باراماڈ :**

- ـ قبل فتح الغلاف الخارجي: يحفظ في درجة حرارية لا تتجاوز 30 درجة مئوية.
- ـ بعد فتح الغلاف الخارجي: ينصح باستعمال الدواء على الفور.

- ـ لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد صالحة للاستعمال. هذه الإجراءات تساعد على حماية البيئة.

6ـ. معلومات إضافية:

- ـ ماهي محتويات باراماڈ : المادة الفعالة هي: باراسيتامول بتركيز 1 غ / 100 مل.

- ـ سواقات: على ذكر أحدى الإماثة، حمض الأسيتيك الثالجي، أسيتات الصوديوم ثلاثة إماهات، سيدرات الصوديوم ثالثي الإماثة، هيدروكسيد الصوديوم وأو حمض الهيدروكلوريك، ماء صالح للحقن.

- ـ ماهي الشكل الصيدلاني لباراماڈ و حجم عبوته:

- ـ باراماڈ هو محلول للتسريب الوريدي معلب في أكياس متعددة الطبقات في غلاف خارجي من الألuminium ذات 100 مل. عليه تغزير على 6 أكياس.

- جـ. اسم و عنوان مالك رخصة التسويق والمصنع:**



مخابر يونيميد

- المبنية الصناعية القلعة الكبرى ص.ب: 38 - 4060 تونس
الهاتف: (+216) 73 342 472 - الفاكس: (+216) 73 342 669

- موقع الويب : www.unimed.com.tn

- دـ. تمت الموافقة على هذه النشرة بتاريخ {xx/01/2022}، رقم النسخة : xx

- ـ رقم التسجيل بلبنان : XXXXXXXX

إن هذا دواء

- ـ هذا مستحضر يوثر على صحتك و استهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر. هذا.
- ـ أتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرحتها لك.
- ـ الطبيب والصيدلاني هما المفترض بالذرة و ينفعه و ضرره.
- ـ لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تغافل نفشك.
- ـ لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- ـ لا ترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل استعمال هذا الدواء
ـ احتفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.

ـ إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية، و لهذا يجب عليك عدم (اعطائه

لأي شخص حتى و إن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق و أن عانيت منها.

ـ قم بالاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلاني في حال زيادة التأثيرات الجانبية أو الإصابة بعرض

جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

ـ تحتوي هذه النشرة على :

1ـ ما هو باراماڈ و ماهي دواعي استعماله

2ـ قبل القيام باستعمال باراماڈ

3ـ طريقة استعمال باراماڈ

4ـ التأثيرات الغير مرغوب فيها

5ـ طرروف تغزير باراماڈ

6ـ معلومات إضافية

1ـ ما هو باراماڈ و ماهي دواعي استعماله

ـ مسكن (مهدئ للآلام) و مضاد للحمى (خافض للحرارة).

2ـ دواعي الاستعمال:

ـ علاج لمدة وجية لآلام معتدلة خاصة ما بعد الجراحة، و العلاج قصير المدى للحمى و ذلك عندما يكون السبيل الباراسيتامول أو البروباسيتامول (مسكن آخر عبر التسريب الوريدي من سلسلة الباراسيتامول) أو لأحد سواقات هذا الدواء.

ـ داء خظير في الخلايا الكبدية.

ـ الحساسية المفرطة لباراسيتامول أو البروباسيتامول (مسكن آخر عبر التسريب الوريدي من سلسلة الباراسيتامول) أو لأحد سواقات هذا الدواء.

ـ في حالة وجود شك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

3ـ الآثار الجانبية عند استعمال باراماڈ :

ـ يجب اتباع علاج مسكن للألام عبر الفم كلما أمكن.

ـ في حالة مرض كبدى أو كلوى أو إدمان على الكحول.

ـ عند استعمال أدوية أخرى محتوية على الباراسيتامول.

ـ في حالة سوء التغذية أو جفاف الماء من الجسم.

ـ يحتوي هذا الدواء على الصوديوم إن كمية الصوديوم هي أقل من 1 ميلي مول / 100 مل، أي "دون صدور".

ـ في حالة وجود شك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

4ـ التداخلات الدوائية من أحد هذا المستحضر مع أي دوائية أخرى أو أعشاب أو مكمالت غذائية :

ـ يحتوي هذا الدواء على الباراسيتامول : يجب الأخذ بعين الإعتبار في حالة استعمال أدوية

ـ أخرى محتوية على الباراسيتامول أو البروباسيتامول لتجنب خطر تجاوز المقدمة المحددة

ـ بحسب إعلام الطبيب في حالة استعمال أدوية أخرى محتوية على الباراسيتامول أو البروباسيتامول.

ـ لا تتوانوا في استشارة الطبيب أو الصيدلاني عند استعمال أدوية أخرى بما في ذلك المأكولة بدون وصفة طبية.

ـ استعمال باراماڈ مع الطعام و الشراب :

ـ لا شيء.

5ـ الحمل والرضاع :

ـ يمكن استعمال باراماڈ خلال فترة الحمل، لكن يجب على الطبيب تقييم مدى فعاليته.

الإرضاع :

ـ يمكن استعمال باراماڈ خلال فترة الإرضاع.

ـ استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.

ـ تأثير باراماڈ على القيادة واستعمال الآلات :

ـ لا شيء.

3ـ طريقة استعمال باراماڈ :

ـ يجب دائم استعمال باراماڈ حسب الموصفات الطبية. في حالة وجود شك لا تتوانوا في

ـ استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

ـ و تأثير باراماڈ على القيادة واستعمال الآلات :

ـ لا شيء.

4ـ طريقة استعمال باراماڈ :

ـ يجب دائم استعمال باراماڈ حسب الموصفات الطبية. في حالة وجود شك لا تتوانوا في

ـ استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

ـ و تأثير باراماڈ على القيادة واستعمال الآلات :

ـ لا شيء.