

أقوتين - أي كريم

٥٪ كريم
٥٪ وزن/وزن



طريقة الاستخدام:
اغسل وجهك برفق بصابون لطيف وماء الدافى وجفف بشرتك بمنشفة. اعصر كمية بحجم حبة البازلاء على أناملك. ضع الكريم على المناطق المصابة فقط ، ولا تطبه على وجهك بالكامل.

مدة العلاج:
الحصول على أفضل النتائج مع أقوتين - أي، من الضروري استخدامه بشكل صحيح وعدم التوقف عن استخدامه بمجرد أن يبدأ جب الشباب في التحسن. عادةً ، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع للحصول على التأثير الأمثل. يرجى الاتصال بطبيبك إذا استمرت الأعراض لأكثر من ١٢ أسبوعاً ، لإعادة تقييم العلاج.

إذا كنت تستخدم أقوتين - أي أكثر مما يجب:
لن تحصل على نتائج أسرع أو أفضل باستخدام أقوتين - أي أكثر من الموصى به. إذا كنت تستخدم الكثير من الأحمرار ، فقد يحدث تقطير أو انزعاج. في مثل هذه الحالات ، يجب غسل الوجه بلفظ

صابون خفيف وماء فاتر. يجب التوقف عن استخدام هذا الدواء حتى تختفي كل هذه الأعراض.

أقوتين - أي يستخدم فقط على الجلد. في حالة الابتلاع العرضي ، اتصل بطبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم إصابات في المستشفى على الفور.

إذا نسيت استخدام أقوتين - أي:
إذا نسيت استخدام أقوتين - أي في وقت النوم ، يجب عليك تطبيق الجرعة التالية في الوقت المعتاد. يجب لا تضاعف الجرعة لتعزيز الجرعة المنسية.
إذا كان لديك أي سؤال آخر حول استخدام هذا المنتج ، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية الممحتلة:

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية ، على الرغم من عدم حصول الجميع عليها.

غير شائع: قد يصيب ما يصل إلى ١ من كل ١٠٠ شخص

• جب الشباب ، جفاف الجلد ، احمرار الجلد ، زيادة إفراز الزهم ، تفاعلات الحساسية للضوء ، الحكة ، الطفح الجلدي ، تقرش الجلد ، قشور الجلد ، حرقة الشمس

• ردود فعل موقع التطبيق مثل حرق الجلد الملتهب والجفاف وأحمرار الجلد

نادر: قد يصيب ما يصل إلى ١ من كل ١٠٠٠ شخص

• فرط الحساسية
• التهاب الجلد ، الهرس البسيط (الفرحة الباردة) ، طفح جلدي (يقع صغيرة ، مسطحة ، حمراء) ، نزيف الجلد ، إحساس بحرقان الجلد ، فقدان تصبغ الجلد ، تهيج الجلد.

• أعراض موقع التطبيق مثل التهيج والتورم وتلف الجلد السطحي وتغير اللون والحكمة والقشور

• الشعور بالألم

إذا كان لديك أي آثار جانبية ، فحدث مع طبيبك أو الصيدلي. وهذا يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مرددة في هذه النشرة.

٥. كيفية تخزين أقوتين - أي كريم:

• احفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

• لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الكرتون. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

• لا تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

• يحفظ بدرجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية. بعيداً عن الضوء.

٦. مزيد من المعلومات:

على ماذا يحتوي أقوتين - أي كريم:

المادة الفعالة هي تريتيونين ، كل جرام من أقوتين - أي كريم يحتوي على ٠١٥ مجم تريتيونين .

المكونات الأخرى:

سيتاريثر ٦ مع كحول ستريل ، سيتاريثر ٢٥ ، مونوستياريت الجليسيريل ، كحول السيتاييل ، فازلين ، شمع العسل الأصفر ، أوكتانات سيتارييل ، إيميدوريا ، ميثيل بارابين ، بروبيل بارابين ، بروباليدين جلايكول ،

ثاني أوكسيد النيتانيوم ، بيوتيل هيدروكسى أنيسول ، ماء نقى.

كيف يبدو أقوتين - أي ومحظيات العبوة:

أقوتين - أي كريم متعدد أصفر ناعم يأتي في أنبوب الالمنيوم قابل للطي سعة ٣٠ جم. بالكثير من الماء الفاتر.

المالك لحقوق التسويق والشركة المصنعة:

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية المحدودة (أفالون فارما)

ص.ب. ٤١٨٠ ، المدينة الصناعية الثانية، الرياض - ١١٤٩١ ، المملكة العربية السعودية

هاتف: ٠٠٩٦٦ ٣٤٢٧ - ٢٥٦ ٣٩٤٨ - ٢٢٦٥ ٣٩٤٨ - ٢٢٦٥ ٤٧٢٣ (١١) ٩٦٦

فاكس: ٠٠٩٦٦ ٤٧٢٣ (١١) ٩٦٦

تمت آخر موافقة على هذه النشرة بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠

رقم النسخة: ٢

مدة الصلاحية: ٢٤ شهراً

للإبلاغ عن أي آثار جانبية:

• المملكة العربية السعودية

الحمل والرضاعة والخصوصية:

لا تستخدم منتجات الجلد التي تحتوي على البنزويول بيروكسايد أو الكبريت أو الريبيرونيل أو حمض الساليسيليك ما لم يوجه الطبيب خلاف ذلك. يمكن أن تسبب هذه المنتجات تهيجاً شديداً للجلد

إذا تم استخدامها مع تريتيونين بشكل موضعي.

من غير المحمّل أن يتأثر الدواء المستخدم على الجلد بالعقاقير الأخرى التي تستخدمها. ولكن العديد من الأدوية يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض.

آخر طبيبك أو الصيدلي عن جميع الأدوية التي تستخدمها ، بما في ذلك الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية والفينامينات والمنتجات العشبية.

لا تستخدم أقوتين - أي كريم إذا كنت حاملاً أو تفكرين في الحمل. يمكن أن يعطيك طبيبك المزيد من المعلومات.

إذا كنت امرأة في سن الإنجاب ، فيجب عليك استخدام وسائل منع الحمل أثناء استخدام هذا الدواء لمدة شهر بعد التوقف عن العلاج.

القيادة واستخدام الآلات:

من غير المحمّل أن يكون له أقوتين - أي تأثير على القدرة على القيادة أو تشغيل الآلات.

تحتوي أقوتين - أي على ميثيل بارابين وبروبيل بارابين وبيوتيل هيدروكسى أنيسول وبروباليدين جلايكول

قد يسبب أي من ميثيل بارابين أو بروبيل بارابين الحساسية.

قد يسبب بيوتيل هيدروكسى أنيسول تفاعلات جلدية موضعية (مثل التهاب الجلد التحسسي) ، أو تهيج العين والأغشية المخاطية.

قد يسبب بروباليدين جلايكول تهيج في الجلد.

٣. كيف تستخدم أقوتين - أي كريم:

استخدم هذا الدواء دائمًا تماماً كما أخبرك طبيبك. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.

المركز الوطني للتبيظ والسلامة الدوائية	
• الإتصال بالإدارة التنفيذية للتبيظ والسلامة الدوائية.	
• هاتف: ٢٠٢٢٢ - ١١ - ٩٦٦ +٩٦٦ ٢٣١٧ - ٢٣٥٦ - ٢٢٣٤ - ٢٣٥٤ - ٢٣٤٠	
• فاكس: ٢٦٦٢ - ٢٠٥ - ٩٦٦	
• الهاتف المجاني: ٨٠٠٤٩٠٠٠٠	
• البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa	
• الموقع الإلكتروني: www.sfda.gov.sa/npc	

ان هذا الدواء	
- الدواء مستحضر يوزر على صحتك. واستهلكه خلاف التحذيمات بعرضك للخطر.	
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.	
- إن الطبيب والصيدلي هما الخبران في الدواء وبنفعه وضرره.	
- لا تقطع مدة الدارج المحددة لك من تناوله.	
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.	
- لا تترك الأدوية في متناول اليدي الأطفال.	

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادة العرب

الجرعة الموصى بها هي:

يجب تطبيق كمية بحجم حبة البازلاء من أقوتين - أي مرة واحدة يومياً في وقت النوم.