

## Novartis

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

نوفارتيس

- إذا كنت تتلقى بعض العلاجات المضادة للفيروسات مصحابة عقار ريفولاد لعلاج نقص الصُّفَّاثُعِ الدَّمويَّة الناجم عن فيروس التهاب الكبد من النوع "سي"، فقد تتفاقم بعض مشاكل الكبد. لذلك، يجب فحص وظائف الكبد لديك قبل وأثناء العلاج بعقار ريفولاد. سيقيم طبيبك بالترتيب لإجراء الاختبارات اللازمة. في بعض الحالات قد يكون من الضروري إيقاف العلاج بعقار ريفولاد.

المراقبة أثناء علاجك بعقار ريفولاد
يُفَضَّلُ عقار ريفولاد تَكونُ صفائح دموية جديدة في نخاع العظمي. لذلك، سيفحص طبيبك تعداد خلايا الدَّم لديك بانتظام، وإذا لزم الأمر، سيدل جرعة عقار ريفولاد وفقًا لذلك أو سيقوم بإيقاف علاجك مؤقتًا. المرض الذي يعاني من مرض كبدي مزمن ومتقدم وانخفاض تعداد الصفائح الدموية يكونون أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالآثار الجانبية، والتي قد تشمل حدوث مشاكل بالكبد تؤدي إلى الوفاة. إذا قرر طبيبك أن الفوائد تفوق المخاطر، فسيقوم بمراقبة حالتك أنت/ طفلك عن كثب أثناء العلاج.

قد يعاني المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و17 عامًا ممن وُصِف لهم عقار ريفولاد من انخفاض تعداد خلايا الدَّم (العدلات). لذلك، سيُجري طبيبك اختبارات الدم لطفلك بصفة منتظمة وسيُجري تعدادات إضافية لخلايا الدَّم في حالة الإصابة بالحمى. في حالة حدوث حمى مفاجئة، اتصل بالطبيب على الفور.

قد يتضرر مرضى التهاب الكبد من النوع "سي" الذين يتلقون علاجًا مضادًا للفيروسات باستخدام إنترفيرون نزييف شديد بالجهاز الهضمي عند تناول عقار ريفولاد، والذي قد يؤدي إلى الوفاة. سيقاُبك طبيبك عن كثب تمسبًا لهذا.

قد تحدث مشاكل بالقلب (اضطرابات شديدة بالنظم القلبي بشكل رئيسي) أثناء العلاج بعقار ريفولاد. سيقيم طبيبك بفحص القلب لديك/ لدى طفلك بانتظام.

إذا كنت تعاني/ كان طفلك يعاني من فقر الدَّم غير التنسجي الشديد، قد يتضرر نخاع العظمي مما يسبب اضطرابات إضافية بالنخاع العظمي. سيقاُبك طبيبك/ سيقاُبك طفلك عن كثب تمسبًا لهذا.

القابلية للتعرُّض لنزييف بعد إيقاف العلاج
إذا تم إيقاف علاجك بعقار ريفولاد، فسوف يعود تعداد الصفائح الدموية لديك إلى مستويات ما قبل العلاج. من المتوقع أن يحدث هذا حتى 4 أسابيع بعد إيقاف العلاج بعقار ريفولاد. قد يزيد انخفاض تعداد الصفائح الدموية هذا من خطر إصابتك بالنزيف. سيقيم طبيبك بالتَّحقُّق من تعداد الصُّفَّاثُعِ الدَّمويَّة لديك مدة 4 أسابيع على الأقل. آخر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا لاحظت أي كدمات أو نزيف بعد توقفك عن تناول عقار ريفولاد.

المريض من كبار السن (الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر)
توافر بيانات محدودة فقط بشأن استخدام عقار ريفولاد في المرضى البالغين من العمر 65 عامًا فأكثر. يجب استخدام عقار ريفولاد بحذر في المرضى الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

الأطفال والمراهقون (ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا)
لا يُوصى باستخدام عقار ريفولاد لعلاج المرضى الذين يعانون من فرقية نقص الصفائح الدَّمويَّة مجهولة السبب ممن تقل أعمارهم عن عام واحد. أو المرضى الذين يعانون من فيروس التهاب الكبدى من النوع "سي" ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو مرضى فقر الدَّم الانحلالي الشديد ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا. لا يُوصى باستخدام عقار ريفولاد لعلاج المرضى المُصابين بفقر الدَّم الانحلالي الشديد ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا الذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ للأدوية الأخرى. يمكن استخدام عقار ريفولاد مصحابة علاج قياسي كابت للمناعة كخط علاج أول في المرضى المُصابين بفقر الدَّم غير التنسجي الشديد ممن يبلغون عامين فأكثر.

تناول العقار مع أدوية أخرى
يرجى ملاحظة أنه بإمكان بعض الأدوية والمعادن أن تؤثر بشكل كبير على قدرة الجسم على امتصاص عقار ريفولاد. تشمل هذه الأدوية مضادات الحموضة (تستخدم في الغالب لعلاج مشاكل المعدة) والقياسميات والمكملات التي تحتوي على المعادن. لذلك، يجب تناول عقار ريفولاد قبل ساعتين أو بعد 4 ساعات على الأقل من تناول مضادات الحموضة والمكملات التي تحتوي على المعادن (على سبيل المثال: الألومنيوم، الكالسيوم، الحديد، الماغنسيوم، السيلينيوم أو الزنك) أو من تناول منتجات الألبان.

هناك مجموعات معينة من الأدوية التي تتطلب مراقبة إضافية لتعداد الصفائح الدَّمويَّة. تشمل هذه الأدوية لوبينافير/ ريتونافير (أدوية تستخدم لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية) وسيكلوسبورين (يُستخدم في حالات زرع الأعضاء أو أمراض المناعة).

آخر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تعاني أنت/ طفلك من أي أمراض أخرى. أو إذا كان لديك/ لدى طفلك أي حساسية أو إذا كنت تتناول/ يتناول طفلك أدوية لتخفيض مستوى الدهون.

لديك في الدَّم (الستاتينات): لأن عقار ريفولاد قد يزيد تركيز الستاتينات في جسمك.

إذا كنت أنت أو طفلك أو أي شخص في عائلتك قد عانى من قبل من انسداد في الأوعية الدَّمويَّة (تضخُّر الدَّم).

إذا كنت تُعاني أنت/ طفلك أو قد عانيت من قبل من المياه البيضاء.

في الدراسات السريرية التي أجريت على مرضى فيروس التهاب الكبدى من النوع "سي" الذين يعانون من نقص الصُّفَّاثُعِ الدَّمويَّة، حدثت إصابة بالمياه البيضاء بشكل أكثر تكرارًا في المرضى الذين يخضعون للعلاج باستخدام التزويموباج مقارنة بمجموعة العقار المُهمَّوَّة.

إذا كنت أنت/ طفلك مصابًا بحالة أخرى بالدَّم، مثل: متلازمة خلل النَّسج النخاعي؛ لأن عقار ريفولاد يمكن أن يجعل متلازمة خلل النَّسج النخاعي تتفاقم. سيقيم طبيبك بإجراء اختبارات لك/ لطفلك للتَّحقُّق من عدم إصابتك/ عدم إصابة طفلك بهذه الحالة قبل أن تبدأ العلاج بعقار ريفولاد.

آخر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك فورًا إذا تعرضت لأي من الأعراض التالية أثناء العلاج باستخدام عقار ريفولاد:

- إذا أصبت أنت/ طفلك بعلامات انسداد في الأوعية الدَّمويَّة في الساق مثل: تورم، أو وجع في إحدى الساقين.
- إذا كان تعداد الصفائح الدَّمويَّة لديك مرتفعًا جدًا أثناء العلاج بعقار ريفولاد، فستكون أكثر عُرضة لخطر الإصابة بجلطة دموية. مع ذلك، من الممكن أيضًا حدوث جلطات دموية إذا كان تعداد الصفائح الدَّمويَّة لديك طبيعيًا أو منخفضًا.
- إذا كنت مصابًا بتثَلُّث الكبد، فهناك خطر من تَكونُ طبقة دموية في أحد الأوردة الموصلة إلى الكبد (تضخُّر الوريد البابي). تشمل المضاعفات الشديدة بعض أنواع الجلطات الدموية. تَكونُ جلطات دموية في الرئتين. حدوث نوبات قلبية أو سكبات دماغية. سيقيم طبيبك بمراقبة تعداد الصفائح الدَّمويَّة لديك وبتعديل جرعتك أو وقف عقار ريفولاد إذا كان تعداد الصفائح الدَّمويَّة مرتفعًا جدًا.

إذا أصبت أنت/ طفلك بعلامات قصور وظائف الكبد مثل: اصفرار الجلد أو ملتحمته العين (يرقان)، بول داكن اللون بشكل غير معتاد، تعب غير معتاد، ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن. قد يُسبب عقار ريفولاد تلفًا لديك بالكبد وقد يسبب حتى الإصابة بأضرار مهددة للحياة.

- المرضى من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 11 عامًا: 75 مجم مرة واحدة يوميًا لمدة 6 أشهر. يبدأ الأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و 11 عامًا) ذوو الأصول الآسيوية (الصينيون أو اليابانيون أو التايوانيون أو الكوريون أو التايلنديون) العلاج بجرعة بدء منخفضة: 37.5 مجم مرة واحدة يوميًا لمدة 6 أشهر.

- فيما يخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 5 أعوام، تعتمد الجرعة على وزن الجسم: 2.5 مجم/ كجم مرة واحدة يوميًا لمدة 6 أشهر. يبدأ الأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 5 أعوام) ذوو الأصول الآسيوية (الصينيون أو اليابانيون أو التايوانيون أو الكوريون أو التايلنديون) العلاج بجرعة بدء منخفضة: 1.25 مجم/ كجم مرة واحدة يوميًا لمدة 6 أشهر.

سيصف الطبيب لك/ لطفلك العلاج الكابت للمناعة المناسب بالإضافة إلى عقار ريفولاد.

لا تغير الجرعة الموصوفة من تلقا نفسك. إذا اعتقدت أن تأثير دوائك أقوى من اللازم أو أضعف من اللازم، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

متى تتناول عقار ريفولاد
ما لم يتم وصف خلاف ذلك، يجب تناول عقار ريفولاد يوميًا ودايمًا في الوقت نفسه تقريبًا.

يتأثر امتصاص عقار ريفولاد بتناول الكالسيوم. نظرًا لأن منتجات الألبان تحتوي على الكثير من الكالسيوم، يجب عليك تناول/ إعطاء عقار ريفولاد قبل ساعتين أو بعد 4 ساعات على الأقل من تناول منتجات الألبان. يمكنك مناقشة الوقت المثالي لتناول عقار ريفولاد مع طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. على سبيل المثال، لا يمكنك تناول أي منتجات ألبان في المساء ثم تناول عقار ريفولاد قبل الغلوط إلى النوم.

##### المدة اللازمة لتناول عقار ريفولاد

سيتم تحديد مدة العلاج من قبل الطبيب الخاص بالمريض. إذا كنت تتناول/ كان طفلك يتناول عقار ريفولاد مصحابة علاج قياسي كابت للمناعة كخط علاج أول لعلاج فقر الدَّم غير التنسجي الشديد، يجب وقف عقار ريفولاد بعد 6 أشهر. الطبيب قد يأمر/ يأمر طفلك بوقف عقار ريفولاد في وقت أبكر من ذلك.

قد يستغرق عقار ريفولاد أسبوعًا إلى أسبوعين ليبدأ في العمل. يمكن أن يغير طبيبك جرعتك اليومية بناءً على استجابتك لعقار ريفولاد.

إذا أغفلت تناول عقار ريفولاد
إذا أغفلت إحدى الجرعات، فلا تتناول جرعة لتعويض الجرعة التي أغفلتها. بدلًا من ذلك، ببساطة تناول/ أعط الجرعة التالية في الوقت المُعتاد.

إذا توقفت عن تناول عقار ريفولاد
إذا نصحك طبيبك بالتوقف عن تناول عقار ريفولاد، فسيتم مراقبة تعداد الصفائح الدموية لديك أسبوعيًا للأسابيع الـ 4 التالية.

تعليمات لإعداد وإعطاء عقار ريفولاد معلق:
يجب اتباع التعليمات التالية بالضبط عند إعداد معلق عقار ريفولاد الفموي. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي أسئلة أو إذا كان أي مكون مفقودًا أو تالفًا.
سيحدد الطبيب جرعة عقار ريفولاد (بالـ "مجم") التي يجب عليك أخذها/ طفلك تناولها. يجب إعداد الجرعة اليومية الموصوفة من المسحوق المخصص لإعداد المعلق ويتم تناولها وفقًا للجدول 1.

<b>الجرعة اليومية الموصوفة بالـ "مجم"</b>	<b>عدد الأكياس (مسحوق) 25 مجم لكل كيس) التي يجب إذابتها في 20 ملي لتر ماء</b>	<b>حجم المَعلَقِ الفموي بالـ "ملي لتر" الذي يجب تناوله باستخدام السرنجة</b>
6 مجم	كيس واحد	5 ملي لتر
7 مجم	كيس واحد	6 ملي لتر
8 مجم	كيس واحد	7 ملي لتر
9 مجم	كيس واحد	7 ملي لتر
10 مجم	كيس واحد	8 ملي لتر
11 مجم	كيس واحد	9 ملي لتر
12 مجم	كيس واحد	10 ملي لتر
13 مجم	كيس واحد	10 ملي لتر
14 مجم	كيس واحد	11 ملي لتر
15 مجم	كيس واحد	12 ملي لتر
16 مجم	كيس واحد	13 ملي لتر
17 مجم	كيس واحد	14 ملي لتر
18 مجم	كيس واحد	14 ملي لتر
19 مجم	كيس واحد	15 ملي لتر
20 مجم	كيس واحد	16 ملي لتر
21 مجم	كيس واحد	17 ملي لتر
22 مجم	كيس واحد	18 ملي لتر
23 مجم	كيس واحد	18 ملي لتر
24 مجم	كيس واحد	19 ملي لتر
25 مجم	كيس واحد	20 ملي لتر
26 مجم	كيسان	10 ملي لتر
27 مجم	كيسان	11 ملي لتر
28 مجم	كيسان	11 ملي لتر
29 مجم	كيسان	12 ملي لتر
30 مجم	كيسان	12 ملي لتر
40 مجم	كيسان	16 ملي لتر
50 مجم	كيسان	20 ملي لتر
75 مجم	3 أكياس	20 ملي لتر

من يتم تسجيل المسحوق المخصص لإعداد المَعلَقِ لدعم الفئة العمرية من عمر عام واحد إلى 5 أعوام أو تسويقها.

جرعة البدء المعتادة للمرضى البالغين المصابين بفيروس التهاب الكبدى من النوع "سي" هي قرص واحد 25 مجم من عقار ريفولاد في اليوم. يبدأ مرضى فرقية نقص الصفائح الدموية مجهولة السبب وفيروس التهاب الكبدى من النوع "سي" ومرض فقر الدَّم غير التنسجي الشديد ذوو الأصول الآسيوية (الصينيون أو اليابانيون أو التايوانيون أو الكوريين أو التايلنديين) ومرضى فرقية نقص الصفائح الدموية مجهولة السبب وفيروس التهاب الكبدى من النوع "سي" ومرض فقر الدَّم غير التنسجي الشديد الذين يعانون من مشاكل في الكبد العلاج باستخدام جرعة بدء منخفضة. يبدأ البالغون بجرعة تبلغ 25 مجم يوميًا، وسيتم تحديد الجرعة للأطفال من قبل الطبيب الخاص بهم بحسب وزن الجسم.

جرعة البدء المعتادة للمرضى المُصابين بفقر الدَّم غير التنسجي الشديد مصحابة علاج قياسي كابت للمناعة كخط علاج أول هي:

- للبالغين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا: 150 مجم مرة واحدة يوميًا لمدة 6 أشهر. يبدأ المرضى ذوو الأصول الآسيوية (الصينيون أو اليابانيون أو التايوانيون أو الكوريون أو التايلنديون) العلاج باستخدام جرعة بدء منخفضة: 75 مجم مرة واحدة يوميًا لمدة 6 أشهر.

زجاجة واحدة للخلط قابلة لإعادة الاستخدام مزودة بغطاء وسداة	<div> <div><div>Closure cap</div></div> <div><div>Lid</div></div> </div>
سرنجة واحدة قابلة لإعادة الاستخدام	<div> <div><div>Syringe tip</div></div> <div><div>Piston</div></div> </div>

يلزم وجود ما يلي لإعداد وإعطاء إحدى جرعات عقار ريفولاد:

- عدد موصوف من الأكياس (من العبوة)
- زجاجة خلط (من العبوة)
- سرنجة (من العبوة)
- كوب نظيف من ماء الشرب
- مقفص لفتح الأكياس

تأكد من أن زجاجة الخلط (يما في ذلك الغطاء والسداة) والسرنجة جافة قبل الاستخدام.

<b>إعداد معلق عقار ريفولاد</b>	
1. املاً السرنجة بـ 20 ملي لتر من ماء الشرب من الكوب	<div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"><li>اضغط على المكبس بالكامل داخل السرنجة</li> <li>ضع طرف السرنجة بالكامل في الماء</li> <li>واسحب المكبس إلى علامة 20 ملي لتر</li></ul>
2. ضع الماء في زجاجة الخلط عن طريق الضغط على المكبس ببطء.	<div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> </div>
3. استعن بالجدول 1 لتحديد عدد الأكياس (يجوز كل كيس على 25 مجم من مسحوق عقار ريفولاد) المراد إذابتها في 20 ملي لتر من الماء لإعداد الجرعة اليومية الموصوفة.	
4. اضف المسحوق في زجاجة الخلط: <ul style="list-style-type: none"><li>ضع على الكيس لتأكد من تجعُّق كافة المحتويات في أسفل الكيس.</li> <li>افتح الكيس من الطرف العلوي.</li> <li>اضغط على المسحوق في زجاجة الخلط: تأكد من عدم سكب أي مسحوق.</li> <li>إذا تم وصف أكثر من كيس واحد، كرر الخطوات الواردة تحت النقطة 4.</li></ul>	<div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> </div>
5. خلط المَعلَقِ <ul style="list-style-type: none"><li>قم بتثبيت الغطاء على زجاجة الخلط وتأكد من إغلاق السداة.</li> <li>رج زجاجة الخلط بلطف لمدة 20 ثانية على الأقل. لمنع تكون الرغوة، لا ترج الزجاجة بشدة.</li></ul>	<div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> </div>
<b>إعطاء معلق عقار ريفولاد</b>	
6. استعن بالجدول 1 لتحديد حجم المَعلَقِ الفموي (بـ "الملي لتر") المراد سحبه في السرنجة لإعطاء الجرعة اليومية الموصوفة.	
7. املاً السرنجة بالمَعلَقِ <ul style="list-style-type: none"><li>اضغط على المكبس بالكامل داخل السرنجة</li> <li>انزع السداة وأدخل السرنجة في الفتحة الموجودة بغطاء زجاجة الخلط</li> <li>اقلب زجاجة الخلط رأساً على عقب مع السرنجة</li> <li>اسحب الحجم المطلوب (بـ "الملي لتر") في السرنجة. للقيام بذلك، اسحب المكبس حتى يصل الذؤ الموجود في السرنجة (السائل البني الداكن) إلى علامة الملي لتر الصحيحة.</li> <li>اقلب زجاجة الخلط مرة أخرى إلى الوضع المستقيم وقم بإزالة السرنجة.</li></ul>	<div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> </div>
8. إعطاء الدواء للطفل <ul style="list-style-type: none"><li>ضع طرف السرنجة في فم الطفل (الجانب الداخلي من إحدى الوجنتين)</li> <li>اضغط على المكبس ببطء؛ لمنح الطفل وقتًا كافيًا لإبتلاع الدواء.</li></ul>	<div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> </div>

<b>تعليمات خاصة بالتنظيف</b>	
امسح أي مسحوق أو معلق مسكوب بعناية بقطعة قماش مبللة يمكن التخلُّص منها.	
لمنع تغير لون الجلد، ارتد قفازات يمكن التخلص منها.	
تخلص من الأشياء المستخدمة في التنظيف (القماش والقفازات) مع مخلفات المنزل.	
تنظيف المكونات المستخدمة في الخلط. <ul style="list-style-type: none"><li>قم بإزالة المكبس من السرنجة.</li> <li>تخلص من أي محلول متبقٍ وفقًا لتعليمات طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.</li> <li>اشطف زجاجة الخلط، والغطاء، والسرنجة والمكبس تحت الماء الجاري ودعهم يجفوا في الهواء، لا تغيري لون زجاجة الخلط بواسطة الدواء مرور الوقت. هذا أمر طبيعي.</li> <li>اغسل يديك بالماء والصابون.</li></ul>	

##### الآثار الجانبية المحتملة

تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية المرتبطة بالعلاج بعقار ريفولاد في المرضى البالغين ممن يعانون من فرقية نقص الصفائح الدَّمويَّة مجهولة السبب:

قد تكون بعض الآثار الجانبية خطيرة، اتصل بطبيبك فورًا (انظر: «تحذيرات واحتياطات»).

شائعة؛ قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 10 أشخاص:

- تجلط الدَّم: علامات ذلك هي كالآتي:
  - تورم، ألم، إحساس بالحرقاة، احمرار أو وجع في إحدى الساقين.
  - ضيق مفاجئ في التنفس، خاصةً عندما يكون مصحوبًا بألم حاد في الصدر أو سرعة في التنفس.
  - ألم بالطن (ألم بالمعدة)، تضخم البطن، وجود دم في البراز.

غير شائعة؛ قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 100 أشخاص:

- تلف الكبد: علامات ذلك هي اصفرار الجلد أو ملتحمته العين (يرقان)، بول داكن اللون بشكل غير معتاد، تعب غير معتاد، ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

- الفشل الكلوي: إحدى العلامات على ذلك هي انخفاض شديد في إنتاج البول

تُرد الآثار الجانبية الأخرى أدناه، إذا أصبحت هذه الآثار الجانبية شديدة، يُرجى إخبار طبيبك، أو الصيدلي، أو أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

شائعة جدًا؛ قد تؤثر على أكثر من شخص واحد من بين كل 10 أشخاص:
التهاب الحلق، وسيلان الأنف، عدوى المسالك الهوائية العلوية، صداع، إسهال، غثيان، ألم بالمفاصل، ألم بالظهر، تعب.

الآثار الجانبية الشائعة جدًا التي قد تظهر في اختبارات الدَّم:

زيادة إنزيمات الكبد.

شائعة؛ قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 10 أشخاص:
نزلة برد، التهاب الحلق، الشعور بالضغط أو الألم في الوجنتين والجبهة (علامات على التهاب الجيوب الأنفية)، حمى، سعال، صعوبة التنفس أو ألم عند التنفس، آزيز بالصدر، ألم بالصدر عند التنفس (علامات على التهاب الرئة)، حرقة البرد، قرحة بالفم، التهاب اللوزتين، تعب وشحوب الجلد (فقر الدَّم)، نزيف، كدمات، ضعف العضلات، تقلص عضلي، اضطراب النظم القلبي، طفح جلدي، حكة، تورم (وذمة)، صعوبة في البلع، الشعور بالدوخة، تشنج الساق ناجم عن محضر البوريك (مادة تُفَرَّدُ عندما يتم تكسير الطعام)، عدم القدرة على النوم (أرق)، اضطرابات النوم، قلق، اكتئاب، دوخة، وخز وتمثيل، صداع نصفي، غثاس، مشاكل البعين (اعتماد عسة العين، ألم بالعين، جفاف العين، انخفاض حدة الإبصار، عدم وضوح الرؤية، نزيف بالملتحمه)، ارتفاع ضغط الدم، هُبَّات ساخنة، نزيف من الأنف (رعاف)، قيء، ألم بالطن، إمساك، مشاكل بالهضم، نزيف اللثة، نزيف بالفم، بواسير، شعور غير مريح بالطن، انتفاخ البطن بالغثاس، مشاكل الكبد، بما في ذلك: زيادة إنزيمات الكبد (التي يفرزها الكبد)، مشاكل في تدفق العصارة الصفراوية (التي يفرزها الكبد للمساعدة في الهضم)، التهاب الكبد، اصفرار الجلد والعيون، ترقق أو إساقط الشعر غير المعتاد، بقع حمراء أو أرجوانية على الجلد، تعرق مفرط، طفح جلدي مصحوب بحكة، ألم في الأطراف، ألم عضلي، تقلصات عضلية، ألم بالعظام، حمى، أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا، ألم في الصدر، تورم اليدين والمفاصل والقدمين، ضعف.

غير شائعة؛ قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 100 أشخاص:

زيادة الوزن، فقدان الشهية، تورم المفاصل، ألم بالمفاصل. زيادة الشهية، تقلبات الوزن، فقدان الشهية، عدم الاهتمام، حزن، اضطراب حاسة التذوُّق، ارتعاش لا يمكن التحكم به، ضعف العضلات، مشاكل بالطن، وخز أو تنميل في أصابع القدمين أو أصابع اليدين، صعوبات في التحدُّث، مشاكل في العين (إدماع العينين، التهاب الجفون، نزيف بالشبكة، الأورثيَّة «الاستجماتيزم»)، ألم بالذن، خفقان بالقلب، ألم في الصدر، تعب، عدم انتظام ضربات القلب، تورم، احمرار أو حول أحد الأوردة، تغير لون الشفتين أو اللسان أو الجلد إلى اللون الأزرق، انقطاع التنفس أثناء النوم، مشاكل بالأذف والحلق والجيوب الأنفية، جفاف الفم، تغَيَّرَ لون البراز، ألم وحرق أو ثقل على الأحشية المخاطية لسان أو الفم، قيء، مصحوب بدم، تبرز متكرر، شعور غير مريح بالفم، صمل البطن، نزيف بالجلد، تغير لون الجلد، احمرار الجلد، تساقط الجلد، قشر الجلد أو تورز بالجلد، مشاكل بالتصبع، ضعف العضلات، الإحساس بالتقل، تَوَكُّك، التهاب الأغشية المخاطية، تعرق ليلي