

# DESLOR® 5 mg

## DCI : Desloratadine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

de symptômes sur une période de 4 jours ou plus par semaine et pendant plus de 4 semaines), votre médecin peut vous recommander ce traitement pour une durée plus longue.

Concernant l'urticaire, la durée de traitement peut être variable d'un patient à l'autre et vous devez donc suivre les instructions de votre médecin

**Si vous avez pris plus de Deslor que vous n'auriez dû**

Prenez Deslor uniquement comme il vous a été prescrit. Aucun problème sérieux n'est attendu lors d'un surdosage accidentel. Cependant, si vous avez pris plus de Deslor que vous n'auriez dû, prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre Deslor**

Si vous avez oublié de prendre votre dose à temps, prenez-la dès que possible, puis continuez votre traitement normalement.

Ne prenez jamais de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, la desloratadine peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Chez l'adulte, les effets indésirables sont à peu près les mêmes que ceux observés avec un comprimé placebo. Cependant, la fatigue, la sécheresse de la bouche et le mal de tête ont été rapportés plus souvent qu'avec un comprimé placebo. Chez les adolescents, le mal de tête était l'effet indésirable le plus fréquemment rapporté.

Depuis la commercialisation de la desloratadine, des cas de réactions allergiques sévères (avec gêne respiratoire, sifflements bronchiques, démangeaisons, plaques d'urticaire et gonflements) et d'éruption cutanée ont été très rarement rapportés. Des cas de palpitations, d'accélération du rythme cardiaque, de douleur d'estomac, de nausées (envie de vomir), de vomissements, de pesanteur d'estomac, de diarrhées, vertige, somnolence, insomnie, douleur musculaire, d'hallucinations, de convulsions, d'agitation avec mouvements corporels augmentés, inflammation du foie et d'anomalies du bilan hépatique sanguin ont aussi été très rarement rapportés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER Deslor ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. A conserver dans l'emballage extérieur d'origine.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Deslor ?

	DESLOR 5 mg
Principe actif : Desloratadine	5 mg
Liste des excipients :	Dihydrogénophosphate de calcium, Cellulose microcristalline, Amidon prégalatinisé, Stearate de magnésium et Opadry II bleu ..... q.s.

Qu'est-ce que Deslor et contenu de l'emballage extérieur

**DESLOR 5 mg : DCI :** Desloratadine – boites de 07, 15 et de 30 comprimés pelliculés sous plaquette thermoformée.

**Conditions de livraison :**

Liste II. Uniquement sur prescription médicale.

**Présentations :**

Spécialités	Présentations	AMM N°
DESLOR 5 mg	Boite de 07 comprimés	923 336 4
DESLOR 5 mg	Boite de 15 comprimés	923 336 2
DESLOR 5 mg	Boite de 30 comprimés	923 336 3

**Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Les Laboratoires Médis - S.A.  
Route de Tunis - KM 7 - BP 206 8000 Nabeul - Tunisie

Tel : (216) 72 23 50 06 ; Fax: (216) 72 23 50 16

**Date de la dernière révision :** Mars 2015

Ceci est un médicament.

- Le médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Le médicament est un produit qui affecte votre santé et sa consommation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.
- Suivez strictement la prescription du médecin, la méthode d'utilisation et les instructions du pharmacien qui vous a dispensé le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont experts en médicaments, ses bienfaits et ses risques.
- N'interrompez pas de vous-même la période du traitement qui vous a été prescrit.
- Ne répétez pas la même prescription sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de portée des enfants