

COMPOSITION :

Principe actif :

Progestérone (DCI) naturelle micronisée.....100 mg/capsule soit 3 g/boîte

Excipient :

Huile d'arachide, lécithine de soja

Enveloppe de la capsule : gélatine, glycérol, dioxyde de titane (E171)

FORME PHARMACEUTIQUE : 30 capsules molles

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :

Hormone / Progestatif

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

(INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES)

Voie orale :

Troubles liés à une insuffisance en progestérone, en particulier :

- syndrome prémenstruel
- irrégularités menstruelles par dysovulation ou anovulation
- mastopathies bénignes
- préménopause
- ménopause (en complément d'un traitement estrogénique)
- stérilité par insuffisance lutéale

Voie vaginale :

La voie vaginale représente une alternative à la voie orale.

① plus particulièrement dans les indications thérapeutiques suivantes :

- substitution en progestérone au cours des déficits complets des femmes ovarioprives (dons d'ovocytes),
- supplémentation de la phase lutéale au cours des cycles spontanés ou induits, en cas d'hypofertilité ou de stérilité primaire ou secondaire notamment par dysovulation,
- en cas de menace d'avortement ou de prévention d'avortement à répétition par insuffisance lutéale.

② dans toutes les autres indications de la progestérone en cas :

- d'effets secondaires dus à la progestérone (sommolence après absorption par voie orale),
- de contre-indication à la voie orale (hépatopathie).

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

(CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

Voie orale : maladies graves du foie

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Voie orale : il est recommandé de prendre ce médicament à distance des repas, de préférence le soir au coucher.

Voie vaginale : introduire chaque capsule profondément dans le vagin.

NE JAMAIS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, EN CAS DE GROSSESSE OU D'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES :

Voie orale : Les risques de somnolence peuvent rendre dangereuse la conduite automobile ou l'utilisation de certaines machines.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ? (POSOLOGIE)

Respecter strictement les posologies préconisées.

Dans le traitement des troubles gynécologiques la posologie quotidienne est en moyenne de 2 à 3 capsules par jour, soit 2 capsules le soir au coucher ou 1 capsule le matin et 2 le soir au coucher. Toutefois, la posologie y compris la durée du traitement peuvent être modifiées en fonction de la nature de l'indication et de l'efficacité du traitement.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Ce médicament peut être administré par voie orale ou vaginale. Si le médicament est administré par voie orale : avaler la ou les capsules avec un verre d'eau, le matin à distance des repas, le soir au coucher. Si le médicament est administré par voie vaginale : introduire la ou les capsules profondément dans le vagin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS (EFFETS INDÉSIRABLES) :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- Somnolence ou sensations vertigineuses fugaces survenant 1 à 3 heures après ingestion du produit.
- Raccourcissement du cycle menstruel ou saignements intercurrents.

Ces effets indésirables n'ont été observés que par voie orale.

Dans ces cas, consultez votre médecin qui adaptera votre traitement.

SIGNELEZ À VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION (DURÉE DE STABILITÉ) : 3 ANS

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur la boîte.

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE :

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS

NE PAS LE RÉUTILISER SANS AVIS MÉDICAL

NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

DATE D'ÉTABLISSEMENT DE LA NOTICE :

novembre 1995



Laboratoires Besins-Iscovesco

5 rue du Bourg l'Abbé

75003 PARIS

Médicament autorisé n° 323 275.1

Remb. Sec. Soc. 65% Collec.