

إينوكزدامد

2000 و.د. مضادة لـXa (20 مغ/ 0.2 مل

4000 و.د. مضادة لـXa (40 مغ/ 0.4 مل

6000 و.د. مضادة لـXa (60 مغ/ 0.6 مل

8000 و.د. مضادة لـXa (80 مغ/ 0.8 مل

10000 و.د. مضادة لـXa (100 مغ/ 10 مل

إينوكزابارين الصوديوم

محلول الحقن تحت الجلد - داخل الوعاء الدموي

بقم قرءة هذه النشرة جيدا قبل استعمال أو تناول هذا الدواء

- قم بإحضار الدواء، لأنه قد تحتاج إليها لاحقاً.
- في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلاني.
- في حال تناول الدواء قد سره حرصاً عليك وإنما على صحة طبيئته، ولأنها يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص آخر إن كان ذلك الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.

- قم بإحضار طبيبك المعالج أو الصيدلاني في حال زيادة الأعراض الجانبية أو الإصابة بمرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحوي هذه النشرة على:

- ما هو إينوكزدامد[®] وماهي دواعي استعماله
- التي التقيم يتناول أو استعمال إينوكزدامد[®]
- طريقة استعمال إينوكزدامد[®]
- الأعراض الجانبية
- ظروف تخزين إينوكزدامد[®]
- معلومات إضافية.

إِما هو إينوكزدامد[®] وماهي دواعي استعماله

الصف العلاجي:
منع التخثر الشنتمي إلى مجموعة الهيبارينات ذات الوزن الجزيئي المنخفض.

دواعي الاستعمال:

يوسف إينوكزدامد[®] لدى البالغين في حالات:

العلاج الوقائي لمرض التخثر الوريدي في المرحلة متوسطة وعالية الخطورة، خاصة في جراحة العظام أو العمليات العامة، بما في ذلك جراحه الأروار.
العلاج الوقائي لمرض التخثر الوريدي لدى المرضى الذين يعانون من حالات مرضية حادة (مثل قصور القلب الحاد، قصور الجهاز التنفسي، والتضيق للخطورة أو أمراض روماتيزمية) ذوي الحركة المحدودة، ونوي خطر أكبر للتعرض للجلطات الوريدية.
علاج تجلط الأوردة العميقة و الامداد الزوئي باستثناء الامداد الزوئي المرتبط بعلاج حال التخثر أو الجراحة.

- الوقاية من حدوث جلطة في الدورة الدموية الخارجية أثناء الدبال الدموي.

المضادين:

- علاج الجلحة الصدرية غير المستقرة واحتشاء عضلة القلب بدون ارتفاع قلعة «ST»،
بالتزامن مع تناول حمض أسيتيل الساليسيليك عن طريق الفم.

- علاج احتشاء عضلة القلب الحاد المصحوب بارتفاع قلعة «ST»، بما في ذلك المرضى الذين يخضعون لعلاج طبي أو لجراحة الأوعية التاجية عن طريق الجلد التثوية.

2. قبل القيام بتناول أو استعمال إينوكزدامد[®]

- **موانع استعمال إينوكزدامد[®] :**
- يمنع استعمال إينوكزدامد[®] : إذا
- كنت تعاني من أرجية من:
- إينوكزابارين الصوديوم،
- هيبارين أو هيبارين منخفض الوزن الجزيئي مثل النادوربارين، تينزابارين أو دلتيابارين.
- تتشدد علامات الأرجية ما يلي: طفح جلدي، صعوبة في البلع أو التنفس، تورم في الوجه، التشنج، الحكة، الحمى أو الحساسية

إذا كان لديك رد فعل تحسسي للهيبارين أدى إلى انخفاض كبير في عدد خلايا التخثر، فحرج في السعدة أو جراحة حديثة في الجم أو العين، سكتة دماغية نزفية حديثة.

إذا كنت تستعمل إينوكزدامد[®] لعلاج الجلطات الدموية و يجب أن تخضع خلال 24 ساعة لـ:

- قلب في العمود الفقري أو قلب فطئي

- تدخل جراحي مع تخدير فوق الأوعية و يجب تجنب

- لا تستعمل إينوكزدامد[®] إذا كان أي من الحالات المذكورة أعلاه تحصل. إذا لم تكن متأكدًا، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال إينوكزدامد[®].

3. الاحتياطات عند استعمال إينوكزدامد[®]:

لا يمكن تغيير إينوكزدامد[®] بأدوية أخرى تنتمي إلى صف الهيبارينات ذات الوزن الجزيئي المنخفض مثل النادوربارين، تينزابارين أو دالتيابارين. ويرجع ذلك إلى عدم تشابهها و اختلاف الشلطة و دواعي الاستعمال.

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال إينوكزدامد[®] إذا:

- سبق و تعرضت لرد فعل ضد الهيبارين الذي تسبب في انخفاض ملحوظ في عدد خلايا الفطر (الصفيحات الدموية).

- كان لديك صمام في القلب.

- كان لديك التهاب الشغف (عدوى المغلف الداخلي للقلب).

- لديك مرض السكري أو مشاكل في الأوعية الدموية في العين ناجمة عن مرض السكري.
- (المعروف باسم اعتلال الكبد السكري).
- قد أجريت مؤخرًا جراحة على العين أو المخ.

- كان عرك يبلغ أكثر من 65 سنة وخاصة إذا كان يزيد عن 75 عاما.
- كان لديك فشل كلوي.

- لديك فشل كبدي.

- إذا كنت تعاني من غثى أو زيادة في الوزن.

- لديك مستويات عالية من البوتاسيوم في الدم (يمكن التحقق من ذلك عن طريق فحص الدم).
- كنت تستعمل حاليًا أدوية تزيد من خطر النزيف.

- لديك مشكلة في العمود الفقري أو أجريت عملية جراحية في العمود الفقري.

إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تغير فقط أو إذا لم تكن متأكدًا، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال إينوكزدامد[®].

التدابير والمراقبة
قد تحتاج إلى إجراء فحص دم قبل البدء في استعمال هذا الدواء وبشكل منتظم أثناء استعماله.
ما يساعد على فحص مستوى الصفائح الدموية (خلايا التخثر) ومسنوي بوتاسيوم الدم.

الأطفال و المراهقون
لم يتم تقييم سلامة وفعالية إينوكزدامد[®] لدى الأطفال و المراهقين.

ج- التفاعلات الدوائية من أخذ هذا المستحضر مع أدوية أخرى أو أعشاب أو مكملات غذائية:

أخر طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تأخذ أو قد تأخذ أي أدوية أخرى مثل:

- الوارفارين (يستعمل لتسيول الدم)
- الأسبرين (المعروف أيضا باسم حمض أسيتيل الساليسيليك أو ASA) أو كلويدوغفرل أو أدوية أخرى تستعمل لمنع تجلط الدم.
- حقن ديكستران (يستعمل كبديل للدم).
- إيبيروبروفين، كيتوفلافين، كيتورولاك أو أدوية أخرى تسمى الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية، والتي تستعمل لعلاج الألم، وتورم في التهاب المفاصل و غيرها من الالتهابات.
- ريدنيذيفولون، ديكساميثازون أو أدوية أخرى مستخدمة لعلاج الربو و التهاب المفاصل الروماتويدي وغير ها من الالتهابات.
- الأدوية التي تزيد من مستوى البوتاسيوم في الدم، مثل أملاح البوتاسيوم، مدرات البول، بعض الأدوية لعلاج مشاكل القلب.

العصليات الجراحية وتدخلات التخدير:
إذا كنت بحاجة إلى قلب العمود الفقري أو القطني أو الجراحية أو التخدير التخاعي، فيستعمل علاج الألم، وتورم في التهاب المفاصل و غيرها من الالتهابات.

- تناول إينوكزدامد[®] مع الطعام و الشراب: لا شيء.

- الحمل و الرضاعة:
إذا كنت حاملاً أو تعتدين أنك حامل أو تخططين لإجابت طفلك، استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.

إذا كنت حاملاً ولديك صمام قلب ميكانيكي، قد تكونين أكثر عرضة لخطر الإصابة بتجلط الدم. يجب على طبيبك الحدوث منك حول هذا الموضوع.

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو تخططين للرضاعة الطبيعية، استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.

- وتأثير إينوكزدامد[®] على القيادة و استعمال الآلات: لا شيء.

في طريقة استعمال إينوكزدامد[®] :

يجب التقيد بتعليمات الطبيب أو الصيدلاني عند استعمال هذا الدواء. استشر طبيبك أو الصيدلاني في حال حدوث شك.

استعمل هذا الدواء
- عادة يتم إعطائك إينوكزدامد[®] من قبل الطبيب أو الممرضة. يجب أن يعطى عن طريق الحقن.

عصوما يتم إعطاء إينوكزدامد[®] عن طريق الحقن تحت الجلد.

يمكن إعطاء إينوكزدامد[®] عن طريق الحقن داخل الوريد بعد أنواع معينة من احتشاء عضلة القلب أو بعد تدخل جراحي.

يمكن إدخال إينوكزدامد[®] في الخط الشرياني لدورة غسيل الكلى في بداية الحصة.

يجب سحب إينوكزدامد[®] من الحقن الشرياني لدورة غسيل الكلى في بداية الحصة.

لا تحقن إينوكزدامد[®] داخل العضلة.

الكمية المحددة
سيحدد الطبيب المعادير من إينوكزدامد[®] التي تستطيع أن تختلف الكمية حسب نوعي الاستعمال.

إذا كنت تعاني من فشل كلوي، قد تتلقى كمية أقل من إينوكزدامد[®].

1. علاج جلطات الدم
تبلغ الجرعة المعتادة 150 وحدة دولية (1.5 مغ) لكل كيلوغرام من وزن المريض مرة واحدة في اليوم أو 100 وحدة دولية (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن مرتين في اليوم.

سيحدد الطبيب العدة التي يحتاجها لتلقي إينوكزدامد[®].

2. منع تكون جلطات الدم في الدم أثناء الجراحة أو فترات قة الحركة بسبب المرض: تكون الجرعة عند احتمال حدوث خطر جلطة: سوف تتلقى جرعة قدرها 2000 وحدة دولية (20 مغ) عند 4000 وحدة دولية (40 مغ) من إينوكزدامد[®]. مرة واحدة في اليوم.

إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية، فعندما يتم إعطاء حقنة أول ساعتين أو 12 ساعة قبل الجراحة.

إذا أصبحت قلقك على الحركة ضعيفة بسبب المرض، فيستحصل على جرعة مقدارها 4000 وحدة دولية (40 مغ) من إينوكزدامد[®] كل يوم.

سيحدد الطبيب العدة التي يحتاجها لتلقي إينوكزدامد[®].

3. العلاج والوقاية من جلطات الدم إذا تعرضت لنجبة صدرية غير مستقرة أو لاحتشاء عضلة القلب:

يمكن استعمال إينوكزدامد[®] لوعين مختلفين من احتشاء عضلة القلب. تعتمد كمية إينوكزدامد[®] التي تتساقطا على عمرك ونوع احتشاء عضلة القلب لديك.

احتشاء عضلة القلب بدون ارتفاع ضغط ST:

- تبلغ الجرعة المعتادة 100 و.د (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن كل 12 ساعة.

- عادة، سيوصف لك الطبيب أيضا الأسبرين (حمض أسيتيل الساليسيليك).
سيحدد الطبيب العدة التي يحتاجها للحصول على إينوكزدامد[®].

احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع ضغط ST إذا كان عرك أقل من 75 سنة:

- جرعة أولية من 3000 وحدة دولية (30 مغ) من إينوكزدامد[®]. سيتم حقنها في الوريد. في الوقت نفسه، سيحصل أيضا على حقن إينوكزدامد[®]. تحت الجلد. الجرعة المعتادة هي 100 وحدة دولية إلى 100 لكل كيلوغرام من وزنك، كل 12 ساعة.

- عادة، يصف لك الطبيب أيضا الأسبرين (حمض أسيتيل الساليسيليك).
سيحدد الطبيب العدة التي يحتاجها للحصول على إينوكزدامد[®].

احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع ضغط ST إذا كان عرك أكثر من 75 سنة:

- تبلغ الجرعة المعتادة 75 وحدة دولية (0.75 مغ) لكل كيلوغرام من وزنك كل 12 ساعة. يتم إعطاء أقصى قدر من إينوكزدامد[®] في الحقيقين الأولين أو 7500 وحدة دولية (75 مغ).

سيحدد الطبيب العدة التي يحتاجها لتلقي إينوكزدامد[®].

بالنسبة للمرضى الذين يخضعون لجراحة الأوعية التاجية عن طريق الجلد: بناء على موعد تلقي الجرعة الأخيرة من إينوكزدامد[®]، قد يقرر طبيبك إعطاء جرعة إضافية من إينوكزدامد[®] قبل التدخل الجاهي عن طريق الجلد وذلك عن طريق الحقن في الوريد.

4. الوقاية من الجلطات الدموية في غسيل الكلى:

جرعة المعتادة هي 100 وحدة دولية (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن.

يتم إعطاء إينوكزدامد[®] عن طريق الشرياني في دائرة غسيل الكلى في بداية الحصة. تكون الكمية كافية عسوما لحصة 4 ساعات. ومع ذلك يمكن لطبيبك أن يعطيك جرعة إضافية بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (0.5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزدامد[®] بنفسك

إذا كنت قادرا على حقن إينوكزدامد[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب عليك، فتحدث إلى طبيبك أو الممرضة على الفور. يساعد الحقن السليم تجلد الحقن في الحد من الألم والكتامات في موضع الحقن.

قبل حقن إينوكزدامد[®]

جمع العصائر التي تزيد من مستوى البوتاسيوم في الدم، مثل أملاح البوتاسيوم، مدرات البول، الأدوية لعلاج مشاكل القلب.

حاول تجنب تناول الطعام.
حاول تجنب تناول الأدوية المضادة على الدواء. لا تستعمل إذا تجاوز التاريخ.

تأكد من عدم تلف الحقنة وأن الدواء في الحقنة محلول صاف. إذا لم يكن كذلك، استعمل حقنة أخرى.

تأكد من أنك تعرف مكان كرتة تنوي حقن.

تحقق من اللون العنبر معرفة ما إذا كانت الحقنة الأخيرة لم تسبب حمرا أو ا تغيرها في لون الجلد أو تورما أو قرا أو إذا كانت لا تزال موملة. إذا كان الأمر كذلك، فتحدث إلى طبيبك أو مرصتك.

تعليمات لحقن إينوكزدامد[®]

قم بتحصير موضع الحقن
1. اختر منطقة من الجانب الأيمن أو الأيسر من البطن. يجب أن يكون على الأقل 5 سنتيمترات من السرة ونحو الجانبين.

لا تحقن لنفسك في غضون 5 سنتيمترات حول السرة أو حول الندوب أو الكدمات.
تتأوب على منطقة الحقن بين الجانبين الأيمن والأيسر من البطن، اعتصداً على موضع الحقنة الأخيرة.

2. اغسل يديك نظاف (دون فرك) المنطقة المختارة للحقن مع شؤنة قطنية غارقة في الكحول، أو الصابون والماء.

3. الجلوس أو الاستلقاء في وضع مريح بحيث يمكنك الاسترخاء. تأكد من أنه يمكنك رؤية المنطقة التي ستقوم بعملها بفعالية الحقن. كرسي مريح أو سرير معزز بوسائد سيكون مثاليا.

اختر جرعة

- أزل الغطاء الورقي من العبوة بعناية. قم برمي الغطاء.
- لا تضغط على الكسك لمرد فاعات الهواء قبل الحقن. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الدواء. بمجرد إزالة الغطاء، لا تدع الإبرة تلمس أي شيء. و ذلك لتفكك من الز الإبرة تبقى نظيفة (معقمة)
- ضعما تحت إبرة كمية الدوا في الحقنة مع الجرعة الموصوفة، لا حاجة لمصيط الجرعة. أنت الآن جاهز للحقن.
- عندما تضع الإبرة على وزنك، قد تضطر إلى ضبط الجرعة في الحقنة لتتناسب مع حجم العضلة الموصوفة. في هذا الحالة، يمكنك التخلص من الدواء الزائد عن طريق توجيه الحقنة إلى أسفل للحفاظ على قاعة الهواء في الحقنة) و التخلص من الكمية الزائدة في الحاقية.
- بعد ظهور فقارة في نهاية الإبرة في هذه الحالة، قم بإزالة الفقرة أو الحقن عن طريق الحقن في الحقنة، والإبرة موجهة إلى أسفل. أنت الآن جاهز للحقن.

- أدخل الغطاء الورقي من العبوة بعناية (كلكتك فقط بلم) و باليد الأخرى، اقصر بلطف المنطقة القطنية من البطن بين الإصبع السبابة والإبهام لحاق كعبد في الجاد.
- تأكد من الحفاظ على الجلد خلال مدة الحقن.
- أدخل الحقنة بحيث تشير الإبرة إلى الأسفل (عن طريق تكوين زاوية 90 درجة مع الجلد). أدخل طول الإبرة في ثقبيا الجلد.
- اضغط على المكبس بالإبهام. سوف يدفع هذا الدواء إلى الأنسجة الدهنية من البطن. اكمل الحقن باستعمال جميع الدواء في الحقنة.
- أزل الإبرة من موضع الحقن عن طريق سحبها مباشرة. لا توجه الإبرة نحو نفسك أو الآخرين. يمكنك الآن ترك كعبد الجلد.

عندما تنتهي

1. لتجنب الكدمات، لا تترك موقع الحقن بعد الانتهاء من الحقن.

2. تخلص من الحقنة المستعملة بعيدا في حاوية للأشياء حادة. اغلق غطاء الحاوية بإحكام و لا تترك الحاوية في متناول الأطفال. عندما تكون الحاوية ممتلئة، تخلص منها حسب تعليمات طبيبك أو الصيدلاني.

تغيير الأدوية المضادة للتخثر

التحول من إينوكزدامد[®] إلى مضادات التخثر التي تسمى مضادات فيتامين K (مثل الوارفارين)

سيطلب منك الطبيب إجراء فحوصات دم تسمى النسبة المعيارية وسوف يخبرك متى يجب إيقاف إينوكزدامد[®].

التحول من المعالجة بمضادات تخثر تسمى مضادات فيتامين K (مثل الوارفارين) إلى إينوكزدامد[®]

إذا كنت تأخذ من تناول مضادات الفيتامين K، سيطلب منك الطبيب إجراء فحوصات الدم التي تسمى النسبة المعيارية الدولية وسوف يخبرك متى تبدأ العلاج بإينوكزدامد[®].

التحول من العلاج بإينوكزدامد[®] إلى العلاج القوي المضاد للتخثر المباشش

توقف عن تناول إينوكزدامد[®] توقف عن استعمال إينوكزدامد[®].
أبدأ باستعمال التخثر القوي المباشر خلال الساعات الأولى للذين تسببت الوقت الذي كان مخصصا للحقن التالي، ثم استمر في العلاج بشكل طبيعي.

التحول من العلاج القوي المضاد للتخثر المباشر إلى إينوكزدامد[®]

توقف عن مضادات التخثر عن طريق الفم مباشرة. انتظر 12 ساعة بدء الجرعة الأخيرة من مضادات التخثر عن طريق الفم مباشرة قبل بدء العلاج بإينوكزدامد[®].

أ- إذا كنت قد استعمال إينوكزدامد[®] أكثر مما ينبغي

إذا كنت تعتقد أنك تستعمل الكثير أو القليل جدا من إينوكزدامد[®]، أخبر طبيبك أو الممرضة أو الصيدلاني على الفور، حتى إذا لم تكن هناك علامات.

إذا قام الطبيب بفحن أو إبتلاع إينوكزدامد[®].
عن غير قصد، خذ هذه إفي قسم الطوارئ في المستشفى فوراً.

العلامات والأعراض: قد تؤدي جرعة عرضية زائدة بعد الحقن داخل الوريد، خارج الجسم أو الحقن تحت الجلد إلى إنقزدابارين الصوديوم إلى مضاعفات نزفية. بعد تناول عن طريق الفم حتى جرعات مرتفعة من غير المرجح أن يتم مضاعفات إنقزدابارين الصوديوم.

مع ذلك، وحتى مع جرعات عالية من بروتامين، لا يتم تحديد نشاط ضد XA من إنقزدابارين الصوديوم (حوالي 60% كحد أقصى) (انظر المعلومات الخاصة بوصف أشكال إينوكزدامد[®]).

ب- إذا تسببت استعمال إينوكزدامد[®] في حدوث آثار جانبية، ولكنها لا تحدث بشكل منهجي لمثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارا جانبية، ولكنها لا تحدث بشكل منهجي لدى جميع المرضى.

إجراء جانبية خطيرة

توقف عن استعمال إينوكزدامد[®] وأخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كان لديك أي علامات على وجود رد فعل تحسسي شديد (مثل طفح جلدي، صعوبة في التنفس أو البلع، تورم في الوجه أو الشفاه أو الفم أو الحلق أو العينين).

مثل الأدوية الأخرى المماثلة (الأدوية المنخفضة التفاعل) قد يسبب إينوكزدامد[®] نزفا. هذا النزيف قد يمثل خطرا على حياتك. في بعض الحالات قد لا يكون النزيف مرئيا.

استشر طبيبك على الفور.

إذا كنت تعاني من أي نزيف لا يتوقف من تلقاء نفسه

إذا ظهرت لديك أعراض انسداد في الأوعية الدموية مثل ضعف غير عادي أو تعب أو دوخة أو صداع أو تورم غير مبرر.

قد يقرر طبيبك إما إيقافك مؤقتا المراقبة الدقيقة أو تغيير العلاج.

يجب عليك إبلاغ طبيبك على الفور.

إذا كان لديك علامات انسداد في الأوعية الدموية، مثل:

- ألم مثل تشنج، احمرار، حرارة أو تورم في إحدى الساقين: تمثل هذه أعراض تخثر الأوردة العميقة.

- ضيق في التنفس، ألم في الصدر، فقدان الوعي أو السعال الدموي: تمثل هذه أعراض الانسداد الرئوي.

- طفح جلدي، تورم في موقع الحقن.

- بشرة حمراء مصحوبة بحكة.

- كدمات أو أي موقع الحقن.

- انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء.

- ارتفاع عدد الصفائح الدموية في الدم،

غير شائعة (يمكن أن تسبب أكثر من شخص من بين 10 أشخاص)

زيادة مستويات إنزيمات الكبد.

شائعة (يمكن أن تسبب شخص من بين 10 أشخاص)

ظهور كدمات أكثر من المعتاد. قد يكون ذلك ناجما عن انخفاض عدد الصفائح الدموية.

قد وردية على الجلد التي من المرجح أن تظهر حول المنطقة التي تم حقن إينوكزدامد[®] فيها،

طفح جلدي.

بشرة حمراء مصحوبة بحكة.

كدمات أو أي موقع الحقن.

انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء.

ارتفاع عدد الصفائح الدموية في الدم،

غير شائعة (يمكن أن تسبب شخص من بين 100 شخص)

صداع متفاقم قد يكون علامة وجود نزيف في الدماغ.

أرجية أو انتفاخ في المعدة. مع إمكانية نزيف في المعدة.

أفات جانبية خطيرة غير منتظمة الشكل مع أو بدون بقور.

تهيج الجلد (تجنب موضعي)،

- إضراف الجلد أو العينين وقائمة البول. قد يكون ذلك ناجما عن مشكلة في الكبد.

نادرة: (يمكن أن تسبب شخص من بين 1000 شخص)

- رد فعل أرجية حادة. قد تشمل الأعراض: طفح جلدي، صعوبة في البلع أو التنفس، انتفاخ في الشفتين، الوجه، الحلق أو اللسان.

- زيادة مستويات البوتاسيوم في الدم والذي من المرجح أن يحدث لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو مرض السكري. يمكن لطبيبك التحقق من ذلك عن طريق إجراء فحص الدم.

- زيادة في عدد حمضيات الدم. يمكن لطبيبك التحقق من ذلك عن طريق إجراء فحص الدم.

- تساقط الشعر.

- هشاشة العظام (مرض يجعل العظام أكثر عرضة للكسر) بعد الاستعمال على المدى الطويل؛

- وخز وخدر وصعف الضلالت (خاصة في الجزء السفلي من الجسم) عندما يكون لديك بزل قطني أو تخثير في العمود الفقري.

- صعوبة في التحكم في المثانة أو الأمعاء (لا يمكن السيطرة نفسك عند الذهاب إلى الحمام)
أبلغ طبيبك أو الطبيب عن أي تأثير غير مرغوب فيه أو لم يرد ذكره في هذه النشرة.

في ظروف تخزين إينوكزدامد[®]:

- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

- يحفظ داخل العبوة الخارجية في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

- لا يجوز استعمال إينوكزدامد[®] بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على ملصق الحقنة المعية أو على العبوة الخارجية.

- لا يجوز استعمال إينوكزدامد[®] عند ملاحظة وجود أجسام أو عند عدم شفافية المحلول.

- لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف أو الفليات المنزلية.

- أسال الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد صالحة للإستعمال. هذه الإجراءا تساعد على حماية البيئة.

6. معلومات إضافية:

أ- ماهي محتويات إينوكزدامد[®]

البيانات العامة: إينوكزابارين الصوديوم.

بيانات: ماء صاف للحقن.

ب- ماهو الشكل الصيدلاني إينوكزدامد[®] وصفه و حجم عبوته:

- محلول صاف. مسفرّ يميل قليلا إلى البني.

- محلول معقم قابل للحقن تحت الجلد و داخل الوعاء الدموي بنسبة:

- 2000 و.د مضادة لـXa (20 مغ/ 0.2 مل) و 4000 و.د مضادة لـXa (40 مغ/ 0.4 مل.