

إينوكزدامد

2000 و.د. مضادة لـ Xa (20 مغ) / 0.2 مل

4000 و.د. مضادة لـ Xa (40 مغ) / 0.4 مل

6000 و.د. مضادة لـ Xa (60 مغ) / 0.6 مل

8000 و.د. مضادة لـ Xa (80 مغ) / 0.8 مل

10000 و.د. مضادة لـ Xa (100 مغ) / 10 مل

إينوكزابارين الصوديوم

محلول الحقن تحت الجلد - داخل الوعاء الدموي

بقم قرءة هذه النشرة جيدا قبل استعمال أو تناول هذا الدواء

- احتفظ بهذه النشرة، لأنه قد تحتاج إليها لاحقا.
- في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلاني.
- في حال تناول الدواء قد سر صرفه خصوصا إذا تناول على وصفة طبية، ولأنها يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص آخر إن كان ذلك الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.

قد يواصل طبيبك المعالج أو الصيدلاني في حال زيادة الأعراض الجانبية أو الإصابة بمرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحوي هذه النشرة على:

- ما هو إينوكزدامد[®] وماهي دواعي استعماله
- كيفية استخدام إينوكزدامد[®]
- طريقة استعمال إينوكزدامد[®]
- الأعراض الجانبية
- ظروف تخزين إينوكزدامد[®]
- معلومات إضافية.

إِما هو إينوكزدامد[®] وماهي دواعي استعماله

الصف الثاني:
منع التخثر العائلي إلى مجموعة اليبيرينات ذات الوزن الجزيئي المنخفض.
دواعي الاستعمال:

يوسف إينوكزدامد[®] لدى البالغين في حالات:

العلاج الوقائي لمرض التخثر الوراثي في المرحلة متوسطة وعالية الخطورة، خاصة في حالة العظام أو العمليات العامة، بما في ذلك جراحه الأروار.
العلاج الوقائي لمرض التخثر الوراثي لدى المرضى الذين يعانون من حالات مرضية حادة (مثل قصور القلب الحاد، قصور المجرى التنفسي، والتضيق للخطورة أو أمراض روماتيزمية) ذوي الحركة المحدودة، ونوي خطر أكبر للتعرض للجراحة الوراثية.
علاج تجلط الأوردة العميقة و الانسداد الرئوي باستثناء الانسداد الرئوي المرتبط بعلاج حال التخثر أو الجراحة.
الوقاية من حدوث جلطة في الدورة الدموية الخارجية أثناء الدبال الدموي.

التحذيرات:
- علاج الجلطة الصدرية غير المستقرة واحتشاء عضلة القلب بدون ارتفاع قلعة «ST»، بالتزامن مع تناول حمض أسيتيل الساليسيليك عن طريق الفم.
- احتشاء عضلة القلب الحاد المصحوب بارتفاع قلعة «ST»، بما في ذلك المرضى الذين يخضعون لعلاج طبي أو لجراحة الأوعية التاجية عن طريق الجلد الثانوية.

2. قبل القيام بتناول أو استعمال إينوكزدامد[®]

- **موانع استعمال إينوكزدامد[®]:**
- منع استعمال إينوكزدامد[®] : إذا
- كنت تعاني من أرجية من:
- إينوكزابارين الصوديوم،
- هيبارين أو هيبارين منخفض الوزن الجزيئي مثل النادوربارين، تيزابارين أو دلتيابارين.
- تتسبب علامات الأرجية ما يلي: طفح جلدي، صعوبة في البلع أو التنفس، تورم في الوجه، التشنج، الحكة، الحمى أو الحساسية

- إذا كان لديك رد فعل تحسسي للهيبارين أدى إلى انخفاض كبير في عدد خلايا التخثر.
- إذا كنت تعاني من أمراض الكلى.
- فرحة في المعدة أو جراحة حديثة في المع أو العين، سكتة دماغية نزفية حديثة.
- إذا كنت تستعمل إينوكزدامد[®] لعلاج الجلطات الدموية و يجب أن تخصص خلال 24 ساعة لـ:

- قلب في العمود الفقري أو قلب فطري
- تدخل جراحي مع تخدير فوق الأوعية
- لا تستعمل إينوكزدامد[®] إذا كان أي من الحالات المذكورة أعلاه تحصل. إذا لم تكن متأكدًا، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال إينوكزدامد[®].

الاحتياطات عند استعمال إينوكزدامد[®]:

لا يمكن تغيير إينوكزدامد[®] بأدوية أخرى تنتمي إلى صف الهيبارينات ذات الوزن الجزيئي المنخفض مثل النادوربارين، تيزابارين أو دالتيابارين. ويرجع ذلك إلى عدم تشابهها و اختلاف الشلطة و دواعي الاستعمال.

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال إينوكزدامد[®] : إذا:

- سبق و تعرضت لرد فعل ضد الهيبارين الذي تسبب في انخفاض ملحوظ في عدد خلايا الفطر (الصفيحات الدموية).
- كان لديك صمام في القلب.
- كان لديك التهاب الشغف (عدوى المغلف الداخلي للقلب).
- لديك سوابق فرحة في المعدة.
- تعرضت مؤخرا لجلطة دماغية.
- لديك ارتفاع في ضغط الدم.

- لديك مرض السكري أو مشاكل في الأوعية الدموية في العين ناجمة عن مرض السكري.
- (المعروف باسم اعتلال الشبكية السكري).
- إذا أجريت مؤخرا جراحة على العين أو المخ.
- كان عرك يبلغ أكثر من 65 سنة وخاصة إذا كان يزيد عن 75 عاما.
- كان لديك فشل كلوي.
- لديك فشل كبدي.

- إذا كنت تعاني من غث أو زيادة في الوزن.
- لديك مستويات عالية من البوتاسيوم في الدم (يمكن التحقق من ذلك عن طريق فحص الدم).
- كنت تستعمل حاليا أدوية تزيد من خطر النزيف.
- لديك مشكلة في العمود الفقري أو أجريت عملية جراحية في العمود الفقري.
- إذا كنت أي من الحالات المذكورة أعلاه تغير فقط أو إذا لم تكن متأكدًا، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال إينوكزدامد[®].

التحذيرات والمراقبة
قد تحتاج إلى إجراء فحص دم قبل البدء في استعمال هذا الدواء وبشكل منتظم أثناء استعماله.
ما يساعد على فحص مستوى الصفائح الدموية (خلايا التخثر) ومسنوي بوتاسيوم الدم.

الأطفال و المراهقون
لم يتم تقييم سلامة وفعالية إينوكزدامد[®] لدى الأطفال و المراهقين.
ج- التفاعلات الدوائية من أخذ هذا المستحضر مع أدوية أخرى أو أعشاب أو مكملات غذائية:
أخر طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تأخذ أو قد تأخذ أي أدوية أخرى مثل:

- الأورافارين (يستعمل لتسليول الدم)
- الأسبرين (المعروف أيضا باسم حمض أسيتيل الساليسيليك أو ASA) أو كلويدوفغرل أو أدوية أخرى تستعمل لمنع تجلط الدم.
- حقن ديكستران (يستعمل كبديل للدم).
- أيبيروبرفين، كيكلوفاكسيد، نيترووراك أو أدوية أخرى تسمى الأدوية المضادة لالتهاب غير الالتهابوية، والتي تستعمل لعلاج الألم، وتورم في التهاب المفاصل و غيرها من التهابات.
- بريدنيزولون، ديكساميثازون أو أدوية أخرى مستخدمة لعلاج الربو و التهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها من التهابات.
- الأدوية التي تزيد من مستوى البوتاسيوم في الدم، مثل أملاح البوتاسيوم، مدرات البول، بعض الأدوية لعلاج مشاكل القلب.
العمليات الجراحية وتدخلات التخدير:
إذا كنت بحاجة إلى قلب العمود الفقري أو القطني أو الجذع أو التخدير النخاعي، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني.
د- تناول إينوكزدامد[®] مع الطعام و الشراب: لا شيء.
هـ- الحمل و الرضاعة:
إذا كنت حاملا أو تعتدين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل، استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.
إذا كنت حاملا ولديك صمام قلب ميكانيكي، قد تكونين أكثر عرضة لخطر الإصابة بتجلط الدم. يجب على طبيبك الحداد صمامك مع حول هذا الموضوع.
إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو تخططين للرضاعة الطبيعية، استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.
و- تأثير إينوكزدامد[®] على القيادة و استعمال الآلات: لا شيء.
في طريقة استعمال إينوكزدامد[®]:

الحقن:
يجب التقيد بتعليمات الطبيب أو الصيدلاني عند استعمال هذا الدواء. استشر طبيبك أو الصيدلاني في حال وجود شك.
استعمل هذا الدواء
- عادة يتم إعطائك إينوكزدامد[®] من قبل الطبيب أو الممرضة. يجب أن يعطى عن طريق الحقن.
- عموما يتم إعطاء إينوكزدامد[®] عن طريق الحقن تحت الجلد.
- يمكن إعطاء إينوكزدامد[®] عن طريق الحقن داخل الوريد بعد أنواع معينة من احتشاء عضلة القلب أو بعد تدخل جراحي.

يمكن إدخال إينوكزدامد[®] في الخط الشرياني لأدورة غسيل الكلى في بداية الحصة.
لا تحقن إينوكزدامد[®] داخل العضلة.
الكمية المحددة
سيحدد الطبيب المعادير من إينوكزدامد[®] التي تستطيع أن تختلف الكمية حسب نوعي الاستعمال.
إذا كنت تعاني من فشل كلوي، قد تتلقى كمية أقل من إينوكزدامد[®].
1. علاج جلطات الدم
تبلغ الجرعة المعتادة 150 وحدة دولية (1.5 مغ) لكل كيلوغرام من وزن المريض مرة واحدة في اليوم أو 100 وحدة دولية (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن مرتين في اليوم.
سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها لتلقي إينوكزدامد[®]

2. منع تكون جلطات الدم في الدم أثناء الجراحة أو فترات قة الحركة بسبب المرض:
تكون الجرعة عند احتمال حدوث خطر جلطة: سوف تتلقى جرعة قدرها 2000 وحدة دولية (20 مغ) عند 4000 وحدة دولية (40 مغ) من إينوكزدامد[®]. مرة واحدة في اليوم إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية، فعادة ما يتم إعطاء حقنة أول ساعتين أو 12 ساعة قبل الجراحة.
إذا أصبحت فترتك على الحركة ضعيفة بسبب المرض، فستحصل على جرعة مقدارها 4000 وحدة دولية (40 مغ) من إينوكزدامد[®] كل يوم.
سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها لتلقي إينوكزدامد[®]

3. العلاج والوقاية من جلطات الدم إذا تعرضت لنجحة صدرية غير مستقرة أو لاحتشاء عضلة القلب:

يمكن استعمال إينوكزدامد[®] لوعين مختلفين من احتشاء عضلة القلب. تعتمد كمية إينوكزدامد[®] التي ستتناها على عمرك ونوع احتشاء عضلة القلب لديك.
احتشاء عضلة القلب بدون ارتفاع ضغط ST:
تبلغ الجرعة المعتادة 10 و.د (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن كل 12 ساعة.

عادة، سيوصف لك الطبيب أيضا الأسبرين (حمض أسيتيل الساليسيليك).
سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها للحصول على إينوكزدامد[®].
احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع ST إذا كان عرك أقل من 75 سنة:
جرعة أولية من 3000 وحدة دولية (30 مغ) من إينوكزدامد[®]. سيتم حقنها في الوريد في الوقت نفسه، سيحصل أيضا على حقن إينوكزدامد[®]. تحت الجلد. الجرعة المعتادة هي 100 وحدة دولية إلى 100 لكل كيلوغرام من وزنك، كل 12 ساعة.
عادة، يصف لك الطبيب أيضا الأسبرين (حمض أسيتيل الساليسيليك).
سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها للحصول على إينوكزدامد[®].
احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع مقلع ST إذا كان عرك أكثر من 75 سنة:
تبلغ الجرعة المعتادة 75 وحدة دولية (0.75 مغ) لكل كيلوغرام من وزنك كل 12 ساعة. يتم إعطاء أقصى قدر من إينوكزدامد[®] في الحقيقين الأولين هو 7500 وحدة دولية (75 مغ).
سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها لتلقي إينوكزدامد[®].
بالنسبة للمرضى الذين يخضعون لجراحة الأوعية التاجية عن طريق الجلد: بناء على موعد تلقي الجرعة الأخيرة من إينوكزدامد[®]، قد يقرر طبيبك إعطاء جرعة إضافية من إينوكزدامد[®] قبل التدخل الجاهي عن طريق الجلد وذلك عن طريق الحقن في الوريد.
4. الوقاية من الجلطات الدموية في غسيل الكلى:
جرعة المعتادة هي 100 وحدة دولية (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن.
يتم إعطاء إينوكزدامد[®] عن الخط الشرياني في دائرة غسيل الكلى في بداية الحصة. تكون الكمية كافية عموما لحصة 4 ساعات. ومع ذلك يمكن لطبيبك أن يعطيك جرعة إضافية بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (0.5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعماله

إذا كنت تحقق إينوكزدامد[®] بنفسك:
إذا كنت قادرا على حقن إينوكزدامد[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (0.5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعماله:
بنفسك
إذا كنت تحقق إينوكزدامد[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (0.5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

قبل حقن إينوكزدامد[®]
جمع العنصر التي تزيد من مستوى البوتاسيوم في الدم، مثل أملاح البوتاسيوم، مدرات البول، بعض الأدوية لعلاج مشاكل القلب.
العمليات الجراحية وتدخلات التخدير:
إذا كنت بحاجة إلى قلب العمود الفقري أو القطني أو الجذع أو التخدير النخاعي، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني.
د- تناول إينوكزدامد[®] مع الطعام و الشراب: لا شيء.
هـ- الحمل و الرضاعة:
إذا كنت حاملا أو تعتدين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل، استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.
إذا كنت حاملا ولديك صمام قلب ميكانيكي، قد تكونين أكثر عرضة لخطر الإصابة بتجلط الدم. يجب على طبيبك الحداد صمامك مع حول هذا الموضوع.
إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو تخططين للرضاعة الطبيعية، استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.

و- تأثير إينوكزدامد[®] على القيادة و استعمال الآلات: لا شيء.
في طريقة استعمال إينوكزدامد[®]:
الحقن:
يجب التقيد بتعليمات الطبيب أو الصيدلاني عند استعمال هذا الدواء. استشر طبيبك أو الصيدلاني في حال وجود شك.
استعمل هذا الدواء
- عادة يتم إعطائك إينوكزدامد[®] من قبل الطبيب أو الممرضة. يجب أن يعطى عن طريق الحقن.
- عموما يتم إعطاء إينوكزدامد[®] عن طريق الحقن تحت الجلد.
- يمكن إعطاء إينوكزدامد[®] عن طريق الحقن داخل الوريد بعد أنواع معينة من احتشاء عضلة القلب أو بعد تدخل جراحي.

يمكن إدخال إينوكزدامد[®] في الخط الشرياني لأدورة غسيل الكلى في بداية الحصة.
لا تحقن إينوكزدامد[®] داخل العضلة.
الكمية المحددة
سيحدد الطبيب المعادير من إينوكزدامد[®] التي تستطيع أن تختلف الكمية حسب نوعي الاستعمال.
إذا كنت تعاني من فشل كلوي، قد تتلقى كمية أقل من إينوكزدامد[®].
1. علاج جلطات الدم
تبلغ الجرعة المعتادة 150 وحدة دولية (1.5 مغ) لكل كيلوغرام من وزن المريض مرة واحدة في اليوم أو 100 وحدة دولية (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن مرتين في اليوم.
سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها لتلقي إينوكزدامد[®]

2. منع تكون جلطات الدم في الدم أثناء الجراحة أو فترات قة الحركة بسبب المرض:
تكون الجرعة عند احتمال حدوث خطر جلطة: سوف تتلقى جرعة قدرها 2000 وحدة دولية (20 مغ) عند 4000 وحدة دولية (40 مغ) من إينوكزدامد[®]. مرة واحدة في اليوم إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية، فعادة ما يتم إعطاء حقنة أول ساعتين أو 12 ساعة قبل الجراحة.
إذا أصبحت فترتك على الحركة ضعيفة بسبب المرض، فستحصل على جرعة مقدارها 4000 وحدة دولية (40 مغ) من إينوكزدامد[®] كل يوم.
سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها لتلقي إينوكزدامد[®]

3. العلاج والوقاية من جلطات الدم إذا تعرضت لنجحة صدرية غير مستقرة أو لاحتشاء عضلة القلب:

يمكن استعمال إينوكزدامد[®] لوعين مختلفين من احتشاء عضلة القلب. تعتمد كمية إينوكزدامد[®] التي ستتناها على عمرك ونوع احتشاء عضلة القلب لديك.

احتشاء عضلة القلب بدون ارتفاع ضغط ST:
تبلغ الجرعة المعتادة 10 و.د (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن كل 12 ساعة.

عادة، سيوصف لك الطبيب أيضا الأسبرين (حمض أسيتيل الساليسيليك).

سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها للحصول على إينوكزدامد[®].
احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع ST إذا كان عرك أقل من 75 سنة:
جرعة أولية من 3000 وحدة دولية (30 مغ) من إينوكزدامد[®]. سيتم حقنها في الوريد في الوقت نفسه، سيحصل أيضا على حقن إينوكزدامد[®]. تحت الجلد. الجرعة المعتادة هي 100 وحدة دولية إلى 100 لكل كيلوغرام من وزنك، كل 12 ساعة.
عادة، يصف لك الطبيب أيضا الأسبرين (حمض أسيتيل الساليسيليك).
سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها للحصول على إينوكزدامد[®].
احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع مقلع ST إذا كان عرك أكثر من 75 سنة:
تبلغ الجرعة المعتادة 75 وحدة دولية (0.75 مغ) لكل كيلوغرام من وزنك كل 12 ساعة. يتم إعطاء أقصى قدر من إينوكزدامد[®] في الحقيقين الأولين هو 7500 وحدة دولية (75 مغ).
سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها لتلقي إينوكزدامد[®].

بالنسبة للمرضى الذين يخضعون لجراحة الأوعية التاجية عن طريق الجلد: بناء على موعد تلقي الجرعة الأخيرة من إينوكزدامد[®]، قد يقرر طبيبك إعطاء جرعة إضافية من إينوكزدامد[®] قبل التدخل الجاهي عن طريق الجلد وذلك عن طريق الحقن في الوريد.

4. الوقاية من الجلطات الدموية في غسيل الكلى:

جرعة المعتادة هي 100 وحدة دولية (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن.
يتم إعطاء إينوكزدامد[®] عن الخط الشرياني في دائرة غسيل الكلى في بداية الحصة. تكون الكمية كافية عموما لحصة 4 ساعات. ومع ذلك يمكن لطبيبك أن يعطيك جرعة إضافية بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (0.5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعماله:
بنفسك
إذا كنت تحقق إينوكزدامد[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (0.5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

قبل حقن إينوكزدامد[®]
جمع العنصر التي تزيد من مستوى البوتاسيوم في الدم، مثل أملاح البوتاسيوم، مدرات البول، بعض الأدوية لعلاج مشاكل القلب.
العمليات الجراحية وتدخلات التخدير:
إذا كنت بحاجة إلى قلب العمود الفقري أو القطني أو الجذع أو التخدير النخاعي، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني.
د- تناول إينوكزدامد[®] مع الطعام و الشراب: لا شيء.
هـ- الحمل و الرضاعة:
إذا كنت حاملا أو تعتدين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل، استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.
إذا كنت حاملا ولديك صمام قلب ميكانيكي، قد تكونين أكثر عرضة لخطر الإصابة بتجلط الدم. يجب على طبيبك الحداد صمامك مع حول هذا الموضوع.
إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو تخططين للرضاعة الطبيعية، استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.

و- تأثير إينوكزدامد[®] على القيادة و استعمال الآلات: لا شيء.
في طريقة استعمال إينوكزدامد[®]:
الحقن:
يجب التقيد بتعليمات الطبيب أو الصيدلاني عند استعمال هذا الدواء. استشر طبيبك أو الصيدلاني في حال وجود شك.
استعمل هذا الدواء
- عادة يتم إعطائك إينوكزدامد[®] من قبل الطبيب أو الممرضة. يجب أن يعطى عن طريق الحقن.
- عموما يتم إعطاء إينوكزدامد[®] عن طريق الحقن تحت الجلد.
- يمكن إعطاء إينوكزدامد[®] عن طريق الحقن داخل الوريد بعد أنواع معينة من احتشاء عضلة القلب أو بعد تدخل جراحي.

يمكن إدخال إينوكزدامد[®] في الخط الشرياني لأدورة غسيل الكلى في بداية الحصة.
لا تحقن إينوكزدامد[®] داخل العضلة.
الكمية المحددة
سيحدد الطبيب المعادير من إينوكزدامد[®] التي تستطيع أن تختلف الكمية حسب نوعي الاستعمال.
إذا كنت تعاني من فشل كلوي، قد تتلقى كمية أقل من إينوكزدامد[®].
1. علاج جلطات الدم
تبلغ الجرعة المعتادة 150 وحدة دولية (1.5 مغ) لكل كيلوغرام من وزن المريض مرة واحدة في اليوم أو 100 وحدة دولية (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن مرتين في اليوم.
سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها لتلقي إينوكزدامد[®]

2. منع تكون جلطات الدم في الدم أثناء الجراحة أو فترات قة الحركة بسبب المرض:
تكون الجرعة عند احتمال حدوث خطر جلطة: سوف تتلقى جرعة قدرها 2000 وحدة دولية (20 مغ) عند 4000 وحدة دولية (40 مغ) من إينوكزدامد[®]. مرة واحدة في اليوم إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية، فعادة ما يتم إعطاء حقنة أول ساعتين أو 12 ساعة قبل الجراحة.
إذا أصبحت فترتك على الحركة ضعيفة بسبب المرض، فستحصل على جرعة مقدارها 4000 وحدة دولية (40 مغ) من إينوكزدامد[®] كل يوم.
سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها لتلقي إينوكزدامد[®]

3. العلاج والوقاية من جلطات الدم إذا تعرضت لنجحة صدرية غير مستقرة أو لاحتشاء عضلة القلب:

يمكن استعمال إينوكزدامد[®] لوعين مختلفين من احتشاء عضلة القلب. تعتمد كمية إينوكزدامد[®] التي ستتناها على عمرك ونوع احتشاء عضلة القلب لديك.

احتشاء عضلة القلب بدون ارتفاع ضغط ST:
تبلغ الجرعة المعتادة 10 و.د (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن كل 12 ساعة.

عادة، سيوصف لك الطبيب أيضا الأسبرين (حمض أسيتيل الساليسيليك).

التحول من إينوكزدامد[®] إلى مضادات التخثر التي تسمى مضادات فيتامين K (مثل الوارفارين)
سيطلب منك الطبيب إجراء فحوصات دم تسمى النسبة المعيارية وسوف يخبرك متى يجب إيقاف إينوكزدامد[®].

التحول من المعالجة بمضادات تخثر تسمى مضادات فيتامين K (مثل الوارفارين) إلى إينوكزدامد[®]
إذا كنت تتلقى عن تناول مضادات الفيتامين K، سيطلب منك الطبيب إجراء فحوصات الدم التي تسمى النسبة المعيارية الدولية وسوف يخبرك متى تبدأ العلاج بإينوكزدامد[®].
التحول من العلاج بإينوكزدامد[®] إلى العلاج القوي المضاد للتخثر المباشر
توقف عن تناول إينوكزدامد[®] توقف عن استعمال إينوكزدامد[®].
إذا بدأتستعمل مضاد القوي المباشر خلال الساعات الأولى للذين تسببت الوقت الذي كان مخصصا للحقن التالي، لم استمر في العلاج بمضاد طبيعي.

التحول من العلاج القوي المضاد للتخثر المباشر إلى إينوكزدامد[®]
توقف عن مضادات مضادات التخثر عن طريق الفم مباشرة. انتظر 12 ساعة بدء الجرعة الأخيرة من مضادات التخثر عن طريق الفم مباشرة قبل بدء العلاج بإينوكزدامد[®].

أ- إذا كنت قد استعمال إينوكزدامد[®] أكثر مما ينبغي
إذا كنت تعتقد أنك تستعمل الكثير أو القليل جدا من إينوكزدامد[®]، أخبر طبيبك أو الممرضة أو الصيدلاني على الفور، حتى إذا لم تكن هناك علامات.
إذا قام الطبيب بفحص أو إطلاع إينوكزدامد[®].
غير غير قصد، خذ هذه إلى قسم الطوارئ في المستشفى فوراً.

العلامات والأعراض:
قد تؤدي جرعة عرضية زائدة بدء الحقن داخل الوريد، خارج الجسم أو الحقن تحت الجلد من إينوكزابارين الصوديوم إلى مضاعفات نزفية.
بعد التناول عن طريق الفم حتى جرعات مرتفعة من غير المرجح أن يتم مضاعفات إينوكزابارين الصوديوم مع ذلك، وحتى مع جرعات عالية من بروتامين، لا يتم تحديد نشاط مضاد Xa من إينوكزابارين الصوديوم (حوالي 60% كحد أقصى) (انظر المعلومات الخاصة بوصف أشكال إينوكزابارين الصوديوم).

ب- إذا تسببت استعمال إينوكزدامد[®]
إذا تسببت جرعة، خذها حالما تتذكرتها. لا تعطي لنفسك جرعة مضاعفة في اليوم نفسه لتعويض عن الجرعة المفقودة. سيحدد طبيبك متى يمكنك تناول المزيد من الحقن.

ج- إذا توقف عن استعمال إينوكزدامد[®]
من المهم أن تستمر في تلقي حقن إينوكزدامد[®] حتى يقرر الطبيب إيقافها. إذا أوقفك العلاج، يمكن أن تصاب بجلطة دموية يمكن أن تكون خطيرة للغاية.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلاني أو الممرضة.

د- الأعراض الجانبية:
لم يتم جميع الأعراض، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارا جانبية، ولكنها لا تحدث بشكل منهجي لدى جميع المرضى.

توقف عن استعمال إينوكزدامد[®] وأخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كان لديك أي علامات على وجود رد فعل تحسسي شديد (مثل طفح جلدي، صعوبة في التنفس أو البلع، تورم في الوجه أو الشفاه أو الفم أو الحلق أو العينين).
مثل الأدوية الأخرى المماثلة (الأدوية المنخفضة التكلفة (الم) قد يسبب إينوكزدامد[®] نزفا، هذا النزيف قد يمثل خطرا على حياتك. في بعض الحالات قد لا يكون النزيف مرئيا.

استشر طبيبك على الفور:
إذا كنت تعاني من أي نزيف لا يتوقف من تلقاء نفسه
إذا أظهرت لديك أعراض انسداد في الأوعية الدموية، مثل ضعف غير عادي أو تعب أو دوخة أو صداع أو تورم غير مبرر.

قد يقرر طبيبك إما إيقافك مؤقتا المراقبة الدقيقة أو تغيير العلاج.

يجب عليك إبلاغ طبيبك على الفور:
إذا كان لديك علامات انسداد في الأوعية الدموية، مثل:
إذا كان لديك نزف، حمراء، تورم في إحدى الساقين: تمثل هذه أعراض تخثر الأوردة العميقة
- ضيق في التنفس، ألم في الصدر، فقدان الوعي أو السعال الدموي: تمثل هذه أعراض الانسداد الرئوي.
- طفح جلدي، تورم في اليدين، تورم في القدمين
- نزف في موقع الحقن
قد يطلب منك الطبيب إجراء فحص دم للتحقق من عدد الصفائح الدموية.

الآثار الجانبية المحتملة:
لا يمكن أن يكون طفح جلدي مؤلم و ظهور بثور حمراء داكنة تحت الجلد لا تختفي إذا ضغطت عليها.

قد يطلب منك الطبيب إجراء فحص دم للتحقق من عدد الصفائح الدموية.

شائعة جدا (يمكن أن تصيب أكثر من شخص من بين 10 أشخاص)
زيادة مستويات إنزيمات الكبد.
شائعة جدا (يمكن أن تصيب شخص من بين 10 أشخاص)
ظهور كدمات أكثر من المعتاد. قد يكون ذلك ناجما عن انخفاض عدد الصفائح الدموية. قد يورونية على الجلد التي من المرجح أن تظهر حول المنطقة التي تم حقن إينوكزدامد[®] فيها، طفح جلدي،
- بشرة حمراء مصحوبة بحكة.
- كدمة أو ألم في موقع الحقن.
- انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء
- ارتفاع عدد الصفائح الدموية في الدم،

غير شائعة (يمكن أن تصيب شخص من بين 100 شخص)
صداع متكرر قد يكون علامة وجود نزف في الدماغ.
أرجية و انتفاخ في المعدة.
أفات خفيفة غير منتظمة الشكل مع أو بدون بثور.
تيجع الجلد (تيجع موضعي)،

- إضرافا الجلد أو العينين وقائمة البول. قد يكون ذلك ناجما عن مشكلة في الكبد.
نادرة (يمكن أن تصيب شخص من بين 1000 شخص)
- رد فعل أرجية حادة. قد تشمل الأعراض: طفح جلدي، صعوبة في البلع أو التنفس، انتفاخ في الشفتين، الوجه، الحلق أو اللسان.
- زيادة مستويات البوتاسيوم في الدم والذي من المرجح أن يحدث لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو مرض السكري. يمكن لطبيبك التحقق من ذلك عن طريق إجراء فحص الدم.

- زيادة في عدد حمضيات الدم. يمكن لطبيبك التحقق من ذلك عن طريق إجراء فحص الدم.
- تساقط الشعر.
- هشاشة العظام (مرض يجعل العظام أكثر عرضة للكسر) بعد الاستعمال على المدى الطويل:
- وخز وخدر وصعف الضلالت (خاصة في الجزء السفلي من الجسم) عندما يكون لديك بزل قطني أو تخدير في العمود الفقري.
- صعوبة في التحكم في المثانة أو الأمعاء (لا يمكن السيطرة نفسك عند الذهاب إلى الحمام)
- عددة مضاعفة أو تواء في موقع الحقن.

أبلغ طبيبك أو الصيدلاني على أي تأثير غير مرغوب فيه أو لم يرد ذكره في هذه النشرة.

في ظروف تخزين إينوكزدامد[®]:
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- يحفظ داخل العبوة الخارجية في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.
- لا يجوز استعمال إينوكزدامد[®] بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على ملصق الحقة المعية أو على العبوة الخارجية.

- لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف أو الفضلات المنزلية.
- اسأل الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد صالحة للإستعمال. هذه الإجراءات تساعد على حماية البيئة.

6. معلومات إضافية:
أ- ماهي محتويات إينوكزدامد[®]
العبوة (الغلاف): إينوكزابارين الصوديوم.

بيانات:
- صياغة: صلب مالح للحقن.
ب- ماهر الشكل الصيدلاني إينوكزدامد[®] وصفه و حجم عبوته:
- حقن ميعاد.
- محلول صافى.
- مسدّن: يميل قليلا إلى البني.
- محلول معقم قابل للحقن تحت الجلد و داخل الوعاء الدموي بنسبة:
- 2000 و.د مضادة لـ Xa (20 مغ) / 0.2 مل و 4000 و.د مضادة لـ Xa (40 مغ) / 0.4 مل.
- عينة تحتوي على 2 أو 4 حقن.
- 6000 و.د مضادة لـ Xa (60 مغ) / 0.6 مل و 8000 و.د مضادة لـ Xa (80 مغ) / 0.8 مل.
- عينة تحتوي على 10 أو 2 حقن.
- 10000 و.د مضادة لـ Xa (100 مغ) / 1 مل.
- علية تحتوي على حقنتين.

ج- اسم و عنوان مالك رخصة التسويق و المصنع:

Unimed
Laboratories

مخابر بونيناد
المنطقة الصناعية القلعة الكبرى صرب: 38 - 4060 تونس
الهاتف: 342 669 73 (216) + الفاكس: 342 472 73 (216) +
موقع الويب: www.unimed.com.tn
د- تم التوافق على هذه النشرة بتاريخ: (2022/01)، رقم النسخة: (xx)

د- قائمة I

و- رقم التسجيل ببلان:
- إينوكزدامد[®] 0.2 مل، علية ذات 2 حقن: xxxxxxxx
- إينوكزدامد[®] 0.2 مل، علية ذات 4 حقن: xxxxxx
- إينوكزدامد[®] 0.4 مل، علية ذات 2 حقن: xxxxxxxx
- إينوكزدامد[®] 0.4 مل، علية ذات 6 حقن: xxxxxxxx
- إينوكزدامد[®] 0.6 مل، علية ذات 2 حقن: xxxxxxxx
- إينوكزدامد[®] 0.4 مل، علية ذات 4 حقن: xxxxxxxx
- إينوكزدامد[®] 0.6 مل، علية ذات 6 حقن: xxxxxxxx
- إينوكزدامد[®] 0.8 مل، علية ذات 2 حقن: xxxxxxxx
- إينوكزدامد[®] 0.8 مل، علية ذات 4 حقن: xxxxxxxx
- إينوكزدامد[®] 1 مل، علية ذات 2 حقن: xxxxxxxx

شائعة جدا (يمكن أن تصيب أكثر من شخص من بين 10 أشخاص)
زيادة مستويات إنزيمات الكبد.

شائعة جدا (يمكن أن تصيب شخص من بين 10 أشخاص)
ظهور كدمات أكثر من المعتاد. قد يكون ذلك ناجما عن انخفاض عدد الصفائح الدموية. قد يورونية على الجلد التي من المرجح أن تظهر حول المنطقة التي تم حقن إينوكزدامد[®] فيها، طفح جلدي،
- بشرة حمراء مصحوبة بحكة.
- كدمة أو ألم في موقع الحقن.
- انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء
- ارتفاع عدد الصفائح الدموية في الدم،