

إينوكزماڊ

2000 و.د. مضادة لـ Xa (20 مغ) / 0.2 مل

4000 و.د. مضادة لـ Xa (40 مغ) / 0.4 مل

6000 و.د. مضادة لـ Xa (60 مغ) / 0.6 مل

8000 و.د. مضادة لـ Xa (80 مغ) / 0.8 مل

10000 و.د. مضادة لـ Xa (100 مغ) / 10 مل

إينوكزابارين الصوديوم

محلول الحقن تحت الجلد - داخل الوعاء الدموي

بقم قرءة هذه النشرة جيدا قبل استعمال أو تناول هذا الدواء

- احتفظ بهذه النشرة، لأنه قد تحتاج إليها لاحقا.
- في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلاني.
- في حال تناول الدواء قد سر صرفه خصوصا إذا تناول على وصفة طبية، ولأنها يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص آخر إن كان ذلك الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.

مهم
لا تستخدم بيطيك المعالج أو الصيدلاني في حال زيادة الأعراض الجانبية أو الإصابة
بمرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحوي هذه النشرة على:

- ما هو إينوكزماڊ[®] وماهي دواعي استعماله
- كيفية استخدام إينوكزماڊ[®]
- طريقة استعمال إينوكزماڊ[®]
- الأعراض الجانبية
- ظروف تخزين إينوكزماڊ[®]
- معلومات إضافية.

إِما هو إينوكزماڊ[®] وماهي دواعي استعماله

الصف العلاجى: مانع للتخثر المنتمى إلى مجموعة الهيبارينات ذات الوزن الجزيئى المنخفض.

دواعي الاستعمال:

يوسف إينوكزماڊ[®] لدى البالغين في حالات:

• العلاج الوقائي لمرض التخثر الوراثي في المرحلة متوسطة وعالية الخطورة، خاصة في حالة العظام أو العمليات العامة، بما في ذلك جراحه الأروام

• العلاج الوقائي لمرض التخثر الوراثي لدى المرضى الذين يعانون من حالات مرضية حادة (مثل قصور القلب الحاد، قصور الجهاز التنفسي، والتعرض للخطورة أو أمراض روماتيزمية) ذوي الحركة المحدودة، ونوي خطر أكبر للتعرض للضرع الجراحية الوراثية.

• علاج تجلط الأوردة العميقة و الامداد الزوئي باستثناء الامداد الزوي المرتبط بعلاج حال التخثر أو الجراحة.

• الوقاية من حدوث جلطة في الدورة الدموية الخارجية أثناء الدبال الدموي.

المتفاعلين:

• علاج الحساسية الصدرية غير المستمرة واحتشاء عضلة القلب بدون ارتفاع قلعة «ST»، بالترزامن مع تناول حمض أسيتيل الساليسيليك عن طريق الفم.

• علاج احتشاء عضلة القلب الحاد المصحوب بارتفاع قلعة «ST»، بما في ذلك المرضى الذين يخضعون لعلاج طلي أو لجراحة الأوعية التاجية عن طريق الجلد الثانوية.

2. قبل القيام بتناول أو استعمال إينوكزماڊ[®]:

• **أ. موانع استعمال إينوكزماڊ[®]:**

• يمنع استعمال إينوكزماڊ[®] : إذا

• كنت تعاني من أرجية من:

• إينوكزابارين الصوديوم،

• هيبارين أو هيبارين منخفض الوزن الجزيئى مثل النادوربارين، تينزابارين أو دلتيابارين.

• تتسبب علامات الأرجية ما يلي: طفح جلدي، صعوبة في البلع أو التنفس، تورم في الوجه، التشنج، الحكة، والحمى.

• إذا كان لديك رد فعل تحسسي للهيبارين أدى إلى انخفاض كبير في عدد خلايا التخثر (الصفيحات الدموية) خلال المائة يوم الماضية.

• إذا كان لديك رد فعل تحسسي مضادة الإينوكزابارين في الدم (الصفيحات الدموية) خلال المائة يوم الماضية.

• إذا كنت تتعرض كثيرا أو لديك حالة مرضية تجلط بنظر طبيب حد مثل:

• فرحة في السعدة أو جراحة حديثة في الجم أو العين، سكتة دماغية نزفية حديثة.

• إذا كنت تستعمل إينوكزماڊ[®] لعلاج الجلطات الدموية و يجب أن تخضع خلال 24 ساعة لـ:

• بـقن في العمود الفقري أو بـقن فطلي

• تدخل جراحي مع تخدير فوق الجافية أو بـقن فطلي

• لديك مرض السكري أو مشاكل في الأوعية الدموية في العين ناجمة عن مرض السكري (المعروف باسم اعتلال الشبكية السكري).

• إذا أجريت مؤخرا جراحة على العين أو المخ.

• كان عركك يبلغ أكثر من 65 سنة وخاصة إذا كان يزيد عن 75 عاما.

• كان لديك فشل كلوي.

• لديك فشل كبدي.

• إذا كنت تعاني من ضيق أو زيادة في الوزن.

• لديك مستويات عالية من البوتاسيوم في الدم (يمكن التحقق من ذلك عن طريق فحص الدم).

• كنت تستعمل حاليا أدوية تزيد من خطر النزيف.

• لديك مشكلة في العمود الفقري أو أجريت عملية جراحية في العمود الفقري.

• إذا كنت أي من الحالات المذكورة أعلاه تغير فقط أو إذا لم تكن متأكدًا، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال إينوكزماڊ[®].

التحذيرات والمراقبة

قد تحتاج إلى إجراء فحص دم قبل البدء في استعمال هذا الدواء وبشكل منتظم أثناء استعماله.
• ما يساعد على فحص مستوى الصفائح الدموية (خلايا التخثر) ومسنوي بوتاسيوم الدم.

الأطفال والمراهقون

لم يتم تقييم سلامة وفعالية إينوكزماڊ[®] لدى الأطفال أو المراهقين.

ج. التفاعلات الدوائية من أخذ هذا المستحضر مع أدوية أخرى أو أعشاب أو مكملات غذائية:

أخر طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تأخذ أو قد تأخذ أي أدوية أخرى مثل:

• الوارفارين (يستعمل لتسيول الدم)

• الأسبرين (المعروف أيضا باسم حمض أسيتيل الساليسيليك أو ASA) أو كلويدوفغرل أو

أدوية أخرى تستعمل لمنع تجلط الدم.

• حقن ديكستران (يستعمل كبديل للدم).

• أيبيروفين، كيتوفلاف، كيتورولاك أو أدوية أخرى تسمى الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية، والتي تستعمل لعلاج الألم، وتورم في التهاب المفاصل و غيرها من الالتهابات.

• ريدنيذبولون، ديكساميثازون أو أدوية أخرى مستخدمة لعلاج الربو والتهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها من الالتهابات.

• الأدوية التي تزيد من مستوى البوتاسيوم في الدم، مثل أملاح البوتاسيوم، مدرات البول، بعض الأدوية لعلاج مشاكل القلب.

العصليات الجراحية وتدخلات التخدير:

إذا كنت بحاجة إلى بـقن العمود الفقري أو القطني أو لعملية جراحية يتم فيها التخدير فوق الجافية أو التخدير النخاعي، فيجب عليك إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني.

د. تناول إينوكزماڊ[®] مع الطعام و الشراب: لا شيء.

هـ. الحمل والرضاعة:

إذا كنت حاملا أو تعتدين أنك حامل أو تخططين لإجابت طفلك، استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.

إذا كنت حاملا ولديك صمام قلب ميكانيكي، قد تكونين أكثر عرضة لخطر الإصابة بتجلط الدم. يجب على طبيبك الاحتاط بكم حول هذا الموضوع.

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، أو تخططين للرضاعة الطبيعية، استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.

و. تأثير إينوكزماڊ[®] على القيادة و استعمال الآلات: لا شيء.

3. طريقة استعمال إينوكزماڊ[®]:

يجب التقيد بتعليمات الطبيب أو الصيدلاني عند استعمال هذا الدواء. استشر طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تعاني من مشاكل مع استعمال إينوكزماڊ[®] في حال الإصابة بالمرض.

• عموما يتم إعطاء إينوكزماڊ[®] عن طريق الحقن تحت الجلد.

• يمكن إعطاء إينوكزماڊ[®] عن طريق الحقن داخل الوريد بعد أنواع معينة من احتشاء عضلة القلب أو بعد تدخل جراحي.

• يمكن إدخال إينوكزماڊ[®] في الخط الشرياني لدورة غسيل الكلى في بداية الحصة.

• لا تحقن إينوكزماڊ[®] داخل العضلة.

الكمية المحددة

• سيحدد الطبيب المعادير من إينوكزماڊ[®] التي تستطيعي كل تختلف الكمية حسب نوعاي الاستعمال.

• إذا كنت تعاني من فشل كلوي، قد تتلقى كمية أقل من إينوكزماڊ[®].

1. علاج جلطات الدم

• تبلغ الجرعة المعتادة 150 وحدة دولية (1.5 مغ) لكل كيلوغرام من وزن المريض مرة واحدة في اليوم أو 100 وحدة دولية (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن مرتين في اليوم.

• سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها لتلقي إينوكزماڊ[®]

2. منع تكون جلطات الدم في الدم أثناء الجراحة أو فترات قة الحركة بسبب المرض:

• تكون الجرعة عند احتمال حدوث خطر جلطة: سوف تتلقى جرعة قدرها 2000 وحدة دولية (20 مغ) أو 4000 وحدة دولية (40 مغ) من إينوكزماڊ[®]. مرة واحدة في اليوم.

• إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية، فعادة ما يتم إعطاء حقنة أول ساعتين أو 12 ساعة قبل الجراحة.

• إذا أصبحت فترتك على الحركة ضعيفة بسبب المرض، فيستحسن على جرعة مقدارها 4000 وحدة دولية (40 مغ) من إينوكزماڊ[®] عن طريق الحقن.

• سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها لتلقي إينوكزماڊ[®]

3. العلاج والوقاية من جلطات الدم إذا تعرضت لنجبة صدرية غير مستقرة أو لاحتشاء عضلة القلب:

• يمكن استعمال إينوكزماڊ[®] لوعين مختلفين من احتشاء عضلة القلب. تعتمد كمية إينوكزماڊ[®] التي ستتناها على عمرك ونوع احتشاء عضلة القلب لديك.

• احتشاء عضلة القلب بدون ارتفاع ضغط ST:

• تبلغ الجرعة المعتادة 100 و.د (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن كل 12 ساعة.

• عادة، سيوصف لك الطبيب أيضا الأسبرين (حمض أسيتيل الساليسيليك).

• سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها للحصول على إينوكزماڊ[®].

• احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع ضغط ST إذا كان عرك أقل من 75 سنة:

• جرعة أولية من 3000 وحدة دولية (30 مغ) من إينوكزماڊ[®]. سيتم حقنها في الوريد.

• في الوقت نفسه، سيحصل أيضا على حقن إينوكزماڊ[®]. تحت الجلد. الجرعة المعتادة هي

100 وحدة دولية إلى 100 لكل كيلوغرام من وزنك، أو 12 ساعة

عادة، يصف لك الطبيب أيضا الأسبرين (حمض أسيتيل الساليسيليك).

• سيحدد الطبيب العدة التي ستحتاجها للحصول على إينوكزماڊ[®].

• لديك مستويات عالية من البوتاسيوم في الدم (يمكن التحقق من ذلك عن طريق فحص الدم).

• كنت تستعمل حاليا أدوية تزيد من خطر النزيف.

• لديك مشكلة في العمود الفقري أو أجريت عملية جراحية في العمود الفقري.

• إذا كنت أي من الحالات المذكورة أعلاه تغير فقط أو إذا لم تكن متأكدًا، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال إينوكزماڊ[®].

بالنسبة للمرضى الذين يخضعون لجراحة الأوعية التاجية عن طريق الجلد: بناء على موعد تلقي الجرعة الأخيرة من إينوكزماڊ[®]، قد يقرر طبيبك إعطاء جرعة إضافية من إينوكزماڊ[®] قبل التدخل الجاهي عن طريق الجلد وذلك عن طريق الحقن في الوريد.

4. الوقاية من الجلطات الدموية في غسيل الكلى.

• الجرعة المعتادة هي 100 وحدة دولية (1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن.

• يتم إعطاء إينوكزماڊ[®] عن طريق الشرياني في دائرة غسيل الكلى في بداية الحصة. تكون الكمية كافية عموما لحصة 4 ساعات. ومع ذلك يمكن لطبيبك أن يعطيك جرعة إضافية بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك:

إذا كنت قادرا على حقن إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

طريقة استعمال:

إذا كنت تحقق إينوكزماڊ[®] بنفسك، سوف يفسر لك طبيبك أو الممرضة كيفية القيام بذلك. لا تحاول القيام بالحقن إذا لم تكن قد تدربت على القيام بذلك. إذا لم تكن متأكدًا، ما يجب بمقدار 50 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية (5 إلى 1 مغ) لكل كيلوغرام من الوزن، عند الضرورة.

• إفسار الجدل أو العينين وقائمة البول. قد يكون ذلك ناجما عن مشكلة في الكبد. (تأذرة: يمكن أن تصيب شخص من بين 1000 شخص)

• ردة فعل أرجية حادة. قد تشمل الأعراض: طفح جلدي، صعوبة في البلع أو التنفس، انتفاخ في الشفتين، الوجه، الحلق أو اللسان.

• زيادة مستويات البوتاسيوم في الدم والتي من المرجح أن يحدث لدى الأشخاص الذين يعانون

من مشاكل في الكلى أو مرض السكري. يمكن لطبيبك التحقق من ذلك عن طريق إجراء فحص الدم.

• زيادة في عدد حمضيات الدم. يمكن لطبيبك التحقق من ذلك عن طريق إجراء فحص الدم بانتظام.

• هشاشة العظام (مرض يجعل العظام أكثر عرضة للكسر) بعد الاستعمال على المدى الطويل:

• وخز وخدر وصعوبات العضلات (خاصة في الجزء السفلي من الجسم) عندما يكون لديك يزل

قلبي أو تخثر في العمود الفقري.

• صعوبة في التحكم في المثانة أو الأمعاء (لا يمكن السيطرة نفسك عند الذهاب إلى الحمام)

• عددة متضخمة أو تورم في موقع الحقن.

أبلغ طبيبك أو الصيدلاني عن أي تأثير غير مرغوب فيه أو لم يرد ذكره في هذه النشرة.

3. ظروف تخزين إينوكزماڊ[®]:

• يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

• يحفظ داخل العبوة الخارجية في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

• لا يجوز استعمال إينوكزماڊ[®] بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على ملصق الحقة المعية أو على العبوة الخارجية.

• لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف أو الفليات المنزلية.

• أسال الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد صالحة للإستعمال. هذه

الإجراءات تساعد على حماية البيئة.

6. معلومات إضافية:

أ. ماهي محتويات إينوكزماڊ[®]

البيانات العامة: إينوكزابارين الصوديوم.

بيانات: ن. صالح للحقن.

ب. ماهر الشكل الصيدلاني إينوكزماڊ[®] وصفه و حجم عبوته:

• - محلول صافى، مسفرّ يميل قليلا إلى البنى.

• - محلول معقم قابل للحقن تحت الجلد و داخل الوعاء الدموي بنسبة:

• 2000 و.د مضادة لـ Xa (20 مغ) / 0.2 مل و 4000 و.د مضادة لـ Xa (40 مغ) / 0.4 مل.

• - علة تحتوي على 2 أو 4 حقن.

• 6000 و.د مضادة لـ Xa (60 مغ) / 0.6 مل و 8000 و.د مضادة لـ Xa (80 مغ) / 0.8 مل.

• - علة تحتوي على 10 أو 2 حقن.

• 10000 و.د مضادة لـ Xa (100 مغ) / 1 مل. علة تحتوي على حقنتين.

ج. اسم و عنوان مالك رخصة التسويق و المصنع:

و. رقم التسجيل ببلان:

• إينوكزماڊ[®] 0/2 مل، علية ذات 2 حقن: xxxxxxxx

• إينوكزماڊ[®] 0/2 مل، علية ذات 4 حقن: xxxxxxxx

• إينوكزماڊ[®] 0/4 مل، علية ذات 2 حقن: xxxxxxxx

• إينوكزماڊ[®] 0/4 مل، علية ذات 4 حقن: xxxxxxxx

• إينوكزماڊ[®] 0/6 مل، علية ذات 2 حقن: xxxxxxxx

• إينوكزماڊ[®] 0/6 مل، علية ذات 4 حقن: xxxxxxxx

• إينوكزماڊ[®] 0/8 مل، علية ذات 2 حقن: xxxxxxxx

• إينوكزماڊ[®] 0/8 مل، علية ذات 4 حقن: xxxxxxxx

• إينوكزماڊ[®] 1 مل، علية ذات 2 حقن: xxxxxxxx

شائعة (يمكن أن تصيب أكثر من شخص من بين 10 أشخاص)

• زيادة مستويات أنزيمات الكبد.

شائعة (يمكن أن تصيب شخص من بين 10 أشخاص)

• ظهور كدمات أكثر من المعتاد. قد يكون ذلك ناجما عن انخفاض عدد الصفائح الدموية.

• قد ورنية على الجلد التي من المرجح أن تظهر حول المنطقة التي تم حقن إينوكزماڊ[®] فيها،

• طفح فطحي.

• بشرة جراح مصحوبة بحكة.

• كدمة أو ألم في موقع الحقن.

• انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء.