


القطر داخلية: مغل ومات لمستخدم الدواء



نيوروبيون

أمبولات

المواد الفعالة: ثيامين هيدرلؤلورريد (فيتامين ب١)، بيريدوكسين هيدرلؤلورريد (فيتامين ب٦)سيانوكوبالامين (فيتامين ب١٢)

فيتامين ب ٦: ثلاث خدام طويل المدى (أكثر من ٦ إلى ١٢ شهراً) من فيتامين ب ٦ جرعات يهيئ فزيد عن ٥٠ ملجم بزيادة إلى ثلاث خدام قصير المدى (أكثر من شهريين) من الجرعات الهيئ فزيد عن ١ جرام يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب (الأسلم في صبيّة). كما وردت شكاي وب وجود قلة صبيّة مراضطابات في الحركة لضطابات حسيّة تشنجات، وفي حالات فويّ حدثت تغيرات في عدد كرات الدم وكمية رذوفعل لالتهاب جل بعث أول جرعات هيئ فزيد جاوز ٢ جرام من هذا الدواء. هذا لشكاي تشسن تدريجيّا بعد التوقف عن تناول الفيتامين.

فيتامين ب ١٢: لوحظ وجود الأزيما طفح جلدي شبيه حبوب الشباب في حالات ناهربعد إعطاء جرعات لئدة.

إذا كان لديكم زيد من اللائلة حوالست خدام هذا المنتج طبياصل بطبي بك أو الصيدلي.

٤. الأعراض اللجياية.

مثل جميع الأويّة، يمكن لئسبب هذا الدواء لئجانبية على الرغم من عدم حدوثها لكل الأشخاص المعالجين.

فيما يلي، تشليف اللجانبية حسب الجهاز العزويّ وعدل التكرار.

نثار ناةرجدا) قد تؤثر على ١ من كل ١٠٠٠٠ من الأشخاص المعالجين)

تفاعلات فراطح ساسية، على بيل المثالات عرق وسرعة بضائل قلب وردو قلع اللجل مئ لال حركة لوطف لجلدي. نفاعلا نغ ساسي تشديدة هلال ح ساس لئلة ١ ماضا بدها انخفاض في ضغط الدم ودوخة فئان وأحيانا صعوبة في التنفس (الحساسية المفرطة).

أثار غير معروفة (لا يمكن تقدير التكرار من البيانات المتاحة)

- ثلاث خدام طويل المدى (أكثر من ٦ إلى ١٢ شهراً) من الجرعات الهيئ فزيد عن ٦٠ ملجم من فيتامين ب ٦ قيسبب اعتلال الأعصاب الحسي الطرفي (مرض في الأعصاب مع وخز تشنمي لئلت ح سلال شكاي تدريجيّا بعد التوقف عن استخدام الفيتامين.

- شكاي ألجهازاله ضميم ثاللغ ثيان الفقيء والإهال هك اجهت علقة بالباطن.

- لوحظ وجود أكزيما طفح جلدي بعث ناول جرعة اليّة من حقن فيتامين ب ١٢.

تلولل بول: أي تشحول لولل بول إلى للولل بني المحمر خلال لساعات القليلة الأولى ملئست خدام الدواء، وعادة مئ عودل وللب وللل لئطبي عي بعد التوقف عن إستخدام المنتج.

- ردود الفعل في موقع الحقن.

٥. ظروف تشخي ني ويويون تمبولات

يحفظ في التلاجة (في درجة حرارة تتراوح ما بين ٢ إلى ٨ درجات مئويّة). يتم الحفظ في الكؤون الأصلي للحماية من الضوء.

احفظ هذا اللجوعيدا عن متناول ونظر للآفال.

للاستخدام هذا اللوبو بعثاري لئتهاء الصلاحية الملكور على عبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في ذلك الشهر.

ثلاث خلص من أي أويّة عن ظري قمياه الصرقلص حالي لئف ايات المئرية، لوك تشخلص من هك في حاويات مان لئتش ق بمخصصة لهذا لغرض. اسأل الصيدلي لئفي لئلة تشخلص من الأوي لئتي ملئ تشست خدمه. حيث أن هذه التدابير من شأنها المساعدة في حماية البيئة.

٦ مغل ومات لئفاية

ما هي محتويات ني ويويون تمبولات

لك لمألة من مئ تشتوي على:

ثيامين هيدرلؤلورريد (فيتامين ب ١) ١٠٠ ملجم
بيريدوكسين هيدرلؤلورريد (فيتامين ب ٦) ١٠٠ ملجم
سيانوكوبالامين (فيتامين ب ١٢) ١ ملجم

- المحكّيات الأخرى: هي دئوس صال صوي وملت عديل درجة الحموضة) سيفاوي دالبؤسي وممل للاحقن.

شكل ني ويويون تمبولات هج نيوال عبوة

يجتوي ني ويويون تمبولات على محل لوللل حقن لفه أحمر شفاف في ملبولت من الزجل الكهرماني سعة مل.

يفهو ني ويويون تمبولات في عبوات من ٦ و ١٥ أمبلوبة سعة ٣ مل.

ليس بالضرورقاً تشكجمي عالعبوات واللجام مسجلة أو مسقوة.

الشركة المصنعة:

سينيكسي لئش إس سي - فئوسا

الشركة المالكة لحق التسويق:

بيئاد جي هيلث ألمانيا جي إم بي لئش - ألمانيا

تاريخ آخر مارجع قباريل ٢٠١٨

إن هذا الدواء
- لدواء مستحضري قئار على صحتك وستهلكه خلاا للتعليمات عرضك للخطر.
تلب عذقة صلل لئطب بي طوريّة الئ استعمال المنصو صل ليها وتعليمات الصي دلاني الذي يفوها لك.
ن- اللطب بي بالوصي دلاني هما الخليئ بال دولي لففعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صلف اللوب بدو فئلتش اللطب بي.
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الآفال.
مجل لس وؤرال صحة العرب واتحاد الصي ادلة العرب

قم بقراءة هذه التعليميدا قبل تناول هذا الدواء

- إحتفظ بهذه النشرة لكأقد تحتاج إليها لاحقاً.

- في حال كان لديك أي سائل تشقت علق بدها المستحضر قيمستشارة الطبيب أو الصيدلي.

- إن هذا الدواء قد تم صيغ صي صال لئناءً على صلف بية، ليهذا يجبع ليك عدم عطائه لأي شخص تشي وإن كان هذا لشخصي عاني من نفس اللعزلتي سببق أعانيت منه.

- قم بالاصطليب بي بك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الالبّة بعرض جانبي لم يتم كئره في هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:

١ ما هو ني ويويون تمبولات وما هي دواعي استعماله

٢ قبال استخدام ني ويويون تمبولات

٣ طريقة استخدام ني ويويون تمبولات

٤. اللعزال جانبية.

٥. ظروفت خزين ني ويويون تمبولات

٦ مغل وم انقلافية

١ ما هي ويويون تمبولات وما هي دواعي استعماله

يجتوي ني ويويون تمبولات عظمي لئم نات ب١ و ب٦ و ب١٢ ، لئتي لهك لئمية خاصل لئف في عيّة عمليّة اللطع صبي. وكغيره من اللفيتاميينات، هي من أهم العناصر لئذائي لئتي لئلطعي عالج سمن ناعجدها بنفسه.

هناك مؤشرات على أن فيتامين ب٦ يهّج توصيل الأمث أثير م طيلت قبال الأم).

في أي الحالات يهري ستخدم ني ويويون تمبولات؟

أمراض اللع صلب بال ناعمة عللن قصلل شديدي في فيتامين ب١ وب٦، وب١٢ دم ليكون العلاج عن طريق الفم غير كاف.

قرب لئمات خدامي ويويون تمبولات

موانع استعمال نيويويون تمبولات

- في حال فراطح ساسي قئال لئفيت لئم نات ب١، ب٦ و ب١٢، أو أي من مكّيات هذا اللوبو (الواردة في القسم ٦).

ينبغ عي عدا مئست خدامي ويويون تمبولات للآفال أو المراهقين (قّل من ١٨ عام) نظراً لوجو محتوي عالي من الهوال فعالة.

الاحتذيرات لئلطي اطات

يجب عدم إعطاء ني ويويون تمبولات عن طريق الحقن في الويدي.

ساعات خدام فيتامين ب٦ عن ظري ق قلل حقن على المدى القصير قي ضعف قؤوت تشخي ص نخلل ناع لئل شوي (موظل حبالل شوي) لئوشخي صق قرال دم اللخب بئث) نوع معين من فقر الدم).

تمت ملاحظة نميل أو وخز لئفي ديني والقديين) لئشرات الاعتلال عصبي الحسي الطرفي أو اللج ساس وبخ في فبعد ثلاث خدام ليومي على المدئ لطويل (أكثر من ٦ الى ١٢ شهرد) لجرع لئنتزيد عن ٠ ملجم من فيتامين ب٦ و في حالاتلست خدام جرعات أكثر من ١ جرام هيّا من فيتامين ب٦ على المدى القصير (أكثر من شهريين). في حالة اللج ساس وبخ لئون مئ لالرجاء مارج اللطب بي بال خاصل لئج مئش طعي مارجعة عدد اللجرع انقي قاف نناول المنتج الدوائي، عنقالاتضاء.

ني ويويون تمبولات والأدوية الأخرى

أطبي بيك أو الصيدلي إذ كن تشنت ناول أويّة أخرى أوقت تشللتها أو من المتقن تشنت ناولها في المستقبل.

يفقد فيتامين فبلع لئت عدا ناضت خدامه مئ قبط اللاني لهل لوي ويول (العامل المضاد للسرطان).

- العلاطويل الأجل مع عي عاض مدر اللبال بول مئ ل ف ويويومي د(قدي ودي إلى نقص فيتامين ب٦ بزيادة إفراز فيتامين ب٦ في البول.

- قدي ودي فيتامين ب٦ لئلخ في صئ لئفي فودي) اللعامل المستخدم لعلاج مئ بللن سون).

- إقتن لئلطببات البيريدوكسين (ب١) (مواد من بين أمور أخئتشبط عمل فيتامين ب٦ مئ ل الإيئري ازيده لئهي درال لئسي لك لوسيرين و د- بينيسيلامين) قد يؤدي إلى زيادة الحاجة لفيتامين ب٦.

الحمض اللئق اللطببي عيّة

في حال كنت حامل أوترضعي طفلك واضطبي عيّة أوك تشنت عت قدي بلك حامل أو تخططين لئل حهل ب غئ لئل تش اللطب بيك أو الصيدلي قبل لئذ الدواء.

توجد لئسرات علل لئج و نات لئك نها غلئافية حولت أثير هذا المنتج اللطبي على اللجمل بقو طور الجنين. لاي عرفال خطر المحتمل على البشر. لا يئصح باستخدام هذا المنتج لئاء اللجمل.

تلف فويّ تامي نات ب ١ وب ٦ وب ١٢ في الللث دي البشري. كما أنال جرعات اللعالية من فيتامين ب ٦ (٦٠٠ ملجم هيّا) يمكن أن تمنع إدراج لي ب اللث دي. لئ صيغست خدام هذا المنتج ناء اللضال عبي عيّة. لئ لك، يجب مقانة مئ اللضال عبي عي لئلضي عئ لئل فائدة العلاج ققل مراءة لئخ لئق قراز إملي قاف اللضال عبي عيّة أو العلاج ست خدامي ويويون تمبولات .

القيادة واستخدام الآلات

لي لئون ني ويويون تمبولات أي تشري كئ علل القدرة على قي ادة مئست خدام الآلات.

ني ويويون تمبولات تحتوي على الصوي وم اللوبؤسي يوم

يجتوي هذا المنتج اللطبي على قّل من ١ ملي مول صويوم (٢٣ ملجم) لك لمألة. وبالتالي فهو تقريبا خالئ الصويوم.

يجتوي هذا المنتج اللطبي على قّل من ١ مل مول ملللبؤسيوم (٣٩ ملجم) لك لمألة. وبالتالي فهو تقريبا خالئ اللبؤسيوم.

٣. طلي ققات خدامي ويويون تمبولات

استخدم هذا الدواء دائماً فوقاً لتعليمات اللطب بي. استطبي بك إذ كنت غير متأكد.

الجرعة الموصى بها:

في الحالاتل شديدة الحادة (مألة واحدة) وحدي هي لئت تنحسر الأعراض الحادة.

بمجرد أن تتحسن الأعراض بمألة واحدة ١-٣ مرات في اللأبوع.

لدعم أو لمصلحة العلاج اللحقن لولقاية مئ كئرار حدوث المرضي نصح بئ ناول قئون ني ويويون تممغلغة.

طريقة استخدام ني ويويون تمبولات

للحقن العضلي.

يتم حقن ني ويويون تمبولات في العضلات (على بيل المثال لعضلة الأوية).

استخدامه للآفال والمراهقين

يجب عدا مئست خدامي ويويون تمبولات للآفال والمراهقين (قّل من 8 لسنة).

ذا الاستخدمت حجة من ني ويويون تمبولات أكبر من الجرعة المحددة:

فيتاميينات ب ١ وب ٦ وب ١٢ طاقاً لعليّا وسعاً، أي اللل فرق بين اللعزل لئلية للجرعة الزائدة كبير جداً.

فيتامين ب ١: تم الإبلاغ عئال شكاي لئت اللقيب ع لست خدام جرعة أكبر لئئة مرة من الجرعة الموصى به: الصدا لئل نقاش نجات اللض ع اللوشل لئض طرابات ضربات القلب لئج ساسية.