

سيفزول[®] 1 غ

سيفزولين 1 غ/قارورة

مسحوق لمستحضر للحقن داخل العضلة أو الوريد

الشكل :

مسحوق لمستحضر للحقن داخل العضلة أو الوريد.

- سيفزول[®] (داخل العضلة أو الوريد) : علية تحتوي على قارورة من المسحوق و وحدة من المحلول ماء صالح للحقن ذات 5 مل.
- سيفزول[®] (داخل العضلة أو الوريد) : علية تحتوي على 25 قارورة من المسحوق (بدون محلول).
- سيفزول[®] (داخل العضلة) : علية تحتوي على قارورة من المسحوق و وحدة من المحلول ليدوكاين هيدروكلوريد ذات 5 مل.

التركيبة :

- سيفزول[®] (داخل العضلة أو الوريد)

لقارورة من المسحوق :

- سيفزولين..... 1 غ
(في شكل سيفزولين الصوديوم)
• لوحة من المحلول :
ماء للحقن كافي لـ..... 5. مل
• سيفزول[®] (داخل العضلة أو الوريد) (عليه ذات 25 قارورة)
لقارورة من المسحوق :

- سيفزولين..... 1 غ
(في شكل سيفزولين الصوديوم)
• سيفزول[®] (داخل العضلة)
لقارورة من المسحوق :
سيفزولين..... 1 غ
(في شكل سيفزولين الصوديوم)

- لوحة من المحلول :
ليدوكاين هيدروكلوريد 50. مل
سواغات : هيدروكسيد الصوديوم، ماء للحقن كافي لـ..... 5. مل
• سواغ ذو أثر ملحوظ : الصوديوم (انظر فقرة احتياطات الإستعمال).
الصنف العلاجي :

مضاد حيوي من عائلة البيتاكتامين و تحديدا سيفالوسبورين (الجيل الأول).

- دواعي الإستعمال :
- علاج الإصابات الجرثومية الخطيرة الحساسة للسيفازولين، خاصة التلغغات: القصبية الرئوية، الأنث، الحنجرة و الأنف، الفموية، الدموية، الشغافية، التناسلية و البولية، الجلدية، المصلية، العظام و المفاصل.

يستعمل سيفزول[®] كملاخ وقائي عند التدخلات الجراحية :

- جراحة الأعصاب (حج الحقف، تحويل السائل النخاعي)،
 - جراحة القلب،
 - جراحة الصدر،
 - جراحة الأوعية،
 - جراحة المعدة و الأمعاء،
 - جراحة المجاري الصفراوية،
 - الولادة القيصرية،
 - استئصال الرحم عن طريق البطن أو المهبل،
 - جراحة الرأس و الرقية مع فتح السبيل الفموي، البلعومي،
 - جراحة العظام مع زرع معدات،
- نظرا للمرور الضعيف للسيفازولين عبر السائل النخاعي، لا يستعمل هذا المضاد الحيوي لعلاج التهاب السحايا حتى في حالة الجرثائم الحساسة.

موانع الإستعمال :

الحساسية للمضادات الحيوية المنتمة لعائلة السيفالوسبورين.

- بالنسبة لسيفزول[®] 1 غ للحقن داخل العضلة و المحتوي على الليدوكاين :
- الحساسية لليدوكاين أو لمخدرات موضعية أخرى من عائلة الأميد.
 - البورفيريا.
 - الإحصار الأذيني البطيني الغير مقترن.
 - الصدمة قلبية المنشأ.
 - الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 شهرا.
- لا يجب حقن سيفزول[®] 1 غ للحقن داخل العضلة، عبر الوريد و ذلك لإحتوائه على الليدوكاين.
- التحذيرات و احتياطات الإستعمال :
- التحذيرات :
- عند ظهور أعراض حساسية يجب التوقف عن العلاج وإستشارة الطبيب.
 - يجب الخضوع لإستجواب طبي قبل إستعمال السيفالوسبورين.
 - يجب إعلام الطبيب المباشر في حالة إصابتك بآرتكاريا، طفح جلدي، حكاك أو وذمة كوينك عند إستعمال مضاد حيوي آخر في السابق.

- في حالة إصابتك بإسهال ناتج عن إلتهاب غشائي، يجب التوقف عن العلاج و إستشارة الطبيب.
 - لا يجب حقن سيفزول[®] 1 غ للحقن داخل العضلة، عبر الوريد و ذلك لإحتوائه على الليدوكاين.
- احتياطات الإستعمال :
- يجب الحذر و مراقبة الوظيفة الكلوية خلال مدة العلاج خاصة عند إستعمال مضادات حيوية سامة للكلية (خاصة من عائلة الأمينوزيد) أو إستعمال أدوية مدرة للبول كالفيروزيميد و حمض الإيثاكرينيك.
 - في حالة القصور الكلوي، يجب ملازمة المقادير المنصوح بها.
 - يحتوي هذا الدواء على 48,3 مغ من الصوديوم في كل قارورة : لذلك على المرضى الذين يتبعون نظام غذائي فقير من الملح، الحذر من كمية الصوديوم الموجودة في الدواء.
 - التفاعلات الدوائية و تفاعلات أخرى :
 - لتجنب التفاعلات بين مختلف الأدوية، ينبغي إعلام الطبيب في حالة إستعمالك لأدوية علاجية أخرى.
 - الحمل و الإرضاع :
 - الحمل :

لا يمكن إستعمال سيفزول[®] إلا بعد إستشارة طبية.

الإرضاع :

الإرضاع جائز عند المعالجة بسيفزول[®]

يجب إعلام الطبيب في حالة إصابة الرضيع بإسهال، طفح جلدي أو حساسية.

في جميع الحالات، يجب إستشارة الطبيب.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

- تفاعلات حساسية : تآق، وذمة عصبية وعائية، طفح جلدي، حمى.
- تفاعلات دموية : كمية مفرطة أو منخفضة لأحد مكونات الدم، نزول عند التوقف عن العلاج.
- إضطرابات الجهاز الهضمي : غثيان، فقدان الشهية، تقيؤ، إسهال، نادرا إلتهاب غشائي (مرض الأمعاء مع إسهال و آلام في البطن).
- داء المبيضات في الجهاز الهضمي أو المهبل.
- اضطرابات الكبد : تغيرات عابرة في نتائج تحليل الكبد.
- تسمم كلوي : خاصة في حالة المعالجة المرافقة الأمينوزيد والأدوية القوية المدرة للبول.
- إلتهاب وريدي بعد الحقن داخل الوريد.
- ألم في موضع الحقن عند حقن الدواء في العضلة.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني في حالة ظهور تأثيرات غير مرغوب فيها و مقفلة أخرى غير مذكورة في هذه النشرة.

المقادير و طريقة الإستعمال :

المقادير :

المقادير المعتادة :

• البالغين :

من 0,50 إلى 1 غ كل 8 ساعات إلى 12 ساعة.

يمكن زيادة هذه المقادير حسب خطورة الإصابة الجرثومية.

• الأطفال و الرضع :

بمعدل 25 مغ إلى 50 مغ / كغ / اليوم.

يمكن زيادة هذه المقادير حسب خطورة الإصابة الجرثومية.

• في حالة الوقاية من التلغغات الجرثومية بعد التدخلات الجراحية :

- يجب إستعمال المضاد الحيوي للوقاية لمدة قصيرة، غالبا ما تقتصر على مدة التدخل الجراحي، 24 ساعة أحيانا، لكن لا تمتد أبدا إلى 48 ساعة.
- 2 غ بالحقن داخل الوريد عند تحريض التخدير، ثم حقن لـ 1 غ كل 4 ساعات خلال مدة الجراحة.

- حقن 1 غ كل 8 ساعات في حالة إستعمال سيفزول[®] بعد التدخل الجراحي.

طريقة الإستعمال :

• داخل العضلة :

- الحقن العميق داخل العضلة.

لا يجب حقن سيفزول[®] 1 غ للحقن داخل العضلة، عبر الوريد و ذلك لإحتوائه على الليدوكاين.

• داخل الوريد :

يمكن إستعمال سيفزول[®] بالحقن مباشرة أو بالحقن الإروائي المتواصل أو الغير المتواصل.

الحفظ :

يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مائوية.

جدول أ

التأشيرة :

- 9093271 (سيفزول[®] 1 غ : علية ذات قارورة و وحدة ماء للحقن ذات 5 مل).
- 9093272H (سيفزول[®] 1 غ : علية ذات 25 قارورة، بدون محلول).
- 9093371 (سيفزول[®] 1 غ : علية ذات قارورة و وحدة ليدوكاين هيدروكلوريد ذات 5 مل).

إن هذا دواء

مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء و ينبغيهم ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون إستشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

صاحب التسجيل/المشغل/المصنّع

مخابر يونيماد

المنطقة الصناعية القلعة الكبرى ص.ب : 38 - 4060 تونس
الهاتف : 73 342 669 (+216) - الفاكس : 73 342 472 (+216)
موقع الواب : www.unimed.com.tn



نشرة : 05

تاريخ : 2020 / 07

14CFZ101