

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول مرضك أو دوائك، اسأل طبيبك أو ممرضك أو الصيدلي.  
تم وصف هذا الدواء لك لا تعطيه للأخرين. قد يضرهم حتى لو كانت أعراضهم هي نفس أعراضك.  
أصبحت أي من الآثار الجانبية خطيرة، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، فيرجى إخبار  
طبيبك أو ممرضك أو الصيدلي.

١. ما هو هاي دي؟ وما هي استخداماته
٢. قبل أخذ هاي دي؟
٣. كيف تأخذ هاي دي؟
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيفية تخزين هاي دي؟
٦. معلومات إضافية

يحتوي كبسولات هاي دي<sup>®</sup> على المادة الفعالة كوليكالسيوميفرول (فيتامين د<sub>3</sub>).  
يوجد فيتامين د في النظام الغذائي ويتم أيضاً انتاجه في الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس. يُنظّم فيتامين د<sub>3</sub> امتصاص الكالسيوم وعملية الأيض بالإضافة إلى إدراج الكالسيوم في أنسجة العظام.

٢. قَبْلُ اخْذِ هَاي دِي ②

هذا التطبيق عليك اي مما ذكر في الأعلى، لا تتناول كبسولات الكوليكايسيفيرول.

يجب التحكم في تركيزات الفوسفات في البلازما أثناء العلاج بفيتامين د لتقليل مخاطر التكتس خارج الرحم. يتضح بأن المرضى الذين يتلقون جرعات دوالية من فيتامين (د) يجب أن يخضعوا للمراقبة تركيز الكالسيوم في البلازما على فترات منتظمة، خاصة في البداية أو إذا كانت الأعراض تشير إلى السمية، وعند الرضع، إذا كانوا يرضعون من حلمات يتلقين جرعات دوالية من فيتامين د.

تحدث مع طبيب أو الصيدلي أو تاتال كيولات هاي دي.  
 إذا كانت تعاني من إصابة أو مرض في الكلى وتنتقل علاجاً بطول الأمد بهذا الدواء، قد يرغب الطبيب في قياس مستويات الكرياتينين في الدم أو بولك.  
 قد تكون مستويات الكرياتينين لأمراس القلب.  
 إذا كان لديك الساركويد (استمرار) في الجهاز المناعي يمكن أن يؤثر على الكبد أو الرئتين أو الجلد أو الغدة (الغابوية).  
 إذا كانت تاتالين تتناول جرعة واحدة من الكرياتينين أو فوتينين، قد تاتال كيولات الكوليكاكسيفورول، سرياق.  
 إذا كانت تاتالين تتناول الكرياتينين مع الدم لتأكد من عدم ارتفاعها بشكل زائد.

- الكورتيكوستيرويدات: قد تعمل الكورتيكوستيرويدات على إبطاء تأثير فيتامين د.

الرسالة الحقيقية، على الرغم من أنهم يوصون، إذا كانت الأم للتناول جرعات دوائية من فيتامين د، بما أنه الرضيع عن كبد لفرط كالسيوم الدم أو المظاهر السريرية لسمية فيتامين د.

هاي دي® كيمولات تحتوي على زيت أرشيس (زيت الفول السوداني). إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الفول السوداني أو فول الصويا، فلا تستخدم هذا المنتج الطبي.

خذ دائماً هاي دي® تماماً كما أخبرك طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية. يجب عليك مراجعة طبيبك أو مقدم الرعاية

في حالة حدوث تسمم. لقد ذكر أن مكملات فيتامين (د) الغذائية قد تكون ضارة للأشخاص الذين يتلقون بالفعل كمية كافية من خلال النظام الغذائي والتعرض لأشعة الشمس، حيث أن الفرق بين التركيزات العلاجية والسامة صغير نسبيًا.

لون أزرق براق رقم ١ في هاي دي ٢,٠٠٠ وحدة دولية و ٥٠,٠٠٠ وحدة دولية، لون أصفر في هاي دي ٥,٠٠٠ وحدة دولية، ولون أحمر رقم ٣٣ في هاي دي ١٠,٠٠٠ وحدة دولية.