

**فieroMal****محلول للاستخدام الجلدي****المواد الفعالة:** فلورويوراسييل, حمض الساليسيليك

احرص على قراءة النشرة المرفقة بالكامل بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء، لأنها تحتوي على معلومات مهمة.

- احتفظ بالنشرة المرفقة، فربما تحتاج إلى قراءتها لاحقاً.
- إذا كان لديك أي أسئلة فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً فلا تقم بإعطائه للأخرين. فقد يسبب لهم ضرراً، حتى وإن كانوا يعانون من نفس الأعراض التي لديك.
- إذا لاحظت ظهور أي أعراض جانبية، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي، كما يسري هذا على الأعراض الجانبية غير الواردة في النشرة المرفقة. انظر فقرة رقم 4.

ما هي محتويات هذه النشرة المرفقة

1. ما هو فieroMal وما هي دواعي استخدامه؟

2. ما الذي ينبغي عليك مراعاته قبل استخدام فieroMal؟

3. ما هي طريقة استخدام فieroMal؟

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟

5. كيف يُحفظ فieroMal؟

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو فieroMal وما هي دواعي استخدامه؟

فieroMal هو عقار لعلاج التآليل.

يُستخدم فieroMal لعلاج التآليل الشائعة، والتأليل الموجودة أسفل بطن

القدم (سمار اللحم) وكذلك التآليل السطحية (التآليل المسطحة اليافعة

على الذراعين والساقين.

2. ما الذي ينبغي عليك مراعاته قبل استخدام فieroMal؟

يُحظر استخدام فieroMal في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الفلورويوراسييل أو حمض

الساليسيليك أو أي من مكونات الدواء الأخرى المذكورة بالفقرة 6.

- أو إذا كنت في فترة الرضاعة.

- أو إذا كنت حاملاً، أو إذا كنت لا تستبعدين حدوث الحمل،

- أو لدى الرضع،

- أو إذا كنت مصاباً بخلل في وظائف الكلى،

أو إذا كنت تستخدم أدوية معينة مضادة للفيروسات، مثل لعلاج

أمراض الجدري أو الحزام الناري (علاج الهربس النطاقي). يُحظر

استخدام فieroMal إذا كنت تتناول حالياً أو في الأسبوع الرابع الماضية

علاجاً يحتوي على البريفودين أو السوريفودين أو أي مجموعات

مشابهة في إطار علاج الهربس النطاقي.

فعندما تجتمع مادة الفلورويوراسييل مع مادة البريفودين

والسوريفودين ومشتقاتها، فإن حدة الأعراض الجانبية لدواء فieroMal

قد تزيد إلى درجة خطيرة.

يمكنك البدء في العلاج باستخدام الفلورويوراسييل بعد مدة لا تقل عن

4 أسبوعين من انتهاء علاج الهربس النطاقي باستخدام البريفودين أو

السوريفودين.

إذا كنت تتناول أي علاج يسبب الإصابة بعذوى الهربس النطاقي أو

ُولجت منه مؤخراً، فپرجي إبلاغ طبيبك بالأدوية التي تناولتها.

فieroMal غير مخصص للاستخدام على مساحة جلد واسعة (أكبر من 25 سم<sup>2</sup>)،

ويحظر أن يلامس العين أو الأعضية المخاطية.

**تحذيرات وإجراءات وقائية**

يُرجى التوابل مع طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام دواء فieroMal.

- إذا كنت تعلم أن إنزيم ديهيدرو بيريميدن - ديهيدروجينيز (DPD)

غير نشط لديك (نقص DPD الكلي)، يؤدي هذا الإنزيم دوراً هاماً في

هدم الفلورويوراسييل وهي المادة الفعالة لدواء فieroMal. من الممكن

أن يؤدي تنشيط الإنزيم أو تقليل نشاطه (مثلاً عن طريق تعاطي

مثبطات DPD مثل البريفودين أو السوريفودين) إلى تراكم مادة

الفلورويوراسييل المعاقة. إذا فمن المهم لا تستخدم فieroMal بأكثر مما

هو مذكور في الفقرة 3 هنا في دليل الاستخدام.

يُرجى توخي الحذر عند استخدام فieroMal، إذا كنت تتناول فيتيوتين

لعلاج نوبات الصرع. فقد يؤدي الاستخدام المتزامن لدواء فieroMal مع

دواء فيتيوتين إلى ارتفاع مستوى مادة فيتيوتين في الدم. لذلك ينصح

عليك فحص مستوى فيتيوتين في الدم بانتظام.

إذا كانت الأسطح المصابة بالتأليل ذات طبقة جلدية رقيقة، فضع دواء

فieroMal على نحو أقل تكراراً، وافحص الموضع المعالجة لدى الطبيب

بوتيرة متكررة نظرًا لإمكانية حدوث تندبات.

ينبغي مراعاة أنه إذا كانت قدرتك محدودة على الشعور بالملمس والألم

ودرجة الحرارة (أي اضطراب في الشعور، مثلاً بسبب داء السكري)، فمن

الضروري إجراء فحص طبي بانتظام.

عند وضع فieroMal يُحظر ملامسته لقماش أو الإكريليك (مثلاً حوض الاستحمام

المصنوع من الإكريليك). فال محلول الناتج قد يسبب بقعًا يمكن إزالتها.

ينبغي عدم وضع فieroMal على الآفات الدامية.

**الأطفال**

يُحظر استخدام فieroMal للرضع. نظرًا لأن خطر الجرعة الزائدة عند

الأطفال أكبر منه عند البالغين، لذا يُحظر تجاوز الجرعة الموصى بها من

حيث مساحة الدهان وتكرارها.

**استخدام فieroMal بالتزامن مع أدوية أخرى**

أبلغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول حالياً أو تتناول أو

استخدمت مؤخرًا أدوية أخرى، أو تنوي تناول أو استخدام أي أدوية أخرى.

فهذا الأمر مهم جدًا لأن تناول عدة أدوية في وقت واحد يمكن أن يعزز أو

يضعف تأثير بعض الأدوية.

يُحظر استخدام فieroMal إذا كنت تتناول حالياً أو تتناول في الأسابيع

الأربعين الماضية أدوية معينة لعلاج أمراض فiroسيمة مثل جردي الماء أو

الحزام الناري (البريفودين أو السوريفودين أو مشتقاتها).

يجب أن تكون شديد الحرص عند تناول دواء فieroMal مع

فيتيوتين. فالاستخدام المنهجي لمادة الفلورويوراسييل في علاج السرطان

أظهر أن تناول فيتيوتين في نفس الوقت قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى

فيتيوتين في الدم.

قد يؤدي تناول المحلول المحملي بحمض الساليسيليك إلى تأثيرات متباينة مع

مادة الميثوتريكسات (دواء لعلاج أمراض فiroسيمة روماتيزمية أو السرطان أو

الصدفية الحادة) أو مادة السلفونيلوريبيا موجود في بعض الأدوية الخالفة

لمستوى السكر في الدم (أدوية السكر).

**فتررة الحمل والرضا**

إذا كنت حاملاً أو تُرضعين، أو يُحتمل أن تحملين، أو كنت تتوينين الحمل.

فعليك استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.

يُحظر استخدام فieroMal في فترة الرضا

أثناء الحمل وإذا كنت لا تستبعدين حدوث الحمل بدرجة أكيدة.

تسبعدين حدوث الحمل بدرجة أكيدة.

**القدرة على القيادة واستخدام الآلات**

ليس مطلوباً اتخاذ إجراءات وقائية خاصة.

يحتوي فieroMal على ثانوي ميثيل السلفوكسيدي وكحول (إيثانول).

قد يتسبّب ثانوي ميثيل السلفوكسيدي في حدوث تهيّجات بالجلد.

يحتوي هذا الدواء على 160 مجم كحول (إيثانول) لكل جرام، فإذا كان

الجلد يعاني من أضرار فقد يؤدي ذلك إلى شعور بالحرق.

ينبغي الانتباه إلى أن فieroMal قابل للاشتعال قبل تكون طبقة الدهان. فلا

تشعل أي سجائر، ولا تقترب من لهب مكشوف، حتى يجف فieroMal تمامًا.

3. ما هي طريقة استخدام فieroMal؟  
احرص دائمًا على استعمال هذا الدواء بالكيفية التي أخبرك بها الطبيب أو الصيدلي تماماً، إذا كانت لديك أي مخاوف، فاستشر طبيبك أو الصيدلي.الجرعة  
ما لم يصف الطبيب غير ذلك، يوضع محلول فieroMal على كل ثؤلول  
مرتين أو ثلاث مرات يومياً.**طريقة الاستعمال**  
للاستخدام الجلدي.

يجب أن يُصَبِّب فieroMal فقط على الجلد السليم المحيط بها، ويُبْغِي عند الضرورة تقطيع طبقة الجلد المحيط بمفعجون أو مرمم، يمكن أن يوصيكم طببك أو الصيدلي عند الحاجة بمنتج مخصوص لهذا الغرض. افتح الزجاجة عن طريق فتح الغطاء إلى أسفل، ثم لفه في الوقت نفسه عكس اتجاهقارب، يُوصى بفتح الفرشاة على عمق الزجاجة قبل المسح برفق. في حالة التآليل متباينة الصغر، يُنْبَغِي استخدام عود أستان أو ما شابه بدلاً من الفرشاة من أجل وضع المحلول بدقة. قبل وضع محلول فieroMal في كل مرة يُنْبَغِي أن تُزيل طبقة الدهان الموجودة عن طريق مسحها برفق.

في حالة التآليل متباينة الصغر، يُنْبَغِي استخدام عود أستان أو ما شابه بدلاً من الفرشاة من أجل وضع المحلول بدقة. قبل وضع محلول فieroMal في كل مرة يُنْبَغِي أن تُزيل طبقة الدهان الموجودة عن طريق مسحها برفق.

يُوصى باستشارة طببك بانتظام أثناء العلاج، أثبتت التجارب أنه من المناسب في كثير من الحالات (مثلًا في حالات التآليل الجاحظة بشدة أو تآليل بطن القمم) أن يقوم الطبيب بإزالة النسيج الميت نتيجة العلاج بمحلول فieroMal.

**مدة الاستعمال**يبلغ متوسط مدة الاستعمال 6 أسابيع. وبعد نجاح العلاج يُنْبَغِي الاستمرار فيه لمدة أسبوع آخر.  
يُرجى التواصل مع طببك أو الصيدلي إذا كان لديك انتباخ بأن تأثير فieroMal قوي جدًا أو ضعيف جدًا.

إذا استخدمت كمية كبيرة من فieroMal أكثر من اللازم، فعليك التوجه في هذه الحالة إلى طببك المعالج.

إذا نسيت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

**إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك**

إذا نسيت الاستخدام في إحدى المرات فلا تستخدم جرعة مضاعفة في المرة التالية. بل واصل الاستخدام كما هو موصوف من قبل طببك أو كما هو موضح في هذه النشرة المرفقة.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا أوقفت استخدام فieroMal فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت الاستخدام فعليك إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فپرجي استشارة الطبيب أو الصيدلي.