

**فيرموكس (ميبيندازول) 500 مجم**

- يرجى قراءة هذه النشرة بأكملها بعناية قبل بدء استعمال هذا الدواء، نظرًا إلى احتوائها على معلومات تهمك.
- احتفظ بهذه النشرة؛ فقد تحتاج إلى قرائتها مرة أخرى.
  - إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، اسأل طبيبك أو ممرضتك..
  - تم وصف هذا الدواء لك فقط. فلا تسمح للأخرين بتناوله. فقد يسبب لهم الضرر، حتى ولو تشابهت الأعراض لديهم مع حالتك.
  - إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيرًا، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، فيرجى إخبار طبيبك أو ممرضتك.
  -

**في هذه النشرة:**

1. ما هو فيرموكس وما استخداماته
2. قبل استخدام فيرموكس
3. طريقة استعمال فيرموكس
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين فيرموكس
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

- 1. ما هو فيرموكس وما استخداماته**
- يحتوي فيرموكس على المادة الفعالة "ميبيندازول". دواء لعلاج الديدان، مثل:
- الدودة الدبوسية (السرمية الدبوسية)؛
  - الدودة السوطية (المُسلكة الشعرية الذيل)؛
  - الدودة المدورية (الصفر الخراطيني)؛
  - الدودة الخطافية (إنكستوما الأثنا عشرية، الفاكهة الأمريكية)؛
  - "الشعرينة" (الشعرينة الحازونية)؛
  - الدودة الريطية الكلاب (المشوكة الحبيبية أو داء المشوكات الكيسية "داء غداري")؛
  - الدودة الشريطية الثعلبيه (المشوكة العديدة المساكن أو داء المشوكات السنخية) للبالغين فقط.

**2. قبل أن يتم إعطاؤك فيرموكس**

اطلب نصيحة طبيبك أو الممرضة قبل تناول أي دواء.

**لا تستخدم فيرموكس في الحالات التالية:**

- للأطفال أقل من عام واحد

- إذا كنت تعاني من حساسية (مفرط التحسس) لهذا الدواء

لا تستخدم هذا الدواء إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك. إذا لم تكن متأكدًا، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام أقراص فيرموكس.

ما الاحتياطات الخاصة التي يجب عليك اتخاذها عند تناول فيرموكس 500 مجم؟

**الحمل**

يجب عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت حاملاً أو تظنين أنك ربما تكونين حاملاً وهو سيقرر ما إذا كان بإمكانك تناول فيرموكس 500 مجم.

**الرضاعة الطبيعية**

إذا كنت مرضعة، يجب عليك التحدث إلى طبيبك أولاً، وهو سيقرر ما إذا كان يمكنك تناول فيرموكس 500 مجم.

**قيادة السيارات أو تشغيل الآلات**

لا يؤثر فيرموكس 500 مجم في يقظتك أو قدرتك على القيادة.

**الأدوية الأخرى**

أخبر طبيبك إذا كنت تتناول سيميتدين (دواء يستخدم لحموضة المعدة). إذا كان عليك تناول أكثر من قرص واحد من فيرموكس 500 مجم، فمن الجائز الطبيب إلى تغيير الجرعة. أخبر طبيبك إذا كنت تتناول مترونيدازول (دواء لعلاج الالتهابات البكتيرية والمتعددة بالأولي) حتى يتمكن من تحديد ما إذا كان يجب عليك تناول فيرموكس

### 3. كيفية تناول فيرموكس والجرعة

يأتي فيرموكس 500 مجم على شكل أقراص تؤخذ عن طريق الفم، (بالنسبة إلى الأطفال الصغار أو المرضى الآخرين غير القادرين على ابتلاع الأقراص، قد يكون من المناسب استخدام الشكل السائل من هذا الدواء. أسأل الطبيب أو الصيدلي عن ذلك).

يمكن مضغ الأقراص أو ابتلاعها كاملة. اطحن الفرسق قبل إعطائه لطفل صغير. راقب الطفل دائمًا في حال استعماله هذا الدواء. تناول الأقراص مع سائل.

ليس عليك تناول فيرموكس 500 مجم مع الطعام، ليس عليك اتباع نظام غذائي خاص أو تناول المنتجات التي تحفز البراز.

عادة ما يتناول الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة والبالغون قرصاً واحداً من فيرموكس 500 مجم في جرعة واحدة. لا تغير هذه الجرعة ما لم يخبرك الطبيب المعالج بذلك.

في المناطق التي تتكرر فيها عدوى الديدان، يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة والبالغين تناول قرص واحد من فيرموكس 500 مجم من مرة إلى مرتين في السنة. بهذه الطريقة، يمكن الحد من الإصابة بالديدان لدى جميع السكان.

الإصابة بالدودة "الشعرينة" أو شريطية الكلب أو شريطية الثعلب: تناول الجرعة التي يقررها الطبيب واتبع تعليماته.

### 4. الآثار الجانبية المحتملة

تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية التي قد تحدث أثناء العلاج بدواء فيرموكس 500 مجم:

- الدوخة
- أوجاع وآلام في المعدة، وغازات معوية، وإسهال، وغثيان، وقيء
- الطفح الجلدي
- قشعريرة
- تساقط الشعر، والذي قد يكون في بعض الحالات دائمًا
- اضطرابات الدم والكبد
- يمكن أن يحدث مرض التهاب الكلى وانخفاض حاد في عدد خلايا الدم البيضاء مع الاستخدام المطول لدواء فيرموكس 500 مجم بجرعات أعلى بكثير من تلك الموصى بها (أكثر بكثير مما يوصف عادة).

في حال ظهور أي من الأعراض التالية، اتصل بطبيبك على الفور:  
- اضطراب جلدي شديد يتكون من طفح جلدي، وثور على الجلد، وتقرحات في الفم أو العينين أو المنطقة الشرجية التناسلية، إلى جانب الحمى  
- تفاعلات بعد فترة وجيزة من تناول العلاج ويُعرف من خلال ظهور طفح جلدي، وأو حكة، وأو ضيق في التنفس، وأو تورم الوجه  
- تفاعلات حساسية مفرطة تحدث بعد تناول الدواء بفترة وجيزة يتم تشخيصها من خلال الشرى والحكة والإحمرار والإغماء وصعوبة في التنفس من بين أعراض أخرى محتملة  
- تم الإبلاغ عن حدوث تشنجات (نوبات)، بما في ذلك في الرُّضَّع. يجب عدم إعطاء فيرموكس 500 مجم للأطفال دون سن سنة.

لا تتردد في إبلاغ طبيبك أو الصيدلي بهذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى.

### الجرعة الزائدة

إذا تم تناول كميات أعلى من الموصى بها، أو إذا تم تناول فيرموكس لفترات طويلة، فقد تحدث اضطرابات في الدم والكلى والكبد، بعضها قد يكون خطيرًا. قد ينساقط الشعر، والذي قد يكون في بعض الحالات دائمًا. لذلك، يجب عدم الخضوع لهذا العلاج لفترة طويلة إلا تحت الإشراف الطبي الدقيق فقط. إذا كنت قد تناولت جرعة من فيرموكس 500 مجم أكثر من اللازم، فقد تعاني من تقلصات في المعدة وغثيان وقيء وإسهال. إذا حدث ذلك، فتحتاج إلى طبيبك.

### 5. كيفية تخزين فيرموكس

- يُخزن في درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و30 درجة مئوية.
- يمكن الاحتفاظ بهذا الدواء لفترة محددة فقط. لا تستخدم فيرموكس 500 مجم بعد التاريخ المطبوع بعد كلمة "EXP" (الشهر والسنة)، حتى لو كان مُخزنًا بطريقة صحيحة.

## 6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

- ما يحتويه فيرموكس
- المادة الفعالة هي ميبيندازول. تحتوي الأقراص على 500 مجم من مادة الميبيندازول
  - المكونات الأخرى: مونوهيدرات اللاكتوز، وميثيل سيلولوز، وجليكولات نشا الصوديوم، وسيليولوز بلوري مكروبي، ونشا ذرة، وسترات المغنيسيوم، وسيليكا غروانية لامائية.

**شكل فيرموكس ومحفوظات العبوة**  
أقراص بيضاء مستديرة: القرص الواحد يحتوي على 500 مجم من ميبيندازول (على القرص نفسه مكتوب: Me/500)  
يتوفر فيرموكس أقراص في عبوة تغليف بلستير تحتوي على قرص واحد.

قد لا تتوفر العبوات من جميع الأحجام والتركيزات بالسوق.

للتواصل معنا، يُرجى زيارة الرابط [www.janssen.com/contact-us](http://www.janssen.com/contact-us)

حامل تصريح التسويق:

جانسن-سيلاج اس بي ايه،  
فيالي فولفيو تيستي 6/280  
20126 ميلان مي  
إيطاليا

**الشركة المصنعة:**

لوزوميديكامينتا- سوسيدادي تيكنيكا فارماسيوتيكا، إس أ  
إسترادا كونسيليري بيدروسو 69-بي، كوبيليز دي بايكسو- 2730-055 باركارينا- البرتغال

تم آخر تتفيق لهذه النشرة في 13 يناير 2024.

### هذا المستحضر دواء

- الدواء هو منتج يؤثر في صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب العلاجية وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء. إن الطبيب والصيدلي خبران بالمستحضرات الدوائية وبنفعها وضررها.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
- لا تكرر الوصفة العلاجية ذاتها دون استشارة طبيبك.
- احفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيادلة العرب