

عضلي قلبي، سكتة دماغية).

- التجلط المنتشر داخل الأوعية (اضطرابات حادة في تجلط الدم).

- الفصود الحاد في وظيفة الكلى

- إن كنت تعاني أو عانيت سابقاً من اختلاجات،

- الحقن في البطين ودخل الغمد ودخل المخ إذا كان ثمة حاجة للحقن داخل الدماغ).

- في حال الشك، لا بدّ من طلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

التحذيرات الخاصة

- لا يجوز حقن الدواء عبر العضل.

- لا يجوز حقن الدواء في البطين أو داخل الغمد أو داخل المخ (إن كان ثمة حاجة للحقن داخل الدماغ)

- أعلم طبيبك:

- إذا كنت تعاني أو عانيت سابقاً من اختلاجات أو إذا كنت تأخذ دواء مضاداً للصرع،

- إن كان لديك آثار دم في البول،

- إن كنت تتناولين موانع حمل فمؤبّة أو تخضعين لعلاج بديل بالهورمونات لا تتقاطع النمط.

- أعلم طبيبك فوراً في حال ظهور العوارض التالية:

- ألم غير اعتيادي في الساقين، ضعف في الأطراف، ألم في الصدر،

- نبض مضطرب، ضيق نفس مفاجئ، فقدان وعي، اختلاط ذهني،

- صداع حاد غير اعتيادي، دوام، اضطرابات بصرية، بؤه في

- الخطأ أو فقدان القدرة على النطق.

- أبق دائماً الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

احتياطات الاستخدام

- تُعدّل الجرعة لدى المرضى الذين يعانون من اختلال مزمن في وظيفة الكلى.

- في حال الشك، لا تتردد في استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

- التفاعلات بين الأدوية وتفاعلات أخرى

- لتفادي التفاعلات المحتملة بين عدّة أدوية، يجدر بك تلقائياً

- إعلام الطبيب أو الصيدلي في حال كنت تتناول أي أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة

الحمل

- من المستحسن عدم استعمال هذا الدواء خلال الفصل الأول من فترة الحمل.

الرضاعة

- إذا اكتشفت أنك حامل خلال العلاج، استشير طبيبك في أسرع وقت ممكن،

- لأنّه وحده القادر على تكيف العلاج مع حالتك الصحية.

- لا يُمنع بالرضاع أثناء العلاج.

- بصورة عامة، يجب عليك دائماً استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل

- تناول أي دواء خلال فترة الحمل والرضاع.

حامض ترانينيكراميك

محلول للحقن (الوريدي)

- الرجاء أن تقرّأ بدقة هذه النشرة كاملة قبل تناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مجدداً.

- في حال كان لديك أسئلة أخرى أو شكوك ما، استشر طبيبك أو الصيدلي للمزيد من المعلومات.

- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً، لا تعطه لأيّ أحد آخر حتى ولو كانت عوارضه مثل عوارضك لأنه قد يسبّب له الأذى.

التعريف بالدواء

- التركيب

- حامض ترانينيكراميك..... 0.5 غ

- الألوسة: حامض كلوريديك مركز بكمية كافية للحصول على

- محووضة 7.0 - 7.5، ماء لإعداد محاليل للحقن بكمية كافية

- للحصول على 5 مل.

الشكل الصيدلي والتقديم

- محلول للحقن الوريدي.

- عبلة من 5 أمبولات من 5 مل

التصنيف الصيدلي للعلاجي

- مضاد لانحلال الليغين

حامل الرخصة/المورّع

- sanofi-aventis france

- 1-13, boulevard Romain Rolland

- 75014 Paris - France

المصنّع

- Sanofi Winthrop Industrie

- 6, boulevard de l'Europe - 21800 Quetigny - France

الحالات التي تستدعي استخدام هذا الدواء

- هذا الدواء هو عامل مضاد للتخثر يوصى به لمعالجة بعض أنواع النزف.

تنبيه!

- الحالات التي تمنع استخدام هذا الدواء

- لا يجوز استخدام هذا الدواء في الحالات التالية:

- • إذا كنت تعاني أو عانيت سابقاً من تجدد الدم الشرياني أو الوريدي (التهاب الوريد، انصمام رئوي، نبضة صدرية، احتشاء

سائقو السيارات ومشغّو الآلات

- يجب لفت انتباه سائقي السيارات ومشغّلي الآلات إلى مخاطر الإصابة بالدوار بعد تناول هذا الدواء.

كيفية استخدام هذا الدواء

الجرعات

- لدى البالغين، لا يجوز تحطّي 4 غ كل 24 ساعة.

- في الحالات كافة، يجب التقيد تقيداً صارماً بوصفة الطبيب.

طريقة و وسيلة تناول الدواء

- عن طريق الحقن في الوريد، بحقن بطيء و صارم.

وتيرة وأوقات استخدام الدواء

- يُقسّم إلى حقنتين أو 3 حقنات كل 24 ساعة.

مدة العلاج

- في الحالات كافة، يجب التقيد تقيداً صارماً بوصفة الطبيب.

الأثار الجانبية غير المرغوبة والمزعجة

- مثل كل مستحضر فاعل، قد يؤدي تناول هذا الدواء لدى بعض الأشخاص، إلى حدوث ردات فعل مزعجة بعض الشيء؛

- ردات الفعل هذه نادرة وقد تتضمن العوارض التالية:

- غثيان وتقيؤ.

- إسهال

- تورع مع هبوط في ضغط الدم، يمكن أن يرافقه فقدان وعي،

- اختلاجات،

- تفاعلات من النوع التحسسي (صدمة استهوائية، شرى أو خرب

- وعائي، طفح جلدي)،

- عوارض انصمام خثاري (تكوّن خثرات في الدم) يمكن أن

- تصيب أي قسم من الجسم.

- الرجاء أن تعلم طبيبك أو الصيدلي بأيّ ردة فعل غير مرغوبة

- ومزعجة غير مذكورة في هذه النشرة.

الحفظ

- لا تتخطّ تاريخ انتهاء الصلاحية المدوّن على العبلة الخارجية.

احتياطات خاصة للحفظ

- يُحفظ الدواء في مكان تقلّ حرارته عن 25 درجة مئوية.

تاريخ مراجعة النشرة

- حزيران 2005.