

روزيكال® ٣ د

والإستراموستين، وأملاح الحديد بالتزامن مع روزيكال® ٣ د.

الحمل والرضاعة

على النساء استشارة طبيهن في فترة الحمل والرضاعة قبل الإقدام على تناول أي عُقار يُباع من دون وصفة طبيّة.

طريقة الاستعمال

يتم تناول قرص واحد إلى قرصين مع كوب من الماء.

التأثيرات غير المرغوب فيها

يمكن أن يسبب تناول الكالسيوم عند بعضهم الإمساك، أو الإسهال، أو انتفاخ البطن، أو الغثيان.

إرشادات خاصة بطريقة الحفظ

يجب حفظ هذا المستحضر في مكان لا تتعدى الحرارة فيه ٣٠ درجة مئوية وبعيداً عن الرطوبة. يجب حفظ هذا المستحضر في العبوة الأصلية بحالة سليمة.

تاريخ مراجعة هذه النشرة: آب ٢٠١٥

التركيب

كربونات الكالسيوم..... ١٥٠٠ ملغ (مساو لـ ٦٠٠ ملغ من الكالسيوم)

كوليالكسيفيرول ١٠ ميكروغرام (مساو لـ ٤٠٠ وحدة دولية من الفيتامين ٣ د)

السواغات: نشاء الذرة، إيزومالت، كروس كارميلوز الصوديوم، سيليلوز دقيق التبلور، إستيرات المغنيزيوم، سكر الوز، بوفيدون ك ٣٠، نكهة البرتقال.

الشكل الصيدلاني والعبوة

تحتوي العبوة على ٦٠ قرصاً.

يوصف روزيكال® ٣ د في الحالات التالية

- وقاية البالغين والمسنين من الإصابة بنقص في الفيتامين د.
- علاج حالات إصابة البالغين والمسنين بنقص في الفيتامين د.
- دعم علاج ترقق العظام عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

يُمنع استعمال روزيكال® ٣ د في الحالات التالية

- في حالات فرط التحسس للفيتامين د أو لأي مكوّن.

الاحتياطات

- عند الخضوع لعلاج بفلوريد الصوديوم أو بالفوسفونات الثنائية بالتزامن مع هذا العقار، يُنصح بأن تكون المدة الفاصلة بين الجرعتين ساعتين. أما في حال الخضوع لعلاج بالمضادات الحيوية من مجموعة التتراسيكلين بالتزامن مع هذا العقار فيُنصح بأن تكون المدة الفاصلة بين الجرعتين ثلاث ساعات.
- يجب استشارة الطبيب المعالج في حال الإصابة بقصور كلوي قبل الإقدام على تناول أي عُقار يُباع من دون وصفة طبيّة.

تفاعلات روزيكال® ٣ د مع أدوية أخرى

يجب استشارة الطبيب المعالج عند الخضوع لعلاج بالديجيتال، والسيكلين، والفوسفونات الثنائية،