

نشرة العبوة : معلومات للمستخدم

مسحوق (بودرة) ARATRO 200 mg / 5 ml أراترو 200    ملليغرام / 5 مليلتر المعلق للتناول عن طريق الفم .

أزيثروميسين

- يرجى قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.
- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى
- إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات او المشورة ، فاستشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.
- تم وصف هذا الدواء لك ، لا توصفه للآخرين. فهو قد يضرهم ، حتى لو كان لديهم نفس أعراض مرضك.
- في حالة حدوث أي من الآثار الجانبية ، فيرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

الأطفال والمراهقون

بشكل عام ، مع الاستثناء الوحيد لعلاج التهاب البلعوم والبلعوم الثلاثي ، فإن الجرعة الموصى بها هي 10 ملليغرام / كجم في اليوم ، تؤخذ في جرعة واحدة لمدة 3 أيام متتالية. أو بطريقة أخرى ، يمكن توزيع نفس الجرعة الإجمالية على مدى 5 أيام ، بإعطاء 10 ملليغرام / كجم في اليوم الأول ، لتستمر مع 5 ملليغرام / كجم في اليوم للأيام الأربعة المتبقية. يعتمد نظام الجرعات على الوزن كما يلي:

أقل من 15 كجم ..... 10 ملليغرام / كجم في اليوم (تغطي جرعة واحدة) خلال 3 أيام متتالية: أو بطريقة أخرى ، 10 ملليغرام / كجم / يوم ، في اليوم الأول ، يستمر بجرعة 5 ملليغرام / كجم في اليوم لمدة 4 أيام متبقية ، بجرعة واحدة يومية.

15-25 كجم ..... 200 ملليغرام في اليوم (تغطي جرعة واحدة) خلال 3-4 أيام متتالية: بطريقة أخرى ، 200 ملليغرام / كجم في اليوم ، في اليوم الأول ، للاستمرار بجرعة 100-200ملليغرام / كجم / في اليوم للأيام الأربعة المتبقية ، تتناوله بجرعة واحدة يومية.

26-35 كجم ..... 300 ملليغرام / يوم (تغطي بجرعة واحدة) خلال 3 أيام متتالية: أو بطريقة أخرى ، 300 ملليغرام / كجم في اليوم في اليوم الأول ، للاستمرار بـ 150 ملليغرام / كجم / في اليوم للأيام الأربعة المتبقية ، تتناوله بجرعة واحدة يومية.

36-45 كجم ..... 400 ملليغرام / في اليوم (تغطي بجرعة واحدة) خلال 3 أيام متتالية: بطريقة أخرى ، 400 ملليغرام / كجم / يوم في اليوم الأول ، للاستمرار بجرعة 200 ملليغرام / كجم / في اليوم للأيام الأربعة المتبقية ، تتناوله بجرعة واحدة يومية.

أكثر من 45 كجم ..... نفس جرعة البالغين (500 ملليغرام / يوم في جرعة واحدة لمدة 3 أيام

لعلاج التهاب البلعوم العقدي يجب أن تعطى جرعة 20 ملليغرام / كجم / في اليوم لمدة 3 أيام متتالية دون تجاوز الجرعة اليومية القصوى البالغة 500 ملليغرام. إذا كنت تعتقد أن تأثير أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر قوي جدًا أو ضعيف جدًا ، استشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك .

إذا تناولت كمية من شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر أكثر مما يجب.

قم بإبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك على الفور

إذا أغفلت عن تناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية

إذا توقفت عن تناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر إذا توقفت عن تناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر، هناك خطورة على المريض من أن تسوّ الأعراض التي يعاني منها. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، اسأل طبيبك أو الصيدلي الخاص بك .

4- الآثار الجانبية المحتملة

مع جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر آثارًا جانبية على الرغم من عدم تعرض الجميع لها. كانت معظم التأثيرات التي لوحظت في التجارب السريرية ذات طبيعة خفيفة إلى معتدلة ، ويمكن أن تكون عكسية بعد التوقف عن تناول الدواء وتآثرت بشكل رئيسي في الجهاز الهضمي وتتألف بشكل رئيسي من الغثيان والقيء والإسهال وآلام في البطن. نادرا ما تحدث ردود فعل سلبية خطيرة مثل وذمة الحنجرة (سبب الحساسية) أو ضعف وظائف الكبد مصحوبة باصفرار الجلد. بالإضافة إلى ذلك ، أثناء العلاج بـشراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر، يمكن أن تظهر أي من الآثار الجانبية التالية ، الموصوفة أزيثروميسين عند تناوله عن طريق الفم.

- قلة الصفيحات (انخفاض عدد الصفائح الدموية) ونوبات عابرة من قلة العدلات الخفيفة (انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء)
- ردود فعل عدوانية ، عصبية ، هياج ، قلق. دوخة / دوار ، تشنجات ، صداع ، نعاس وفرط نشاط
- ضعف السمع والذوق المتغير بشكل استثنائي
- اضطرابات القلب
- اضطرابات الجهاز الهضمي مثل فقدان الشهية ، والغثيان ، والقيء / الإسهال (الوصول إلى سبب استثنائي للجفاف) ، و البراز الرخو ، وعدم الراحة في البطن (تقلصات المعدة) ، والإمساك ، والغازات ، وتآثر الإسهال الشديد ، وإفراز اللسان.
- قصور في وظائف الكبد (نادرا ما يكون شديداً) والكلبي
- ردود فعل جلدية مثل الحكة ، الطفح الجلدي ، التحسس للضوء ، تراكم السوائل أو الشرى (طفح جلدي). حدثت تفاعلات جلدية شديدة بشكل استثنائي.
- ألم المفصل.
- العدوى الفطرية المهبلية (التهاب المهبل).
- التهابات الفطرية ، التعب ، الإحساس بالوخز وردود الفعل التحسسية.

إذا كنت تعتقد أن أيًا من الأعراض الجانبية التي تعاني منها خطيرة أو إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة ، فيرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

5- كيفية تخزين أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 30 درجة مئوية.

إستخدام شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر في خلال عشرة أيام من تاريخ تحضيره .

يحفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول ورؤية الأطفال.

لا تستخدم أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الملصق والعبوة بعد إنتهاء الصلاحية . يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا تتناول أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر إذا لاحظت علامات تدهور واضحة.

لا يجب التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. استفسر من الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

6- محتويات العبوة ومعلومات إضافية

ما هي محتويات شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر؟

العادة الفعالة هي أزيثروميسين (ثنائي هيدرات). تحتوي كل 5 مليلتر من الشراب المعاد تكوينه على 200 ملليغرام أزيثروميسين. المكونات الأخرى هي السكروز ، هيدروكسي ربوبيل سلولوز ، فوسفات ثلاثي الصوديوم الالماني ، صمغ الزنثان ، الكرز ، نكهات الموز والفانيليا.

ما هو شكل شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر وما هي محتويات العبوة؟

شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر هو مسحوق بودرة يؤخذ عن طريق الفم معياً في زجاجة . تحتوي كل عبوة على زجاجة واحدة بسعة 15 مليلتر أو 30 مليلتر.

مالك حق ترخيص التسويق والشركة المصنعة

مليغرامواعة آرا فارما ، شركة محدودة ج / فرار غابرييل دي سان أنطونيو ، 6/10 بول. إنديانا دي هيناريس 19180 مارشامالو (غوادالاخارا) ، إسبانيا!

محتويات هذه النشرة:

1. ما هو شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر في زجاجة وما هي دواعي استعماله.
2. ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر المعلق الذي يؤخذ عن طريق الفم والمعبأ في زجاجة .
3. كيف يتم تناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر في زجاجة.
4. الآثار الجانبية المحتملة.
5. كيفية تخزين شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر في زجاجة .
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى .

1- ما هو شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر المعبأ في زجاجة وما هي دواعي استعماله؟

أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر هو مسحوق من البودرة معياً في زجاجة يؤخذ عن طريق الفم . تحتوي كل عبوة على زجاجة واحدة بسعة 15 مليلتر أو 30 مليلتر.

ينتمي أزيثروميسين إلى **مليغرامواعة من المضادات الحيوية التي تسمى الماكروليدات**. يتم استخدامه **لعلاج الالتهابات التالية**:

- التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي مثل التهاب الأذن الوسطى والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب البلعوم واللوزتين والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.
- التهابات الجلد والأنسجة الرخوة.
- الأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس.

2- قبل تناول جرعة شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر المعبأ في زجاجة لا تستخدم أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر

- إذا كان لديك حساسية (شديدة الحساسية) أزيثروميسين أو أي من مكونات أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر الأخرى.

توخ الحذر عند تناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من قصور كبدي حاد . في هذه هي الحالة ، قم بإبلاغ طبيبك.
- إذا أصبت بإسهال حاد ومستمر أثناء العلاج أو بعده ، أخبر طبيبك الخاص.
- من الممكن أن يكون هناك عدوى فطرية ، كما هو الحال مع المضادات الحيوية الأخرى أثناء العلاج بهذا الدواء. إذا كنت هذه هي الحالة ، أبلغ طبيبك.
- إذا حدث أثناء العلاج بأراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر أي تفاعلات تحسسية مصحوبة بأعراض مثل الحكة والاحمرار والطفح الجلدي أو توروم أو صعوبات في التنفس ، يجب إبلاغ طبيبك على الفور.

تناول أدوية أخرى

يرجى إخبار طبيبك الخاص أو الصيدلي إذا كنت تتناول / تستخدم أو تناولت / استخدمت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى ، بما في ذلك الأدوية التي حصلت عليها بدون وصفة طبية. قد يتفاعل أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر مع أدوية أخرى. يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول آيًا من الأدوية التالية:

- مشتقات الإرقوت (مثل الإرقوتامين ، وتستخدم لعلاج الصداع النصفي)
- سيكلوسبورين (دواء يؤخذ في علاج مرضى زراعة الأعضاء )
- الديجوكسين (يؤخذ في علاج عدم انتظام ضربات القلب).
- مضادات الحموضة ، سييميتيدين (الأدوية المستخدمة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي).
- إذا كنت تأخذ أراترو ٢٠٠ ملليغرام ٥ مليلتر وأدوية مضادات الحموضة ، تجنب تناول المتزامن لكلا الدوائين في نفس الساعة من اليوم.
- نلفينايفير ، زيدوفودين (الأدوية المستخدمة في علاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية)
- مضادات التخثر الديكومايرين (الأدوية المستخدمة في علاج منع تكوين الجلطة الدموية)
- تيرفينادين (دواء يؤخذ في علاج الحساسية وحصى الكلى)
- ريفامبين (دواء يؤخذ في علاج السل الرئوي والالتهاب غير الرئوي التي تسببها المتفطرات)

الحمل والرضاعة

يرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، تعتقدن أنك حامل أو تخططين لإنتاج طفل ، استشري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

لا يوصى باستخدام أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر أثناء الحمل والرضاعة ، إلا إذا كان القرار الطبي يفوق المخاطر التي يتعرض لها الطفل.

الاستخدام في الأطفال

لا ينبغي إعطاء أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر للأطفال دون سن 6 أشهر.

القيادة واستعمال الآلات

لا توجد أدلة على أن عثار أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر له تأثير على القدرة على القيادة أو تشغيل الآلات.

معلومات مهمة عن بعض مكونات أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر

تحتوي كل 5 مليلتر من الشراب المحضر من هذا الدواء على 3.62 غرام من السكروز. إذا كان قد تم إبلاغك من قبل طبيبك أنه لديك حساسية تجاه بعض السكريات ، فيجب استشارة طبيبك قبل تناول هذا المنتج الطبي.

3- كيف تتناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر في زجاجة .

احرص دائماً على تناول هذا الدواء تماماً كما أبلغك طبيبك. استشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا.

احرص على تناول دوائك بانتظام . سيبلغك طبيبك بمدة علاج أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر. سيتم تحديد الجرعة من قبل الطبيب وفقاً لاحتياجاتك الفردية ونوع الإصابة. لتحقيق النتائج الفضلى، اتبع تعليمات طبيبك بأمانة فيما يتعلق بالجرعة ومدة العلاج.

يأخذ أراترو 200 ملليغرام 5 مليلتر عن طريق الفم . من أجل تسهيل تناوله ، يوجد مع زجاجة الدواء حقنة للجرعات. قد يتجاوز الشراب مستوى الإشارة المحدد على الزجاجة . حيث أنه من الطبيعي حدوث ذلك بسبب كثافة الشراب.

تحضير المستحضر

- اقلب الزجاجة ورجها برفق حتى يتحرك المحلول بحرية.

- افتح الزجاجة وأضف الكمية التالية من الماء حسب حجم الزجاجة ، باستخدام الحقنة المرفقة: زجاجة 15 مليلتر: أضف 10 مليلتر من الماء زجاجة30 مليلتر: أضف 15 مليلتر من الماء.

- ضع الغطاء البلاستيكي المثقوب واضغط عليه حتى يتم إدخالها في قم الزجاجة .

- أغلق الزجاجة بإغلاق المعدني.

- تُرج الزجاجة بقوة حتى يصبح الشراب متجانسا

- لا تنس رج الشراب قبل كل إستخدام .

طريقة التحضير

- افتح الغطاء المعدني. أدخل الحقنة في الغطاء البلاستيكي المثقوب.
- اقلب الزجاجة رأساً على عقب ، بحيث تظل في وضع عمودي مع تثبيت الحقنة في مكانها.
- إملاً الحقنة بالقدر المناسب بالجرعة التي وصفها طبيبك.
- اقلب الزجاجة مرة أخرى ، أخرج الحقنة وانتقل إلى تناول الدواء .
- اغسل الحقنة بعد كل تناول الدواء.

كقاعدة عامة ، يجب أن تكون جرعة الدواء وإعادة إستخدامه كالتالي :

إلخبار ( بما في ذلك المرضي المستنبر)

من أجل ضبط الجرعة بسهولة أكبر ، من الأفضل استخدام الجرعات بالطريقة الموصى بها وهي 500 ملليغرام في اليوم في جرعة واحدة ، لمدة 3 أيام متتالية ، وبالتالي ، فإن المليغرامواعة هي 1500 ملليغرام. وبطريقة أخرى ، يمكن توزيع نفس الجرعة الإجمالية على مدى 5 أيام في جرعة واحدة من 500 ملليغرام في اليوم الأول ، و ثم 250 ملليغرام مرة واحدة يومًا من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس. ومن أجل علاج الأمراض الجنسية ، تكون الجرعة 1000 ملليغرام تؤخذ جرعة قموية واحدة.