

معلومات المستهلك

نازونكس

موبيتازون فوروات أحادي الهيدرات

بخار مائي لافت

هذه النشرة هي الجزء الثالث لـ"دليل المنتج" من أصل ثلاثة أجزاء تم نشرها عندما تمت الموقفة على طرح عقار نازونكس في السوق في كندا وهي مصممة على وجه الخصوص للمستهلكين.

نرجو قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام عقار نازونكس، وإذا كانت لديك أية أسئلة حول الدواء، فيرجى الاتصال بطبيبك أو الصيدلي.

حول هذا الدواء

يمكنك استخدام هذا الدواء؟

نازونكس هو أحد الكورتيكosteroidات التي تقلل من حدة الالتهاب.

لقد تم وصفه لك من قبل طبيبك لعلاج أعراض واحدة من الحالات التالية:

في البالغين، والمرأة، والأطفال من تقرير أعراضه بين 3 و 11 عاماً:

التهاب الأنف التحسسي الموسعي: "يسى أيضاً" (يزجي) ويندم عن الحساسية تجاه العشب، وغبار القماش، وعشبة الرجد، وغيرها. تشمل الأعراض انسداد أو احتقان الأنف، وسيلان الأنف، وحكمة، وعطسنا.

التهاب الأنف التحسسي المستمر: حساسية طوال العام تسببها عث الغبار وبرب الحيوانات والفنون. تشمل الأعراض انسداد أو احتقان الأنف، وسيلان الأنف وحكمة، وعطسنا.

في البالغين والأطفال من تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر:

مضايقات الأنفية للضدات الحوية في التهاب الأنف التحسسي: حيث تزوج علامات وأعراض العدو المكتبة: التهاب الجيوب الأنفية الداخل هو التهاب الجيوب الأنفية قد تصاحبه

بعض علامات الإصابة مثل عذار نازونكس لعلاج الالتهاب، ويُستخدم المضاد الجوي لعلاج عذار نازونكس لأنفه، بينما يُستخدم الأدواء مثل العلاج العادي لعلاج عذار نازونكس.

يشعر ما ينحدر خلف الأنف، حتى، مما تندى بالوجه أو الأسنان (لا سيما على أحد جانبي الوجه)، توسم الوجه، أو خروج إفرازات أنفية سميكة صفراء أو حضرة اللون.

يُستخدم عذار نازونكس في علاج الأعراض المترتبة بالتهاب الجيوب المزوجة خلف الأنف انسدادها.

تشمل الأعراض انسداد الأنف، سيلان الأنف، شعور شبيه ما ينحدر خلف الأنف، وضيق الأنف أو الماء في الوجه، إذا تفاقمت الأعراض أو بدأ في الشعور بحمى، أو الم شديد ومستمر

في البالغين من تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر:

بالقول، والأنف، ورذاذ صفراء على بطانة الأنف تؤثر عادة على فتحي الأنف، العرض الأساسي هو شعور بالانسداد في الأنف قد يؤثر على التنفس من خلال الأنف، قد تشمل الأعراض الشفاف، وفقدان حاسة الشفاف، والشم.

ما هو تأثير الدواء؟

عند رئته في الأنف يساعد على الدخ من أعراض الحالات المزمرة أعلاه.

من يرجى عدم استخدام الدواء؟

لا يجب أن يستخدم عذار نازونكس في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه عذار نازونكس أو أي من مكوناته.

• إذا كنت تعاني من عدو في الأنف (أي، خروج إفرازات صفراء أو خضراء من الأنف) ولا تختفي لعلاج لها.

• إذا كنت تعتمد مؤخراً على ملقطة حزامية في الأنف أو تفضض لإصابة في الأنف، في هذه الحالة قد يتم اختيارك بالانتظار حتى تتعافي قبل استخدام عذار نازونكس.

• إذا كنت تعاني من عدو طفري أو يكتير أو غيره (أي، ملقطة حزامية لا تختفي لعلاج لها).

• إذا كنت تعاني من عدو طفري أو يكتير أو غيره (أي، ملقطة حزامية لا تختفي لعلاج لها).

* انظر معلومات واحتياطات المزمرة من المعلومات.

ما هي المكونات الفوكالية؟

يحتوي عذار نازونكس على موميتازون فوروات أحادي الهيدرات.

(التأثيرات الجانبية): كاربوريك ميثيل سليلوز الصوديوم، حمض الصوديوم، جليسيرول، سليلوز دقيق الثلور، بوليسيورات، 80، ماء مُنقى وسترات الصوديوم ثانوي الهيدرات.

ما هي الآثار الجانبية للدواء؟

يتوصل كل بحة رثأة عديم الرائحة، يحتوي على ما يعادل 50 ميكروغراماً من موميتازون فورات.

* تم القيام على أساس الأمامي.

تحذيرات واحتياطات

لا تقم برش رذاذ نازونكس في عينيك أو فمك، فهو معد لاستخدامه في الأنف فقط.

قبل استخدام عذار نازونكس تحدثني إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت حاماً أو تمارسين الرياضة. لا يوصى بالرضاخة الطبيعية أثناء استخدام عذار نازونكس.

أخير طبيبك، إذا كان لديك أي من الحالات التالية قبل أن تبدأ في استخدام عذار نازونكس أو أبيبتي بها أثناء العلاج، قد ينحدر طبيبك إلى خفض جرعتك من هذا الدواء، أو قد تحتاج إلى علاج إضافي.

لعلاج حالتك، يرجح دخان الطبيب، وسيغير ما إذا كان الأمر يتطلب أي تغييرات في علاجك أم لا. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري وقف العلاج.

• فرج الأنف

• الملح (النطاف أو السائل)

• عدو (طفرية أو يكتير أو غيره)

• عدو (فرومون الهيرس البيضي بالعين)

(انظر معلومات واحتياطات المزمرة عن هذا الدواء)

إذا كنت تعتقد أنك أصبت بعدي في الأنف بعد بدء العلاج بعذار نازونكس (أي، تزوجت الإفرازات الأنفية إلى إفرازات صفراء أو خضراء اللون) فاتصل طبيبك.

إذا تم وصف عذار نازونكس لك (أي، الم شديد ومستمر بالوجه/الأسنان (لا سيما على أحد جانبي الوجه)، توسم الوجه، تفاقم الأعراض بعد التحسن الأولي) أو إفرازات أنفية صفراء أو خضراء اللون.

استخدم عذار نازونكس كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي الخاص بك، لا تستخدملكية من عذار نازونكس أكثر من عذار نازونكس آخر (أي، ملقطة حزامية في ممارسة لزيادة الفحالة)، ولا تستخدم عذار نازونكس خلف الأنف، حيث لا ينحدر هذا الدواء بغيره، حتى إذا كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تماهى أنت منها. لا تستخدم هذا المتنج لعلاج اضطرابات أخرى.

التحذيرات الذاتية مع هذا الدواء

التجفيف المائية حدوث تداخلات موائية، تذكر من إلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك أي نوعية أخرى تتناولها، لا سيما نوعية الكورتيكosteroides، وعوارضها أو عوارض اللون) فاتصل طبيبك.

عن طريق الفم، قد تزوج جرعة بعض الأدوية إلى تدخل آثاره لتقويق العلاج بعذار نازونكس.

ترد آثاره التي قد تتناقض مع عذار نازونكس. قد يرغب طبيبك في مرافقتك عن كتابة أي كتاب إذا كنت تتناول هذه الأدوية:

• كيركتونول،

• إنزاكروزول،

• كلاريدرو ماميسين،

• رينفين،

• المحتويات التي تحتوي على كوربيسيتات.

الاستعمال الصحيح لهذا الدواء

لا تتجه في العينين، واستخدام داخل الأنف فقط

الجرعة العادلة

في حالة الإصابة باحتقان أنفي شديد، فقد يوصي طبيبك بأخذ مذيل عذار نازونكس في المساعدة في تنظيف المرات الأنفية والمساعدة على توصيل العطر.

عذار نازونكس

بالنسبة للأطفال من تقرير أعراضه بين 3 و 11 عاماً، الجرعة المعتادة الموصى بها هي بحة واحدة في كل بحة أنت مررتين في اليوم.

إذا دعت الحاجة لعلاج أضطراري للأعراض، فقد يوصي طبيبك بزيادة الجرعة إلى أربع (4) بحث بكل فحة أنت مررتين يومياً.

قد يرغب طبيبك هذه المعرفة، وفقاً لاحتياطاته (انظر قسم: "تحذيرات واحتياطات").

عذار نازونكس

بالنسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، تكون الجرعة المعتادة الموصى بها هي بحة واحدة يومياً.

بالنسبة للأطفال (ما في ذلك كبار السن) والاطفال يعمر 12 عاماً فأكثر، الجرعة المعتادة الموصى بها هي بحث (2) بكل فحة أنت مررتين في اليوم.

عذار نازونكس

عذار نازونكس