

Aérosol doseur assurant 100 mcg de Salbutamol BP pour chaque inhalation avec un spécial poussoir de commande.

DESCRIPTION

3 - Propriétés 4 - indications

Salbutamol BP est un bêta-adrénergique stimulant qui a une action sélective très grande sur les récepteurs du muscle bronchique et au dosage thérapeutique, une action très faible ou nulle sur les récepteurs cardiaques. Salbutamol est également très actif dans la prévention de la libération de l'histamine antigène-induite et de la substance à réaction lente de la anaphylaxie SRS-A de la part des mastocytes dans le poumon humain sensibilisé par l'anticorps IgE. De telles réactions d'hypersensibilité du type I sont généralement considérées comme les premiers signes du syndrome de l'asthme allergique.

BUTOVENT® est donc indiqué dans le traitement et la prophylaxie de l'asthme bronchique et aussi dans le traitement d'autres conditions comme la bronchite et l'emphysème auxquelles est associée une obstruction réversible des voies respiratoires.

BUTOVENT® ayant une action prolongée, il est particulièrement indiqué dans la thérapie de maintien de l'asthme chronique et de la bronchite chronique. L'administration par aérosol qui utilise le salbutamol en dosage de microgrammes évite le tremblement musculaire parfois associé à la thérapie orale.

BUTOVENT® agit rapidement et peut être employé, si nécessaire, pour soulager les attaques de dyspnée aiguë. Les doses peuvent être prises dans un but prophylactique avant de faire un effort ou pour prévenir l'asthme provoqué par l'exercice. Grâce à son action sélective sur les bronches et à l'absence d'effets secondaires sur le système cardiovasculaire, BUTOVENT® est indiqué dans le traitement du broncho-spasme chez les cardiaques et les hypertendus, y compris ceux qui prennent des médicaments bêta-bloquants qui affaiblissent souvent la fonction respiratoire.

POSOLOGIE

Adultes: pour le soulagement du bronchospasme aigu et pour calmer les accès d'asthme, une ou deux inhalations peuvent être administrées comme dose unique. La dose recommandée pour une thérapie continue ou pour une thérapie prophylactique est de deux inhalations trois à quatre fois par jour. Pour prévenir le bronchospasme provoqué par l'effort, on doit administrer 2 inhalations avant de faire l'effort.

Enfants: la dose recommandée est une inhalation pour soulager le bronchospasme aigu, pour une sédation de l'asthme épisodique ou avant d'effectuer un effort.

Une inhalation devra être effectuée 3 ou 4 fois par jour pour l'entretien de routine ou pour une thérapie prophylactique. Si nécessaire, ces dosages peuvent être augmentés à 2 inhalations. Pour obtenir les meilleurs résultats, chez la plupart des patients, BUTOVENT® doit être employé avec régularité. L'effet bronchodilatateur de chaque administration de BUTOVENT® Aérosol dure au moins 4 heures sauf chez les patients pour lesquels l'asthme est grave. Les malades ne devront pas augmenter le nombre d'inhalations, mais devront au contraire consulter leur médecin au cas où un traitement avec un glucocorticoïde se rendrait nécessaire.

PRECAUTIONS

Si la dose de BUTOVENT® administrée ne donne pas de résultats pendant une durée de au moins 3 heures, le patient devrait consulter le médecin afin de prendre avec lui de nouvelles dispositions. BUTOVENT® devra être administré avec précaution aux malades souffrant de thyrotoxicose. Une administration du médicament qui ne soit pas nécessaire est déconseillée au cours du premier trimestre de la période de grossesse.

EFFETS SECONDAIRES

Il n'a été enregistré aucun effet secondaire au cours de la thérapie avec BUTOVENT®.


SURDOSAGE

En cas de surdosage de BUTOVENT®, l'antidote est un agent bêta-bloquant cardio-sélectif, mais celui-ci doit être utilisé avec précaution chez les sujets ayant une histoire de bronchospasme.

CONSERVATION

BUTOVENT® doit être conservé dans un lieu frais et à l'abri du gel et de la lumière. Le récipient en métal ne doit être ni cassé, ni percé, ni brûlé, même s'il est apparemment vide.

MODE D'EMPLOI



- 1) Enlever la fermeture de protection.
- 2) Tenir l'appareil entre le pouce et l'index avec l'embout dans la partie inférieure comme montré dans la figure.
- 3) Bien agiter sans appuyer.
- 4) Introduire l'embout dans la bouche et expirer complètement.
- 5) Inspirer profondément avec la bouche; en même temps appuyer avec l'index une seule fois. Quand l'inspiration est terminée tenir le souffle tant que possible.

Après les inhalations fermer de nouveau l'embout avec la fermeture de protection. L'embout doit être toujours propre.

Nettoyer avec de l'eau tiède après avoir extrait la cartouche.

PRESENTATION

Aérosol doseur. Chaque aérosol fournit 200 inhalations.



CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.
Via Palermo, 26/A - PARMA - ITALIE