

FLUIBRON®

Le composant actif du FLUIBRON® est le trans-4[(2-amino-3,5-dibromobenzil)-amino]cyclohexanol chlorydrate ou ambroxol, substance qui a été identifiée comme le 8ème métabolite de la bromexine dont l'action régulatrice intense sur les muqueuses a déjà été amplement démontrée.

Grâce à ses propriétés sécrét-o-motrices et sécrét-o-lytiques, FLUIBRON® favorise l'expulsion du mucus visqueux qui stagne dans les voies respiratoires rendant ainsi plus facile l'expectoration et améliorant par conséquent la dynamique respiratoire. Le traitement avec FLUIBRON® régularise quantitativement et qualitativement la sécrétion muqueuse bronchique, diminue les stimulations toxiques et permet ainsi le rétablissement de la fonction protectrice naturelle de la pellicule de mucus qui revêt la surface de la muqueuse bronchique.

FLUIBRON® présente un degré élevé de tolérabilité et il est donc particulièrement indiqué même en cas de traitements prolongés.

INDICATIONS

Affections aigües et chroniques de l'appareil respiratoire avec production anormale ou altérée de mucus, en particulier dans le cas de bronchites aigües et chroniques, bronchites asthmatiques, bronchiectasies. Affections catarrhées du rhino-pharynx, larynx et trachée. Sinusite, otite, catarrhe tubaire.

L'usage des ampoules est indiqué aussi dans le traitement pré et post-opératoire surtout en chirurgie gériatrique et pour la prophylaxie des complications respiratoires au cours d'une thérapie intensive.

POSOLOGIE

Comprimés:

Adultes: au début 1 comprimé 3 fois par jour, dans la thérapie d'entretien 1 comprimé 2 fois par jour. Il est conseillé de prendre les comprimés après les repas avec un peu de liquide.

Sirop:

Adultes: au début 10 ml 3 fois par jour, successivement 5 ml 3 fois par jour.

Enfants: jusqu'à 2 ans: 2,5 ml 2 fois par jour; de 2 à 5 ans: 2,5 ml 3 fois par jour; après 15 ans: 5 ml 3 fois par jour.

Au début du traitement la dose peut être augmentée ou aussi redoublée selon le conseil du médecin. 10 ml = 30 mg. La mesure qui se trouve incluse porte des crans gradués à 10 ml, 5 ml et 2,5 ml.

Solution à 0,75%:

Par inhalation.

Adultes et enfants âgés de plus de 5 ans: 2-3 ml, 1-2 fois par jour.

Enfants de moins de 5 ans: 2 ml, 1-2 fois par jour.

La solution peut être administrée avec des appareils pour aérosol-thérapie habituels.

Elle peut être aussi diluée dans de l'eau distillée dans le rapport de 1:1.

Par voie orale.

Adultes: 2-4 ml (15-30 mg) 3 fois par jour.

Enfants âgés de plus de 5 ans: 1-2 ml (7,5-15 mg) 2-3 fois par jour.

Nourrisson et première enfance: 1/2-1 ml (3,75-7,5 mg) 2-3 fois par jour.

1 ml = 7,5 mg

Diluer les gouttes dans un peu d'eau, thé, lait ou jus de fruit.

Ampoules

1-2 ampoules, 2-3 fois par jour selon la gravité de la maladie par voie intramusculaire ou intraveineuse. L'administration peut être effectuée aussi par injection veineuse lente, en solution physiologique ou glucosée. Par contre, il faut éviter de mélanger le FLUIBRON® à des solutions alcalines.

Pour des traitements intensifs, l'administration de FLUIBRON® par voie parentérale et par inhalation en même temps est particulièrement indiquée.

CONTRE-INDICATIONS

FLUIBRON® ne doit pas être administré aux patients qui ont manifesté une hypersensibilité au produit et à ceux qui présentent des graves alterations hépatiques ou rénales.

MISE EN GARDE

Les études de tératogénèse et sur la toxicité fœtale sur les animaux n'ont mis en évidence aucun effet nocif du FLUIBRON® même à des doses élevées. Comme pour tous les produits récents, il est déconseillé de l'employer durant les trois premiers mois de grossesse, dans les derniers mois il devra être administré seulement en cas de nécessité sous contrôle médical.

Comme dans l'inspiration trop profonde des aérosols il peut se produire une toux provoquée par une irritation, il faut chercher durant l'inhalation à inspirer et expirer normalement.

Chez les patients particulièrement sensibles on peut conseiller de réchauffer préalablement le produit à la température corporelle. Chez les patients atteints d'asthme bronchique il vaut mieux recourir à un spasmolytique avant l'inhalation.

PRÉCAUTIONS

FLUIBRON® doit être administré avec précaution chez les patients qui présentent un ulcère peptique.

Ne le laisser pas à la portée de main des enfants.

PRÉSENTATION

Boîte de 30 comprimés de 30 mg.

Flacon de 200 ml de sirop au 0,3%.

La date d'échéance indiquée se réfère au produit confectionné dans son intégrité et correctement conservé.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Jusqu'à présent, aucune interaction médicamenteuse n'a été décelée.



CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

Via Palermo, 26/A - PARMA - ITALIE

81142.01/01