

اقرأ هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء باستخدام هذا الدواء لاحتوانها على معلومات مهمة لك.

- حافظ على هذه النشرة قد تحتاج لقرائتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسللة أخرى، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك لاتنسفه لآخر قد يضر به، حتى لو كانت اعراضهم مشابهة لاعراضك.
- إذا حدث لك أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا يتضمن أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة.

ما تحتوي عليه هذه النشرة

- 1- ما هي تحاميل بنتاسا ولم تستخدم

- 2- ماذا يجب أن تعرف قبل أن تأخذ تحاميل بنتاسا

- 3- كيف تستخدم تحاميل بنتاسا

- 4- الآثار الجانبية المحتملة

- 5- كيفية تخزين تحاميل بنتاسا

- 6- محتويات الطبلة ومعلومات أخرى

- 1- ما هي تحاميل بنتاسا هي عامل علاجي معوي.

تستخدم تحاميل بنتاسا في: علاج التهاب القولون التقرحي (التهاب الأمعاء الغليظة مع تقرحات) الذي يقتصر على المستقيم.

- 2- ماذا يجب أن تعرف قبل أن تأخذ تحاميل بنتاسا

- إذا كنت تعاني من حساسية لميسالازين، حامض الساليسيليك أو مشتقاته (مثل حمض أسيتيل

- الساليسيليك)، أو أي المكونات الأخرى لهذا الدواء؛

- إذا كان لديك صور شديدة في وظائف الكبد أو الكلى.

التحذيرات والاحتياطات

تحذر إلى طبيبك أو الصيدلي قبلأخذ تحاميل بنتاسا

ينبغي تولي اهتمام خاصة مع هذا الدواء

- إذا كنت تعاني من حساسية للمسالازين (يوجد خطير الإصابة بحساسية الساليسيلات)

- إذا كان لديك حالياً أو سبق لك أن أصبت بمرض في الكبد / أو في الكلى

- إذا كان لديك حالة طبية يمكن أن تجعلك عرضة للتزيف

- إذا كان لديك قرحة تستقر في المعدة أو الإثنى عشر).

- إذا كنت تعالج بدواء قد يؤثر على وظائف الكلى على سبيل المثال الأدوية المضادة للالتهابات غير

- الستيروبية مثل حمض الأسيتيل الساليسيليك

- إذا كان لديك امرأة بالرثة، خاصة الربو

- إذا أصبحت فجأة يتشنجات في البطن، الام في البطن، الحمى، الصداع الشديد أو الطفح الجلدي. في

- مثل هذه الطفوف يجب أن توقف فوراً عن تناول بنتاسا

- قد تشكل حصى الكلى باستخدام المسالازين. قد تشمل الأعراض المائية في جنبي البطن وظهور الدم

- في البول. احرص على شرب كمية كافية من السوائل أثناء العلاج بمسالازين.

- اثناء علاجك بهذه الدواء سوف يرتدي لك طبيبك علامة فحوصات الدم لفحص وظائف الكلى وخاصة في

بداية العلاج

الأدوية الأخرى وتحاميل بنتاسا

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تستخدم، أو استخدمت مؤخراً أو قد استخدمت أي أدوية أخرى بما في ذلك

أي أدوية تحصل عليها بدون وصفة طبية. هذا أمر مهم خاصة إذا كنت تأخذ أي من الأدوية التالية:

- أزشيبورين (يستخدم بعد عمليات زراعة الأعضاء أو لعلاج أمراض المناعة الذاتية)

- 6- مركب ايتوبوريون أو ثيوغوانين (علاج كيميائي، يستخدم لعلاج سرطان الدم)

في الأدوية التي تمنع تجلط الدم (أدوية لمنع الجلطات ولزيادة سيلولة تمنع الدم)

تحاميل بنتاسا تحت إشراف طبيبي دقق.

الحمل، والرضاعة الطبيعية والخصوصية

إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، أو تعتقدين أنك قد تكوني حاملاً أو تخطبين لإنجاب

طفل، اسأل طبيبك أو الصيدلي الحصول على المشورة قبلأخذ هذا الدواء.

هناك تجربة محددة مع استخدام مسالازين أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

الحمل

لا ينبغي استخدام تحاميل بنتاسا أثناء الحمل، إلا إذا كانت الفوائد المحتملة للعلاج تفوق المخاطر المحتملة

في رأي الطبيب.

الرضاعة الطبيعية

تم الإبلاغ عن اضطرابات الدم لدى المواليد الجدد لأمهات تتم معالجتهن بهذا الدواء. وقد يصاب المولود

الجديد بحساسية بعد رضاعته من الثدي، على سبيل المثال الإسهال. يجب على طبيبك ان يقرر إذا لزم

إيقاف الرضاعة الطبيعية أو العلاج بتحاميل بنتاسا. عند القيام بذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار استفادة

المرضي

القيادة واستخدام الألات

لا يعرف ما إذا كان تحاميل بنتاسا يؤثر على القدرة على القيادة واستخدام الألات.

- 3- كيف تستخدم تحاميل بنتاسا

خذ دائمًا تحاميل بنتاسا تماماً كما قد قال لك طبيبك. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

الجرعة الموصى بها:

البالغين: إدخال تحميلاً واحداً يومياً في الشرج.

الأطفال: هناك عدد أقل قطع من البيانات والخبرات المتوفرة بشأن استخدامها لدى الأطفال.

طريقة التناول: استخدام شرجي.

يمكنك توطيد التحميلة بماء الوجه أو إدخال الشرج في الشرج أسهل.

هذه التناول: عموماً، يستمر علاج التهاب المعدة لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

تترك المكانية تهدىء أخذ العلاج لتقدير الطبيب المعالج. ذلك يعتمد على سير المرض. إن تحاميل بنتاسا

المناسبة لاستخدام على المدى الطويل.

من المستحسن تفريح الأمعاء قبل استخدام تحاميل بنتاسا.

إذا كنت تشعر بان تأثير تحاميل بنتاسا قوي جداً أو ضيق جداً، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

إذا كنت تأخذ جرعة زائدة، اتصل بطبيبك أو أقرب قسم للطوارئ على الفور.

إذا كنت قد نسيت أن تأخذ تحاميل بنتاسا

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا كان لديك أي أسللة أخرى حول استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

4- الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية يمكن أن يتسبب هذا الدواء في آثار جانبية، على الرغم من أنها لا تحدث مع الجميع.

كانت هناك تقارير قليلة جداً عن رد فعل تحسسي شديد (بما في ذلك تآكل شديد في الجلد الذي قد يؤثر على

دور الجلد ك حاجز قوي للجسم). قد يؤدي رد الفعل التحسسي إلى تورم في الوجه والرقبة و / أو صعوبة

في التنفس أو البلع (وذمة كوبنكا = ذمة وعانية عصبية). إذا حدث ذلك اتصل بطبيبك أو أقرب قسم

إصابات على الفور.

الآثار الجانبية المحتملة

الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً في التجارب السريرية هي الإسهال، والغثيان، والام في البطن، والمصداع،

والقيء، والطفح الجلدي.

في بعض الأحيان، قد تحدث تفاعلات فرط الحساسية وحمى الدواء. قد تحدث ردود فعل موضعية مثل

الحكمة، اضطرابات في منطقة المستقيم والرغبة في تفريغ الأمعاء.

الشاشة (تؤثر على 1 من كل 10 أشخاص على الأكثر)

- صداع

- الدوخة

- الإسهال

- الام في البطن

- الغثيان

- القيء

- الطفح الجلدي

- انفاسات البطن

النادر (قد تؤثر على 1 من كل 1000 أشخاص على الأكثر)

- التهاب في عضلة القلب أو غشاء القلب والذي يمكن أن يسبب ضيق في التنفس وألم في الصدر أو

خفقان (تضربات القلب السريعة أو غير المتناسبة)

- التهاب الأمعاء (تضخم الأمعاء الأذية) على طبيبك أن يقرر إذا لزم

- زيادة حساسية بشرتك لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية (حساسية للضوء)

- اضطرابات في المعدة الشديدة والتلف الحاد الذي قد يؤثر على هضم الكربوهيدرات

- اضطرابات في المعدة الشديدة والتلف الحاد الذي قد يؤثر على هضم الكربوهيدرات

- اضطرابات في المعدة الشديدة والتلف الحاد الذي قد يؤثر على هضم الكربوهيدرات

- تغير في لون البراز

- تركيز متضخم للحيوانات المنوية في السائل المنوي (قلة النطاف) (مؤقت)

- قد تحدث هذه الدواء بعد تناوله يومياً أحيناً

غير معروف (لا يمكن تقدير التردد من البيانات المتاحة)

وردت تقارير قليلة جداً عن حدوث ارتفاع ضغط الدم الحميد داخل الجمجمة لدى المراهقين. وتشمل

الآثار الجانبية المعدة، الغثيان، القيء، واضطرابات بصرية وأوسمية.

بعض هذه الآثار الجانبية قد تعود إلى أمراض الأمعاء نفسها.

5- كيفية تخزين تحاميل بنتاسا

ضع هذه الدواء بعيداً عن رؤية وتناول الأطفال.

لا تستخدم هذه الدواء لارتفاع انتهاء الصلاحية المذكور على العلبة الخارجية. يشير تاريخ انتهاء

الصالحة إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

لا يحفظ على درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية يحفظ في الطيبة الأصلية.

لا تتخلص من أي دوائية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية

الخلاص من الأدوية التي لم تعد تستخدم. سوف تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6- محتويات الطبلة ومعلومات أخرى

المادة الفعالة: تغمسيلية واحدة تغمس على الأكياس.

المكونات الأخرى هي: بوفيفون 30، ماكروغول 6000، ستيرات المغنيسيوم، التالك.

يشبه شكل تحاميل بنتاسا شكل الأقراص.

كيفية تدوير تحاميل بنتاسا

علب من 10، 14، 28، 30، 84 أو 90 تحاميل.

قد لا تكون جميع العبوات مسورة.

يصرف بوجب وصفة طبية.

القائمة II

صاحب رخصة التسويق/صاحب مقرر التسجيل: فرينج جي أم بي اتش، وبيللاند، 11، 24109 كيل، المانيا.

صاحب رخصة التسويق في المغرب: سوطينا ص.ب رقم 1-27182-27182، بوسكرة، المغرب.

المصنع والمعبى: فرينج انترناشونال سنتر اس اي، طريق فرقونيونزار، 50، 1162 سانت بريكس، سويسرا.

محرر المخصص للشرق الأوسط وأفريقيا الناطقة بالإنجليزية: فرينج انترناشونال سنتر اس اي، طريق

فرقونيونزار، 50، 1162 سانت بريكس، سويسرا.

محرر المخصص للغرب العربي: فرينج جي ام بي اتش، وبيللاند، 11، 24109 كيل، المانيا.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر:

رخصة التسويق في المغرب:

رخصة التسويق في تونس:

تاريخ مراجعة النص: شباط/فيفري