

برونكو - فاكسوم

التركيب

العنصر الفعال

كل كيسولة للبالغين 7 ملغ من حلاوة جرزومية مجمدة مكونة من الهيميفيلوس إنفلونزا، الكورون النائية الرئوية، الكلبيسيلا الرئوية والأنفوية، للكورة العقنوبية المذهبة، الكورة السبحية القحبية والخضرة النابيسيريا النزلية.

كل كيسولة للأطفال 3.5 ملغ من حلاوة جرزومية مجمدة مكونة من الهيميفيلوس إنفلونزا، الكورة النائية الرئوية، للكورة العقنوبية المذهبة، للكورة السبحية القحبية والخضرة النابيسيريا النزلية.

السواغ

كل كيسولة 300

مضاد التأكسد (E310)، غلوتامات، مادة ملونة (E132)، سواغ لكيسولة واحدة.

الخصائص والتأثيرات

عامل حاد للمناعة.
عند الحيوان في الإنفلونزا الإختبارية لدفع لوظف ازدياد لمقاومة الخمج وتنشيط للخلايا اللمعية الكبيرة والخلايا للمفاوية B وارتفاع في نسبة الغلوبولينات المناعية التي تفرزها الأغشية المخاطية التنفسية.
عند الإنسان لدفع لوظف ارتفاع نسبة خلايا T للمفاوية الدورانية والغلوبيولين المناعي A المناعية وزيادة في الاستجابة غير النوعية للجينات المخاطية المتعددة الاستنساخ وفي التفاعلات للمفاوية المخملطة.
سلامة الدواء:

إن دراسة السمية قبل السريرية العديدة التي أجريت لم تدل على وجود أي تأثير سمي للدواء.

الحرائك الدوائية

ليس هناك نموذج اختياري متوفر حتى الآن.

دواعي الاستعمال

علاج كئلتانة، الوقاية من أحماج المسالك التنفسية الراجعة ومن السورارات الحمجية الحادة في حالات التهاب القصبات الزمن.
كعلاج مشترك في معالجة أحماج المسالك التنفسية الحادة.

المقدار وكيفية الاستعمال

المرضى القويّة و/أو المعالجة الداعمة: كيسولة واحدة في اليوم تؤخذ على معدة فارغة لمدة عشرة أيام متتالية كل شهر ولدة ثلاث شهور.
معالجة السورارات الحادة: كيسولة واحدة في اليوم تؤخذ على معدة فارغة حتى زوال الأعراض (لكن على أقله لمدة عشرة أيام)، في الحالات التي تستدعي استعمال مضاد حيوي يفضل إعطاء برونكو-فاكسوم مشاركة مع بداية المعالجة.

الأطفال من 6 شهور إلى 12 سنة من العمر: نفس البرنامج العلاجي للبالغين إذا برونكو-فاكسوم للأطفال بحوي نصف جرعة البرونكو فاكسوم للبالغين.
ملاحظة: يمكن منح كيسولة برونكو-فاكسوم للأطفال ومرج محتوياتها مع مشروب (عصير الفاكهة، حليب الح...) إذا وجد الطفل صعوبة في بلع الكيسولة.

حجود الإستعمال

موانع الإستعمال

فرط الحساسية المؤكدة لأحد مكونات برونكو - فاكسوم.

الاحتياطات

استنادا إلى البيانات المنورة حاليا يُنصح بعدم إعطاء برونكو-فاكسوم للأطفال دون 6 شهور من العمر لعدم اكتمال نظام المناعة عندهم.

التأثير على القيادة والعمل على الآلات

مفترض أن يكون استعمال برونكو-فاكسوم آمناً ومجرداً من أي خطر من أي تأثير ضار.

الحمل والإرضاع

إن دراسات الحوامل التي أجريت على الحيوان لم تبين وجود أي خطر ماسخ على الجنين لكن ليس هناك دراسات متوفرة عند المرأة الحامل. أما بالنسبة للإرضاع فتحتى الآن لم جرى أية دراسات خاصة بهذا الشأن ولا توجد أي بيانات متوفرة.

التأثيرات غير المرغوبة

التي الإجمالية للتأثيرات غير المرغوبة التي لوحظت أثناء الدراسات السريرية يتراوح بين 3 و 4 %.

فيما بعد، بيان بالتأثيرات غير المرغوبة التي أبلغ عنها مرتبة حسب وثيرة تكرارها (بماضفة) 1 إلى 10 %، غير مألوفة، 0.1 إلى 1 %، نادرة، 0.01 إلى 0.01 %، نادرة جداً، أقل من 0.01 % ومن ضمنها الحالات الفردية)

التأثيرات غير المرغوبة

اضطرابات هضمية	اضطرابات جلدية	اضطرابات تنفسية	اضطرابات الجهاز العصبي عامة
هسهة	التهربطية - طفح جلدي - شرى - إقياء	عسر التنفس - سعال	صعاع
تأثرة: 0.01 إلى 10.1 %			حصى - ارتكاسات - حمضية

يجب قطع العلاج في حال استمرار الاضطرابات الهضمية والتنفسية في حالات الارتكاسات الجلدية، يجب قطع المعالجة لأحتمال أن يتعلّق الأمر برد فعل تحسسي.

دلت معطيات المراقبة الدوائية على نسبة ضئيلة من التأثيرات غير المرغوبة (أقل من 0.001 %) في الأشخاص الذين عولوا بالبرونكو-فاكسوم.
لقد أبلغ عن حالات فردية من رد فعل من منشأ أرجي مناعي أو غير مناعي: فرطية مصحوبة أو غير مصحوبة بنفص الصفجات، عسر التنفس، طفح جلدي أو تشنج بطني، تفاقم التهاب الأنف، التهاب الأذن، التهاب الصفيحات، التهاب الحنجرة، طفح شامل، ودمع عصبية وعائية، خرب وعائي، ألم مفصلي شديد، تفاقم متلازمة شوغ وسترأوس، تسرع القلب والتشنج، الضعف في إطار متلازمة تحسسية.

500 مليون جرعة برونكوفاكسوم أعطيت للبالغين وأطفال، لم يبلغ سوى عن حالة فردية واحدة من متلازمة لوبل عند الطفل وجود علاقه مع تناول برونكوفاكسوم محتملة مع التفكير بأن أسباباً أخرى (مثل الإصابة بقطر مصوريّة) قد تكون ساهمت في حدوث هذا التأثير غير الربوي. عموماً إن وثيرة التأثيرات غير المرغوبة التي لوحظت تعتبر ضئيلة جداً مقارنة مع العدد الكبير من الذين تناولوا الدواء.

التداخل الدوائي

لا يعرف حتى الآن أي تداخل دوائي.

فترة الجرعة

لم تستجّل أية حالة فرط جرعة حتى الآن ونظراً لطبيعية برونكو-فاكسوم واستناداً إلى نتائج اختبارات السمية عند الحيوان فاحتمال تناول الجرعة مفرطة يبدو مستحلاً.

ملاحظات خاصة

اللائاق

لا تعرف أية حالة لا توافق حتى الآن.

الصلاحية الدواء

مدة الصلاحية هي 5 سنوات على شرط حفظ برونكوفاكسوم في عبوته الأصلية.

شروط خاصة للحفظ

يجب حفظه في حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.
يجب عدم استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة مقابل "EXP".

العبرة

كيسولات للبالغين، 10 و 30 كيسولة.

كيسولات للأطفال، 10 و 30 كيسولة.

إن هذا الدواء

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
فالتبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغيه وضرم.
لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

الوزن:

OM أو ام فارما، مبن-جنيف، سويسرا.

تاريخ مراجعة النشر: 2008