



أورو- فاكسوم

التركيب

العنصر الفعال

كل كبسولة تحتوي 6 ملغ من حلاله جرنومة إشبيريشيا قولونية الجفدة.

السواغ

كل كبسولة تحتوي مضاد التأكسد (E310) . غلوتامات. سواغ لكبسولة واحدة

الخصائص والتأثيرات

عامل حاث للمناعة.

عند الحيوان لقد لوحظ في الإنتهايات الإخبارية تأثير واق من الحمض وتنشيط الخلايا البلعمية الكبيرة والخلايا اللمفاوية B والخلايا المؤهلة للمناعة في لويحات باير وارتفاع في نسبة الغلوبولين المناعية في الإفرازات المعوية.

عند الإنسان ينشط أورو- فاكسوم الخلايا اللمفاوية T ويحث على تكوين الإنترفيرون داخليا ويريد مستوى sIgA في البول.

سلامة الدواء

إن دراسة السمية قبل السريرية العديدة التي أجريت لم تدل على وجود أي تأثير سمي للدواء.

الحراك الدوائي

ليس هناك نموذج اختبري متوفر حتى الآن.

دواعي الاستعمال

علاج بالثأنة الوقائية في أمحاج المسالك البولية السفلى الراجعة. كعلاج مشترك في معالجة أمحاج المسالك البولية الحادة.

المقدار وكيفية الاستعمال

المعالجة الوقائية و/أو المعالجة الداعمة: كبسولة واحدة في اليوم تؤخذ على معدة فارغة لمدة ثلاث شهور متتالية.

معالجة السوريات الحادة: كبسولة واحدة في اليوم . تؤخذ على معدة فارغة كعلاج مشترك مع معالجة التقليدية بالمضادات الحيوية حتى زوال الأعراض ولكن على أقله مدة 10 أيام متتالية.

حدود الإستعمال

موانع الإستعمال

فرط الحساسية المؤكدة لأحد مكونات أورو- فاكسوم.

الاحتياطات

لم يتم التثبت من فعالية وسلامة أورو- فاكسوم لدى الأطفال أقل من 4 سنوات من العمر.

التأثير على القيادة والعمل على الآلات

مفترض أن يكون استعمال أورو-فاكسوم آمناً ومجرباً من أي خطر من أي تأثير ضار.

الحمل والإرضاع

إن دراسات النكاث التي أجريت على الحيوان لم تبين وجود أي خطر ماسخ على الجنين لكن ليس هناك دراسات متوفرة عند المرأة الحامل. أما بالنسبة للإرضاع فحتى الآن لم جرى أية دراسات خاصة بهذا الشأن ولا توجد أي بيانات متوفرة

التأثيرات غير المرغوبة

المدى الإجمالي للتأثيرات غير المرغوبة التي لوحظت أثناء الدراسات السريرية يصل إلى 4% . فيما بعد بيان بالتأثيرات غير المرغوبة التي أبلغ عنها منها حسب وتيرة تكرارها

(مألوفة) 1 إلى 10% . غير مألوفة: 0.1 إلى 1% . نادرة: 0.01 إلى 0.1% . نادرة جداً: أقل من 0.01% ومن ضمنها الحالات المعزولة).
اضطرابات في الهمة العصبية: صداع (مألوف).
اضطرابات قلبية معوية: غثيان (مألوف). تنسج بطني (غير مألوف) . إسهال (مألوف). عدم تحمل العدة (مألوف). سوء هضم (شائع).
اضطرابات عامة: حمى (غير مألوفة)

اضطرابات جلدية: تفاعل تحسسي (غير مألوف). تهيج في الجلد (غير مألوف). حكة (غير مألوفة). طفح ظاهر خفيف (غير مألوف)
وقد أبلغ عن حدوث آثار جانبية أخرى غير حادة أهمها حالات عدة من تساقط الشعر.

كما أبلغ عن حالات أخرى معزولة لكنها جديده كحدوث وذمات في الفم. ووذمات محيطية.
فإذا حدثت تفاعلات جلدية أو حمى أو وذمات. لا بد من إيقاف المعالجة لأن هذه قد تكون علامات على حدوث تفاعل تحسسي

التداخل الدوائي

لا يعرف حتى الآن أي تداخل دوائي.

فرط الجرعة

لم تسجل أية حالة فرط جرعة حتى الآن ونظراً لطبيعته أورو-فاكسوم واستناداً إلى نتائج اختبارات السمية عند الحيوان فاحتما لن تناول جرعة مفرطة يبدو مستحيلاً.

ملاحظات خاصة

اللاتوافق

لا تعرف أية حالة لا توافق حتى الآن.

صلاحية الدواء

مدة الصلاحية هي 5 سنوات على شرط حفظ أورو-فاكسوم في عبوته الأصلية.

شروط خاصة للحفظ

يجب حفظه في حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية
يجب عدم استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة مقابل "EXP".

العبوة

كبسولات للبالغين: 30 و 90 كبسولة.

إن هذا الدواء

مصنحصر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
فالطبيب والصيدلاني هما الحيوان الدواء وينفعه وضرم لا تقطع مدة العلاج أكيدة لك من تلقاء نفسك.
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

الموزع:

OM أو ام فارما. مبرن-جنيف. سويسرا.

تاريخ مراجعة النشرة: 2008