

كونكور® كور 2,5 ملغم

المواد النشطة: بيسوبرولول فومات (1:2)

التكوين

يحتوي القرص المغلف الواحد على المواد الطبية النشطة التالية:

2,5 ملغم بيسوبرولول فومات (1:2).

مواد إضافية:

ثاني أكسيد السيليكون الغرواني، ماغنيسيوم (سيترات، لمبيات، أوليات)، كروسوفيدون، نشا الذرة، دقيق بلورية السيلوز، هيدروفلوسفات الكالسيوم، ديميثكون، ماكروجول 400، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، هيبروميلوز.

شكل وحجم العبوة

أقرص مغلفة، بضاء عياره عن مثبط البيتا الخاص بالقلب.
تحتوي العبوة على 30 قرصا.

الخاصية الدوائية

إن هذا العقار عبارة عن مثبط البيتا الخاص بالقلب.

حق الصنع والتسويق

ميرك، شركة توصية بالاسم Merck KGaA،
Frankfurter Strasse 250
Darmstadt 64293 دارم شتات، جمهورية ألمانيا الاتحادية

نوع الاستعمال

للمعالجة أمراض القلب الشريانية المزمنة الثابتة متوسطة الدرجة وحتى الحادة منها (قصور عضلات القلب) في حالات محدودية عمل إقباض البطيني (القفذ الجزئي ≥ 35%)، محدد بواسطة تخطيط صدى القلب، بالإضافة إلى مثبطات أنجيوتنسين الأتريمية المحولة ACE ومدرات البول، وإذا تطلب الأمر غليكوسيدات القلب.

مواعيد الاستعمال

متى يمنع استعمال كونكور كور 2,5 ملغم ؟

يمنع استعمال كونكور كور 2,5 ملغم في الحالات التالية:

- في حال قصور عضلات القلب الحاد (قصور القلب) أو أثناء سوء حال قصور القلب (اللامعوضة) التي تتطلب المعالجة عن طريق الوريد بغyar يعمل على زيادة قدرة القلب
- في حال الصدمة (الصدمة القلبية) الناتجة عن خلل وظيفي في القلب
- في حال وجود خلل حاد في التوصيل انبضي بطيفي في القلب (من الدرجة الثانية والثالثة) بدون الناعمة القلبية
- في حال وجود ظاهرة مرض الجيوب (ظاهرة سيك زينوس)
- في حال وجود خلل توصيلي بين العقدة الجيبية الأتنية من جهة والأذين من جهة أخرى (التحصار الجبي انذي)
- في حال نبض القلب البطيئ جدا (بطء القلب اقل من 60 ضربة في الدقيقة الواحدة) قبل البدء في المعالجة
- في حال الانخفاض الكبير في ضغط الدم (انقص الضغط، ضغط انقباضي اقل من 100 ملم زئبقي)
- في حال وجود مرض الربو القصبي لحد أو داء الرئة الساد الزمن الحاد
- في المراحل لمتأخرة من أمراض الانسداد المحيطي الشرياني أو التشنجات الشريانية (ظاهرة رينولد المرضية)
- في حال وجود ورم كحشري (ورم القوائم)
- في حال زيادة إفراز الحامض في الجسم (الحامض الأضي)
- وفي حال فرط الحساسية تجاه بيسوبرولول واي من مكونات قرص الدواء.

متى يجب إستشارة الطبيب قبل استعمال كونكور كور 2,5 ملغم؟

لا يسمح في الحالات التالية بتناول كونكور كور 2,5 ملغم إلا تحت شروط محددة ويحذر شديد جدا، يرجى إستشارة الطبيب في هذا الخصوص. ينطبق هذا أيضا حتى ولو تعرض الشخص المعني لمثل هذه الظواهر في مرة سابقة.

- التشنج الشعبي (الربو القصبي، داء الرئة الساد)
- المعالجة بواسطة استنشاق مواد مخدرة
- داء السكري مع تقلبات كبيرة في نسبة جلوكوز الدم، ووجود مؤشرات على نقص كبير في سكر الدم (كتني سكر الدم) قد تكون مخفية
- الصوم الصحي الصارم
- أثناء المعالجة من أجل إزالة التحسس
- اضطرابات قلب أنيضية بطنية خفيفة (إنبضي بطني من الدرجة الأولى)،
- اضطرابات في تنفق الدم من وإلى القلب نتيجة الأوعية التاجية أو ما يدعى بـ (Prinzmetal's angina)
- مرض الانسداد الشرياني المحيطي (يمكن أن يزداد الأم خاصة عند بداية العلاج)

ينبغي على المرضى الذين لهم علاقة مباشرة أو متوارثة عائلتا بـ اضطرابات تناول مثبطات البيتا (على سبيل المثال العلاج كونكور كور 2,5 ملغم) فقط بعد تدقيق تلم بمدى النفع والضرر المترتبان عليه.

أما في حال وجود أورام لب الكضر (ورم القوائم) فيسمح باستعمال كونكور كور 2,5 ملغم فقط بعد تناول مثبطات القأ.

ما الذي يجب مراعاته من قبل السيدات الحوامل والأمهات الحاضنات؟

ينبغي عدم الاستطباب بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم أثناء فترة الحمل إلا بعد تدقيق تام جدا بمدى النفع والضرر المترتبان عليه وذلك من قبل الطبيب المعالج. تعمل المثبطات بشكل عام على خفض تنفق الدم إلى المشيمة ويمكن أن تؤثر على تطور الجنين. لذا يجب مراقبة تنفق الدم إلى المشيمة والرحم وتطور الجنين، كما يجب في حال تطلب الأمر ذلك البحث عن بدائل علاجية أخرى. لا يعرف حتى الآن إن كانت مادة اليبسوبرولول تنتقل مع حليب الام أم لا. لذا ينصح بعدم الإرضاع خلال فترة تناول كونكور كور 2,5 ملغم.

ما الذي يجب مراعاته لدى الأطفال وكبار السن من المرضى؟

ينبغي عدم إستعمال كونكور كور 2,5 ملغم لعلاج الأطفال لعدم توفر الخبرة العلاجية الكافية في هذا المجال. أما لدى كبار السن من المرضى فليس من الضروري مساواة الجرعة. وفيما يتعلق بالمرضى الذين يعانون بقصور قلبي وتريد اصهارهم عن 80 عاما فلم تتوفر بعد الخبرة العلاجية الكافية في هذا المجال.

تنبيهات وتحذيرات الاستعمال

ما هي الاحتياطات التي يجب مراعاتها؟

تتطلب معالجة قصور عضلات القلب بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم المراقبة الطبية المنتظمة، خصوصا في المرحلة الأولى من تناول العلاج.

ينبغي تناول علاج لتوسيع الشعب التنفسية إلى جانب كونكور كور 2,5 ملغم في حالة معالجة التشنج الشعبي (الربو القصبي) أو أي من اضطرابات العمل الرئوية السادة المزمنة التي يمكن أن تكون مصحوبة بالاعراض المرضية.

قد تظهر في بعض الأحيان زيادة في مقاومة القوات التنفسية لدى مرضى الربو القصبي مما يتطلب رفع كمية الجرعة من معدل لودي ٢٠ التي تدعى منشطات ٢٠٠ السميثاوية.
يمكن أن تؤدي مادة اليبسوبرولول، كما هو الحال أيضا بالنسبة لمثبطات البيتا، إلى زيادة الحساسية تجاه التحسس وردود الفعل اللاقائية الحادة، أي إلى ردود فعل حساسية بشكل عام حادة. ولا يظهر الأيرانيالين في هذا الخصوص المفعول العلاجي المرغوب.
يمكن أن تؤدي مادة اليبسوبرولول إلى إغفاء أعراض ارتفاع نسبة إفراز الغدة الدرقية (الإستسم الدرق).

لا تتوفر حتى الآن خيرة علاجية كافية بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم جديرة بالذكر على لمرضى الصمابين بقصور القلب إلى جانب أمراض السكري المرتبطة بالانسولين (داء السكري من النوع الأول)، اضطراب عمل الكليتين (مصل كرياتينين ≤ 3,4 ملغم لكل 100 ملتر) ولدى المرضى الذين يعانون من خلل كيدي وظيفي، حالات الاعتلال القلبي العضلي المعقدة أمراض القلبية الخلفية أو حول أمراض زخم الدم في الصمام القلبي. وكذلك الحال بالنسبة للقصور القلبي الخفيف (أنبضي بطيفي القلب من الدرجة الثانية NYHA II) وكذلك قصور القلب والتبحة القلبية في الأشهر الثلاثة الأخيرة لا تتوفر خبرة علاجية كافية في هذا المجال.

ينبغي عدم قطع العلاج بواسطة مادة اليبسوبرولول فجأة في حال عدم وجود داعي إضطراري لذلك.

ما الذي يجب مراعاته على الطرقات وأثناء العمل على آلات أو العمل في أماكن غير مئتمة؟

لم تبيين الدراسة التي أجريت على مرضى داء القلب الإكليلي الذين يخضعون للمعالجة بواسطة مادة اليبسوبرولول أية تأثيرات على قدرتهم في الطرقات. ومن الممكن بالرغم من ذلك وفي حالات فردية أن تظهر ردود فعل مختلفة بسبب الدواء، بحيث تتغير القدرة على رد الفعل إلى درجة يتأثر معها التواجد على الطرقات وتشغيل الآلات أو العمل في أماكن غير ثابتة نتيجة للدواء. وينطبق هذا بشكل خاص مع بداية المعالجة وفي حال رفع الجرعة الدوائية وتغيير العلاج وكذلك في حال إقترانه مع تناول الكحول.

تنبيهات خاصة

إن هذا الدواء

- مع مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.
- لا تقطع ملع العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء دون مراجعة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيدلة العرب

التأثيرات الدوائية للسلط

ما هي الانوية الأخرى التي تؤثر على مفعول كونكور كور 2,5 ملغم أو ما هو أثر كونكور كور 2,5 ملغم على الانوية الأخرى؟

يمنع بعدم تزامن تناول الانوية التالية إلى جانب هذا الدواء:

تحت ملاحظة زيادة انخفاض ضغط الدم في حال تزامن إستعمال الدواء مع مضادات الكالسيوم، ويتباطؤ في نظام التوصيل الانبضي البطيفي وتلزم قابلية التقلص في عضلات القلب.

كذلك يمكن أن يؤدي تزامن العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم وكلونيدين إلى الزيادة الحادة جدا في انخفاض معدل سرعة القلب وإلى القلوصية العضلية في القلب. ويمكن علاوة على ذلك أن يؤدي الانقطاع عن تناول كلونيدين إلى زيادة حدة في فرط ضغط الدم.

من مزامنة تناول كونكور كور 2,5 ملغم إلى جانب مثبطات أحادي اوكسيتاز الأمين (ما عدا مثبطات أحادي اوكسيتاز الأمين ب) قد تؤثر على ضغط الدم (خفض ضغط الدم، كذلك أيضا زيادة حادة في فرط ضغط الدم).

لا يسمح بتزامن تناول كونكور كور 2,5 ملغم مع الانوية التالية إلا تحت ظروف محددة ويحذر شديد فقط:

يمكن أن تتضاعف فاعلية التثبيط للعقار كونكور كور 2,5 ملغم ومضادات الانظمية على دفعات القلب وقصوية نسج القلب.

إن المعالجة المتزامنة بكونكور كور 2,5 ملغم ومستحضرات الباراسميثاوية (بما فيها تاسرين) قد تؤدي إلى إبالة فترة التوصيل الانبضي البطيفي (تأخر في التوصيل) (بما فيها ربما يزداد مفعول كونكور كور 2,5 ملغم من جراء تزامن المعالجة به إلى جانب مثبطات البيتا بما فيها أيضا قطرة العين، التي تحتوي على مثبطات البيتا.

يمكن أن يؤدي تزامن تناول كونكور كور 2,5 ملغم مع الانسولين أو المستحضرات الطبية المخفضة لنسبة السكر في الدم (مضادات السكر التي يتم تناولها عن طريق الفم) إلى زيادة فاعلية هذه المستحضرات. إن مؤشرات انخفاض نسبة السكر في الدم (كتني سكر الدم) – وخاصة (نبض القلب السريع) – غالبا ما تكون غير واضحة تماما أو خفيفة.

يمكن أن يؤدي تزامن تناول كونكور كور 2,5 ملغم ومواد التخدير إلى مضاعفة إنخفاض ضغط الدم.

يمكن أن تتأثر سلبيا آليات التنظيم المضاد على سبيل المثال إرتفاع نبض القلب (رد فعل صارع القلب). إن متابعية تثبيط البيتا تقلل من خطر الانظمية أثناء التخدير والتثبيط. يجب إحاطة الطبيب المخدر علما قبل البدء في التخدير فيما إذا كان المريض يتناول كونكور كور 2,5 ملغم.

يمكن أن تؤدي المعالجة المتزامنة بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم وديجيتاليس إلى زيادة تباطؤ نبضات القلب والتحول في القلب.

قد يزداد أيضا تباطؤ نبضات القلب في حال إقترن تناول كونكور كور 2,5 ملغم بالمعالجة بواسطة ميفلوكوين.

قد يؤدي تزامن المعالجة بواسطة مستحضرات التثبيط بروتستغلندين الاصطناعية (على سبيل المثال حامض خليل الصفصاف) إلى الحد من تأثير كونكور كور 2,5 ملغم في خفض ضغط الدم.

قد يؤدي العلاج المتزامن ببعض مشتقات الاريجوتامين (على سبيل المثال عقاقير علاج الشقيقة التي تحتوي على الاريجوتامين) وكونكور كور إلى زيادة الخلل في الدورة الدموية المحيطية.

قد يؤدي استعمال كونكور كور 2,5 ملغم المتزامن مع تناول مستحضرات طبية أخرى مثل منشطات الجهاز السميثاوي إلى خفض مفعول العقارين. وقد تتطلب معالجة ردود فعل على شكل حساسية جرعة عالية من الاريانيلين.

يمكن أن يؤدي تزامن العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم إلى جانب ثلاثي الحلقي المضاد للكآبة، أو الباربيتورات أو مستحضرات الفينوثيازين وغيرها من مواد خفض ضغط الدم إلى مضاعفة مفعول كونكور كور 2,5 ملغم في خفض ضغط الدم.

يمكن أن تؤدي مزامنة المعالجة بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم إلى جانب ريفامبين إلى تقليل خفيف في العمر النصفي لليبسوبرولول

تحديد الجرعة وطريقة ومدة الاستعمال

تطبق تعليمات تحديد الجرعة التالية على كونكور كور 2,5 ملغم، إلا في حال أوصى الطبيب بغير ذلك. يرجى اتباع تعليمات الطبيب بغاية، ولا قلن يؤدي كونكور كور 2,5 ملغم المفعول المناسب!

ما هي الكمية التي ينبغي تناولها من كونكور كور 2,5 ملغم وما هو عدد مرات التناول؟

ينبغي أن يكون الشخص الذي سيعالج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم يعاني من قصور قلبي مزمن ثابت دون تردي حاد (اللامعوضة) في الأسابيع الستة الأخيرة.

ينبغي أن يكون المريض قد حصل مقدما على علاج بواسطة مضبطات أنجيوتنسين الأتريمية المحولة ACE بجرعة مناسبة (أو بواسطة علاج لتوسيع الاوعية الدموية (موسع الاوعية) في حال عدم القدرة على تحمل مضبطات أنجيوتنسين الأتريمية المحولة ACE)، وعلاج مساعد على إدرار البول (مدر البول)، إذا تطلب الأمر علاج ديجيتاليس. ويجب أن تكون المعالجة الأساسية بهذه الأدوية ثابتة إلى أبعد حد ممكن في الاسابيع الأخيرةين، وذلك قبل الشروع في العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم.

تبدأ المعالجة بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم بجرعة قليلة يتم رفعها تدريجيا. يجب أن يتبع الطبيب المعالج بخبرة في علاج قصور القلبي الزمن.

إن كونكور كور 2,5 ملغم للمرحلة الأولى من العلاج. قد يكون كونكور كور 2,5 ملغم كاف لمتابعة المعالجة الدوائية لدى بعض المرضى.

ينصح بتناول الجرعات وزايدتها على الشكل التالي:

1,25 ملغم بيسوبرولول (أي ما يعادل نصف قرص من كونكور كور 2,5 ملغم) مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع واحد.

إذا كانت قابلية الجرعة مناسبة، يتم في هذه الحالة رفع الجرعة إلى 2,5 ملغم بيسوبرولول (أي ما يعادل قرصا واحدا ونصف فقط من كونكور كور 2,5 ملغم) مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع واحد.

إذا كانت قابلية الجرعة مناسبة، يتم في هذه الحالة رفع الجرعة إلى 3,75 ملغم بيسوبرولول (أي ما يعادل قرصا واحدا ونصف فقط من كونكور كور 2,5 ملغم) مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع واحد.

إذا كانت قابلية الجرعة مناسبة، يتم في هذه الحالة رفع الجرعة إلى 5 ملغم بيسوبرولول مرة واحدة يوميا لمدة أربعة أسابيع.

إذا كانت قابلية الجرعة مناسبة، يتم في هذه الحالة رفع الجرعة إلى 7,5 ملغم بيسوبرولول مرة واحدة يوميا لمدة أربعة أسابيع.

إذا كانت لاقبية الجرعة مناسبة، يتم في ذه الحالة رفع الجرعة إلى 10 ملغم بيسوبرولول مرة واحدة يوميا كجرعة دائمة.

وفي حال تطلب الأمر جرعات أعلى من 2,5 ملغم بيسوبرولول، فهناك أقراص متوفرة من كونكور كور بجرعات أعلى.

يجب أن يخضع المريض خلال الأربع ساعات التالية لبداية المعالجة بواسطة 1,25 ملغم بيسوبرولول (نصف قرص من كونكور كور 2,5 ملغم) لمراقبة (ضغط الدم، معدل سرعة القلب، اضطرابات جهاز الوصيل، مؤشرات على تردي في قصور القلب).

ينبغي عدم تناول الجرعة العليا بمقدار 10 ملغم بيسوبرولول مرة واحدة يوميا إلا بعد رفع الجرعة تدريجيا خلال فترة لا تقل عن 12 أسبوع ويمنع عدم تجاوز الجرعة.

يمكن أن يؤدي ظهور أعراض جانبية (على سبيل المثال بطء القلب العرضي أو هبوط ضغط الدم، ومؤشرات على تردي في قصور القلب) إلى عدم إمكانية العلاج بالجرعة التي ينصح بها. ويمكن في حال تطلب الأمر العودة إلى خفض الجرعة العلاجية تدريجيا. كما يمكن عند الضرورة قطع المعالجة بالمستحضر وإستئناف الاستعمال من جديد كما هو مخصص في وقت لاحق.

وفي حال تردي في قصور القلب أو عدم القدرة على تحمل العلاج في مرحلة التردّي ينصح الطبيب المعالج بخفض كمية اليبسوبرولول وإذا تطلب الأمر لاسباب إضطرارية وقف العلاج مباشرة.

تكون معالجة أمراض القلب الشريانية المزمنة الثابتة بواسطة كونكور كور عادة معالجة طويلة الأمد.

مقدار الجرعة في حال اضطرابات الوظيفية في الكبد و/ أو الكلى

يجب تعيير الجرعة الدوائية لدى المرضى الذين يعانون من خلل وظيفي في الكبد أو الكلى كنفة صارمة وذلك لعدم توفر الفحوصات حول حركه العقار.

كيف ومتى ينبغي تناول كونكور كور 2,5 ملغم؟

يتم تناول أقراص كونكور كور 2,5 ملغم في الصباح قبل أو أثناء أو بعد تناول الإفطار دون مضغها مع قليل من السوائل.

ما هو طول المدة الزمنية التي ينبغي فيها تناول كونكور كور 2,5 ملغم؟

تعتبر معالجة أمراض القلب الشريانية المزمنة الثابتة بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم بشكل عام معالجة طويلة الأمد. يمنع منعا باتا تغيير مقدار الجرعة دون توجيه مسبق من قبل الطبيب المعالج. كما يجب عدم قطع أو إنهاء العلاج بكونكور كور أو دون توجيه من الطبيب. يجب عند إنهاء العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم أن يتم خفض الجرعة تدريجيا على طريق إهانتها (على سبيل المثال تناول نصف الجرعة أسبوعيا). يجب عدم قطع العلاج بواسطة كونكور كور، لان ذلك يمكن أن يؤدي إلى تردي آني بناية لقصور القلب الاحتقاني.

الاستخدام غير السليم و تجاوز الجرعة

ما الذي يجب عمله عند تناول كمية كبيرة من كونكور كور 2,5 ملغم؟

يجب مراجعة الطبيب فورا في حال زيادة الجرعة من كونكور كور 2,5 ملغم. يقرر الطبيب في حال تطلب الأمر ذلك في خطورة زيادة الجرعة والإجراءات الضرورية اللازمة لذلك. في حال زيادة الجرعة يظهر أثرها بشكل خاص في أضعاف القلب بحيث تصبح نبضاته بطيئة (باطئ القلب) أو ينخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ جدا (انخفاض ضغط الدم) وتشنجات الشعبية (تشنج شعبي) وقصور حاد في عضلات القلب (قصور قلبي) وإنخفاض نسبة السكر في الدم (انقص سكر الدم).

ينبغي في حالة تجاوز الجرعة قطع العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم بعد مراجعة الطبيب المعالج فقط.

ما الذي يتوجب مراعاته عند تناول جرعة قليلة من كونكور كور 2,5 ملغم أو عند نسيان تناول الجرعة؟

يجب عدم مضاعفة الجرعة في حال نسيانها في إحدى المرات من أجل تعويضها، وإما متابعة تناول العلاج حسب الجرعة المحددة أو كما يقررها الطبيب المعالج.

ما الذي يتوجب مراعاته عند الانقطاع أو التوقف عن العلاج قبل الأوان؟

يرجى عدم قطع العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم إلا بعد مراجعة الطبيب المعالج مقدما فقط.

يجب عدم قطع العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم، لان ذلك يمكن أن يؤدي إلى تردي آني بداية لقصور القلب الاحتقاني. يجب عند إنهاء العلاج بواسطة كونكور كور 2,5 ملغم أن يتم خفض الجرعة تدريجيا على طريق إهانتها (على سبيل المثال تناول نصف الجرعة أسبوعيا). ويجب مراعاة ذلك بشكل خاص من قبل المرضى الذين يعانون من اضطراب تاجي في تنفق الدم.

التأثيرات المضادة

يمكن أن يكون للعقارات الطبية تأثيرات غير مرغوب بها، تدعى تأثيرات مضادة، إلى جانب تأثيراتها الرئيسية المنشودة، وليس بالضرورة أن تظهر هذه الأعراض لدى كل المرضى.

ماهي رموز الفعل المضادة التي قد تحدث أثناء استعمال كونكور كور 2,5 ملغم؟

إن المعلومات التالية قائمة على أساس الخبرة العلاجية بعد ترخيص إستعمال بيسوبرولول في معالجة ارتفاع ضغط الدم ومعالجة داء القلب الاكليلي:

- **الجهاز العصبي المركزي:**
 - إحيانا: إعياء،* وضع إرهاق،* شعور بالدوخ،* صداع*
 - نادرا: إضطراب في النوم، شعور بالكآبة،
 - نادرا جدا: كوابيس نوم، هلوسة
- **العُيُن:**
 - نادرا جدا: انخفاض الدمع (يجب مراعاة ذلك في حال إستعمال العدسات اللاصقة)
- **حالات فردية:** التهاب المتحمّة
- **الأذنين:**
 - نادرا جدا: إضطرابات سمعية
- **القلب والدورة الدموية والأوعية الشريانية:**
 - إحيانا: الشعور بالبرد وخدر الأطراف
 - نادرا: تباطؤ عمل القلب (بطء القلب)، وإضطرابات في نظام التوصيل القلبي الأتنبّي البطيفي (الاحتباس الأتنبضي البطيفي)، وزيادة سوء قصور القلب، زيادة إنخفاض ضغط الدم (أيضا عند الإنتقال من الإستلقاء إلى الوقوف، نقص الضغط الشرياني)
- **المجاري التنفسية:**
 - تشنج في المجاري التنفسية (تشنج قسبي) لدى المرضى الذين يعانون من الربو القصبي أو أية امراض انغلاق رئوي مزمنة
 - نادرا جدا: زكام مصوب بحساسية (إلتهاب الأنف)
- **الجهاز الهضمي:**
 - شعور بالتقيؤ، القيء، إسهال (إسهال)، الإمساك (إمساك مستعصي)
- **الهيكال العضلي والعصبي (جهاز الحركة):**
 - نادرا: ضعف العضلات، تشنج عضلي
- **الجلد:**
 - نادرا جدا: ردود فعل جلدية حساسية عالية(الحك) والتورد الآتي (التورد حساسية)
 - حالات فردية: يمكن لمثبطات البيتا أن تؤدي إلى ظهور داء الصدف، تردي أو نشوء حساسية صدفية، تساقط الشعر
- **المثانة والجهاز التناسلي:**
 - نادرا جدا: اضطراب القدرة الجنسية
- **الابيض:**
 - نادرا جدا: زيادة في أنزيمات الكبد (الالين أمينوترانسفيراز، إسبارلت أمينوترانسفيراز)، إتهاب الكبد، ارتفاع في ثلاثي الغليسريد
- *تظهر هذه الاعراض بشكل خاص في بداية المعالجة. وتكون في العادة بسيطة وتلتاشي بعد أسبوع أو إسبوعين من بداية العلاج.

في حال لوحخت أي من التأثيرات المضادة بما في ذلك التأثيرات غير المذكورة في هذه النشرة الطبية، يرجى مراجعة وإبلاغ الطبيب المختص أو الصيدلي بذلك حالا.

ما هي الإجراءات المضادة التي يجب إتخاذها في حال حدوث التأثيرات المضادة؟

يرجى في حال تطلب الأمر إتخاذ إجراءات مضادة مراجعة الطبيب المعالج للتقرير في الموضوع.

ملاحظات ومعلومات تتعلق بصلاحية الدواء

تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدواء مطبوع على العبوة المغلفة للدواء وعلى حافة كل شريط من أشرطة الأقراص. يمنع استخدام هذه العبوة بمجرد انتهاء تاريخ صلاحيتها!

كيفية تخزين كونكور كور 2,5 ملغم؟

يحفظ في مكان درجة حرارته دون 25 درجة مئوية.

تاريخ الاصدار

شيلط (أبريل 2002).

رقم التسجيل لبنان ٢٣1٤٩

توضيب فارمالين. لبنان

إجازة من ميرك، شركة توصية بالاسهم.

دار مشاتدات. ألمانيا