

# بيتاقال

## بيتاقال - ن

### المفعول:

بيتاقال هو أحد مستحضرات البيتاميثازون ١٧ - فاليريت. وهو من مشتقات الكورتيكوستيروئيد المفلورة الشديدة الفعالية. لذا فهو يتمتع بخواص جيدة مضادة للإلتهاب والحكة. بيتاقال - ن يحتوي بالإضافة إلى البيتاميثازون ١٧ - فاليريت على النيومايسين (المضاد الحيوي) الذي يوصى بإستعماله بشكل موضعي لمعالجة الإلتانات الثانوية للأمراض الجلدية.

### دواعي الإستعمال:

إن بيتاقال يحدث تأثيراً جيداً في الإلتهابات الجلدية الواضحة مثل الأكزيما وأكزيما الأطفال، التهابات الجلد غير الموضعية، التهابات الجلد العقبولية، التهابات الجلد الناتجة عن التماس، التهاب جلد الأوردة، التهاب الجلد المنقيح، التهاب الجلد العصبي، الصدفية، والتسميط. يستعمل بيتاقال - ن في حالة الآفات الملتهبة وخاصة عندما تكون المكورات العنقودية موجودة أو متوقعة.

### الجرعة وطريقة الإستعمال:

يستعمل الكريم ذو السواغ المائي لآفات الجلد الرطبة أو المرتشحة في حين ينصح بإستعمال المرهم ذو السواغ الزيتي عندما يكون الجلد جافاً أو متحشراً. تطبق كمية صغيرة من بيتاقال أو بيتاقال - ن على المنطقة المصابة ٢-٣ مرات يومياً في بعض الحالات المستعصية يمكن أن يستعمل بيتاقال أو بيتاقال - ن تحت ضماد كتيم وذلك من أجل زيادة نفوذته عبر الجلد.

### مضادات الإستعمال:

حالات الحساسية للبيتاميثازون أو النيومايسين. لا يجوز إستعمال بيتاقال - ن كما هي الحال بالنسبة لجميع مستحضرات الكورتيكوستيروئيد المفلورة - في الحالات التالية: الوردية، حب الشباب، التقرحات الجلدية، الأنتانات بالحماض الراشحة مثل العقبول البسيط وعقبول زوستر، الحماق ( جدري الماء)، اللقاحات الفيروسية والثآليل.

### المحاذير:

كما هو الحال لجميع مركبات الكورتيكوستيرويدات ينبغي عدم تطبيق المستحضر على الأماكن المتقرحة. إن المعالجة بالبيتاقال - ن كما هي الحال بالنسبة لبقية مركبات الكورتيكوستيروئيد الموضعية - يمكن أن تؤدي إلى احتمال حدوث آثار إمتصاص جهازية.

### الإحتياطات:

قد يحدث في بعض الحالات النادرة من داء الصدف أن تتفاقم الحالة إذا ما أوقف العلاج قبل حدوث الشفاء التام. يجب تجنب ملامسة هذه المستحضرات للأغشية المخاطية كما يجب تجنب وضعها على العيون، الجفون، وثنيات الجلد.

### الأثار الجانبية:

ضمور الجلد، نقص الأصبغة في الجلد، ظهور الأشعار والأنتانات الثانوية. إن تطبيق بيتاقال - ن على المناطق التي يكون الجلد فيها متخرباً وكذلك إستعماله بكميات كبيرة ربما يؤديان إلى حدوث

إنسمامات سمعية أو إنسمامات كلوية وذلك بسبب إمتصاص النيومايسين.

#### فرط الجرعة:

لايوجد ترياق معين، ينبغي إعطاء العلاجات المساندة اللازمة وتتكون من إيقاف المعالجة الموضعية بالكورتيكوستيروئيد. قد تحتاج إلى إيقاف المستحضر تدريجياً

#### الأشكال الصيدلانية:

##### \* كريم

بيتاميثازون (على هيئة بيتاميثازون ١٧-فالييريت) ٠.١٪

بيتافال

بيتاميثازون (على هيئة بيتاميثازون ١٧-فالييريت) ٠.١٪

بيتافال - ن

كبريتات النيومايسين ٠.٥٪

\* لكل غرام كريم

##### \* مرهم

بيتاميثازون (على هيئة بيتاميثازون ١٧-فالييريت) ٠.١٪

بيتافال

بيتاميثازون (على هيئة بيتاميثازون ١٧-فالييريت) ٠.١٪

بيتافال - ن

كبريتات النيومايسين ٠.٥٪

\* لكل غرام مرهم