

إيلوكوم 0.1% W/W ملجم

وموميمازون فوروات

أقرأ كامل هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ باستخدام هذا الدواء، فهي تحتوي على معلومات هامة بالنسبة إليك.

- احتفظ بهذه النشرة، لترجع إليها عند الحاجة.
- استشر طبيبك أو الصيدلاني أو الممرضة إن كانت لديك أي أمنية اضافية.
- وصف هذا الدواء لك بشكل خاص، خار من إعانته لأي شخص آخر لأنه قد يضره حتى لو كانت أعراضه المرضية شبيهة بآعراضك.
- إذا بدأت أية تأثيرات جانبية، بما فيها أية تأثيرات جانبية محتملة لم ترد في هذه النشرة، اتصل بالطبيب أو الصيدلاني أو الممرضة، راجع الفقرة 4.

مضمون هذه النشرة:

1. التعريف بمجموم إيلوكوم ودوعي استعماله
2. المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل استخدام إيلوكوم
3. كيفية استخدام إيلوكوم
4. التأثيرات الجانبية المحتملة
5. كيفية حفظ إيلوكوم
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية

2. التعريف بمجموم إيلوكوم ودوعي استعماله

ينتني مجموم إيلوكوم بالمفهوم الدوائية المروفة باسم الكورتيكosterويدات الموضعية، ويصنف من بين "الكورتيكosterويدات الفوئيد".

هي أدوية تؤخذ على الشفاعة للتخفيف من عدة الامور والحكمة الشائعة عن بعض الاضطرابات الجلدية لدى البالغين والأطفال، يستعمل مجموم إيلوكوم للتخفيف من الاحمرار والحكمة الشائعة عن بعض الاضطرابات الجلدية المروفة باسم الصدف أو الالتهاب الجلدي.

الصدف كثيرة عن مرض جلدي يودي إلى بروز بقع متفرقة وردية اللون تنتسب بالحكمة في منطقة المرقق والركبة وفروة الرأس ومناطق أخرى من الجسم.

أما الالتهاب الجلدي فهو كثيرة عن حالة مرضية ينتسبها تفاعل البشرة مع عوامل خارجية مثل مواد التنظيف، ما يودي إلى احمرار البشرة والحكمة.

لا تستخدم إيلوكوم:

إذا كانت لديك:

- حساسية (فرط التحسس) من مادة الموميمازون فوروات أو أي مكون آخر من مكونات هذا الدواء (المدرجة في الفقرة 6) أو من الأدوية الشبيهة به.
- علاج أي اضطراب جلدي آخر، فمن المفضل أن يزدليها سواء، ومنها على وجه الخصوص:

- العد الوردي (مرض جلدي يصيب الوجه)

- حب الشباب

- ضمور الجلد (ترقق البشرة)

- التهاب الجلد من حول الفم

- حكة في الأعضاء التناسلية

- طفح الحمام

- قرور البرد

- جرثي الماء

- البروس الناتج

- التاليل

- تقرح العين

- الجروح

- غيرها من أنواع العدوى الجلدية.

أمثل الطبيب أو الصيدلاني إن كنت غير متأكد.

المخادر والاحتياطات

اصل بالطبيب إذا إزداد سوء الصدفية لديك، أو إذا ظهرت داء متمثلة بالصدفية تحت الجلد.

اصل بالطبيب فوراً إذا ظهرت عدوى وضوح الرؤية أو الاضطرابات البصرية الأخرى.

في حال أصبت بشرتك بالتهاب أو التحسس بعد استخدام إيلوكوم، سيكون علىك التوقف عن استخدام إيلوكوم وتبليغ الطبيب بالأمر.

يجب أن تخبر طبيبك في حال حدوث التهاب في الجلد أثناء استخدام إيلوكوم.

الأعراض الجانبية التي قد تحدث مع الكورتيكosterويدات المستخدمة أو طرق الفم، قد تحدث أيضاً من عدوى وضوح الرؤية أو الاضطرابات البصرية الأخرى.

إذا كنت تستخدم إيلوكوم قد تؤدي التغيرات في متغيرات المرونة، يمكن أن يؤثر هذا على مستويات بعض الهرمونات في الجسم، ولا سيما العرض والأطفال.

في حالات نادرة عند الأطفال قد تؤدي التغيرات في متغيرات المرونة، إلى تورم أو انتفاخ الوجه والصنف، والعنق، والدوخة عند الوقف أو الجلوس.

يجب امتناع عن التدخين أو الاقتراب من التبغان المكشوفة - خطر الإصابة بحروق بالجة، فالماض (الملابس، وبليسيات السرير، والمسدسات، الخ) يحترق سهلة أكثر بعد اتصاله بهذا المستحضر، ويتشتبب بشدة بخطر الحرائق، يمكن

غسل الملابس والبليسيات إن يحترق من تراكم المستحضر ولكنه لا يزيله بالكامل.

الأطفال

إذا تم استخدام أكثر من الكمية الصحيحة من المجموم أو تم استخدامها لفترة أطول من اللازم، فإن هذا قد يؤثر على الهرمونات للطفل. قد يودي هذا إلى:

- تأثر النمو والتطور

- تورم أو انتفاخ الوجه

إيلوكوم مع أدوية أخرى

* أخرين طبيبك أو الصيدلاني إن كنت تستعمل أو استعملت مؤخراً أو يحتمل أن تستعمل أي دواء آخر.

الحمل والرضاة الطبيعية والخصوصية

في حال كنت حاملاً أو مريضاً أو تعانين أنك حامل أو تتوازن الاتجاه، سيكون عليك استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل البدء باستخدام هذا الدواء.

مرهم إيلوكوم يحتوي على مادة البروبيلين جليكول ستيرات التي تتسبب أحياً بتهيج البشرة.

3. كيفية استخدام إيلوكوم

فيتة دوماً بتعليمات الطبيب أو الصيدلاني عند استخدام إيلوكوم. تحقق من الأمر مع طبيبك أو الصيدلاني إن كنت غير متأكد.

استخدام إيلوكوم مع الأطفال

لا يوصى باستخدام إيلوكوم مع الأطفال دون عمر السنين.

الجرعة

مع البالغين والأطفال فوق عمر السنين، يجب دهن طبقة رقيقة من مجموم إيلوكوم وتدليكها برفق على المنطقة المصابة من البشرة، مرة واحدة في اليوم.

قبل استخدام إيلوكوم:

عليك التقيد دوماً بالتعليمات التالية عند استخدام إيلوكوم:

- لا تستخدم المجموم على وجهك لأكثر من 5 أيام على التوالي.
- لا تدفن المجموم على بشرة الأطفال في أي منطقة كانت من شبمة جسمهم لأكثر من 5 أيام.
- لا تدفن المجموم تحت خفاض الطفل، فذلك يسهل امتصاص المادة العالقة داخل البشرة، مما يتسبب ببعض التأثيرات غير المرغوبة.
- ينصح أن تراجع الطبيب قبل تطبيق المانطاخة العالقة بمنطقة العلاج، خاصةً أو قصبة، لأنها تعيق تغطية المنطقة المعالجة من الوجه أو للأطفال بضمانة أو لصقة.
- لا ينصح استعمال كمية كبيرة من المجموم على مناطق كبيرة من الجسم ولفترات مطولة (مثلًا كل يوم على مدى عدة أسابيع أو أشهر).
- لا ينصح استعمال المجموم داخل العين أو حولها، بما في ذلك جفن العين.

في حال تسببت جرعة زائدة من إيلوكوم

إذا كنت أنت (أي شخص آخر) بابتلاع المجموم عن طريق الخطأ، من غير المتوقع أن يتسبب لك بأية مشكل، ولكن إن سارتك القلق سينبغي عليك الاتصال بالطبيب.

إذا استخدمت هذا المجموم لفترة تزيد عن الفترة الالزامية، أو على مناطق مختلفة من الجسم، من المفضل أن يزدلي لك على بعض الهرمونات في جسمك.

لدى الأطفال، ذلك قد يؤثر على نموهم.

ان لم تستخدم المجموم حسب التعليمات أو استعملته أكثر من اللازم وألأنتها لفترة طويلة، عليك إبلاغ الطبيب بالأمر.

في حال تسببت جرعة زائدة من إيلوكوم

إذا توقفت عن استخدام إيلوكوم، قم باستخدامه فور تذكره ومن ثم استأنف برنامج العلاج الاعتيادي.

في حال توقفت عن استخدام إيلوكوم، تدريجياً من تيرة المجموم تدريجياً ووقف العلاج تدريجياً.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل سائر الأدوية، يمكن لمرهم إيلوكوم أن يتسبب ببعض التأثيرات الجانبية، مع العلم أنها لا تسبب الجمجم.

قد ينبع بعض الآثار الجانبية الأخرى من استخدام إيلوكوم بعد استعماله.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-