بريمولوت® نور ٥ ميليغرام

أقراص

المادة الفعالة: نورثيسثيرون أسيتات

نشرة العبوة: معلومات مستخدم الدواء

إن هذا الدواء
- مستخدم طبي يؤثر على صحتك و استعماله خاص لعلاجك بعرضك للخطر.
- اتبع بدقة استشارة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها بالملصق الصيدلاني الذي مع شراء ذلك الدواء
- تفادي الاستخدام هذا الدواء بدون استشارة طبيبك وتجنب ومضيه
- لا تقطع العلاج قبل المدة المقررة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف هذا الدواء بدون استشارة الطبيب.

محافظ وزارة الصحة العرب
لقد أشرنا لكتاب العرب

احفظ الدواء بعيدا عن متناول أيدي الأطفال

اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.
- احفظ بهذه النشرة في الخاص وقرئها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أية أسئلة إضافية فاسأل طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء تم وصفه لك لا تعطيه لأخرين إن يمكن أن يسبب الضرر لهم. حتى لو كان لديهم نفس الأعراض التي لديك.
- إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية شديدة أو إذا عانيت أي آثار جانبية غير مبوبة في هذه النشرة الرجاء اعطار طبيبك أو الصيدلي.

ما هو بريمولوت نور ٥ ميليغرام و فيما يستخدم

قبل أن تتناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام

كيفية تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام

الآثار الجانبية المحتملة

حفظ بريمولوت نور ٥ ميليغرام

معلومات إضافية

١ – ما هو بريمولوت نور ٥ ميليغرام و فيما يستخدم

بريمولوت نور ٥ ميليغرام هو ما يسمى بريمولوتين. مستخدم بعض تحفيني الذي لديه مصنّعين مشتركة مع هرمون أنثوي طبيعي. هو بريمولوتين بريمولوت نور ٥ ميليغرام لديه أيضاً أثر أندروجيني (ذكري) منخفض (أندروجين هو مصطلح عام للهرمونات الجنسية الذكرية)

دواعي الاستخدام:

نزف رحمي غائلة بالفتل الوظيفي

٢ – قبل ان تتناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام

لا تتناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام في الحالات الآتية إذا لاحظت أحد من عوامل الخطورة هذه أنك تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام يجب التوقف فوراً من تناول الدواء

لا تتناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام:

- إذا كنت تعاني من أمراض الكبد الحادة أو أمراض الكبد الخفيفة. بريمولوتين أصبحت. لأو لأحد التركيبات الأخرى لبريمولوت نور ٥ ميليغرام
- في حالة حمل حمل سليم أو مصطرب.
- في حالة نزف غير مشخص من الثدي
- في حالة النزف من الهيئل غير معلوم السبب.
- إذا كان لديك أمراض تصخمية عادية وبينه نشطة الغير وضع الأوعية المدوية بينه جلطة دموية مثل خثار وبنى جميع في أعضاء مختلفة.
- إذا كان لديك في الماضي أو الآن أمراض قلبية وعائية الدماغ القلب. صدمة. مرض إقفادي (نقاب)
- مع الدم السكري (السكري) مصحوباً بتغيرات في الأوعية الدموية.
- إذا كان لديك في الماضي أو الآن خثار سطحي شديد لكتلة أصابات أصابات الإثاقة مثل خلاياه بوبين-جونسن (خلل استطالات الليبيون) و خلايه وبنه أوبرفان متقرئ! ما دامت فيم الكتب تم نفسه لتطبيقها.
- إذا كان لديك يرفان أوبرفان متعلق بالركبه الصرفاوي!
- إذا كان لديك في الماضي أو الآن أورام بالكبد أحميدة أو خبيثة!
- إذا كنت لديك في الماضي يرفان سكة مستديرة و أو طفح فقاعي أهيس (هرپس) خلال حمل سابق
- إذا كان خثار لديك في الماضي عقم أو اشتباه لوجود أورام مبيتة تعتمد على الهيبوتات أفتسية مثل سرطان الثدي

اتخذي عناية خاصة مع بريمولوت نور ٥ ميليغرام:

رحم أحظار طبيبك إذا كنت تعاني من أي من الحالات الآتية أو إذا حدثت أثناء تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام

أنك تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام سوف يؤثر بنتوي الطبيب الشام تحليل فردي للمخاطر / الفوائد قبل بداية التناول أو استمرار تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام

- بريمولوت نور ٥ ميليغرام و اقناز (افقيط)
- تام على تناول المراسات الخاصة أو استنتاج أن تناول منتجات الإثاثة التي تحتوي على استروجين و بريمجستوجين عن طريق الفم يسبب أخطار تصخمية عادية الغير وضع الأوعية الدموية بسبب جلطة دموية! بناء على تلك يجب الأخذ في الاعتبار احتمال زيادة مخاطرة التصخم اقتناي. عامة إذا كان لديك في تاريخك الرجلي مرض تصخم عنايي.

الحالات الخاصة للمخاطرة الغرض. بها لتلصخم اقتناي الجيوماوا(VTE) هي

- الأخذ بعين الحسبان أو تاريخ طبي عائلي لحدوث تلك الأمراض التصخم عنايي ويحدثا(VTE) في الأقارب أو الأخوة الأقرب من عمر مبكر نسبياً!
- مع تقدم العمر!
- السمنة (سمنة!)
- إذا كان لديك من عدم التركة حركة كبرى أو إصابات عصبية

يجب أيضاً تأكد أنهما سوف يؤثر على بريمولوت نور ٥ ميليغرام الظهر أثر أندروجيني (ذكري) منخفض في مراسات على الفيوتات. مع هو ذلك يحدث (كلينيكياً أصبرياً) فقط في حالات نادرة جداً. عند تناول المتصخم كما هو موضح به مع ذلك هناك بعض أصبرياً حساسية لتصخمات أندروجينية الحساسية لتصخمات أندروجينية تظهر في حالات أنثوية لذلك يجب توخيه لذلك. لا يمكن استبعاد أنه يمكن تواجد حالات منفردة للاصرابيل (الذكورة) الطفيف.

هذا يتطلب إرجاء علي متعاطوة الاستروجل (الذكورة) للأمة الوثائق بدءاً بتنمية الصبية حاملة أثناء العلاج

قبل البدء في تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام يجب التأكد من أنك لست حاملاً أثناء الخطوات الجينية للتشوه!

- الرتابع مؤشرا عن صوت حالة عزيمة كاستروجل (الذكورة) الأهداف التناسلية الفرامية لإبقاء حدوث الوظة عند تناول بريمولوتين بمرحلة عاملة لقدرات طبيعة للتحفاظ على الفعل لم تومه على الأل لم تقارب أنهما الآثار مخاصة للتوسيعين الخاصة عن ذلك لا يمكن استبعادها تماماً التشوهات الجينية للتشوه! مستحيل تماماً.

في حالة حدوث أي من هذه الأعراض الجانبية الخطيرة أو إذا كنت أصبحت مصاباً بأحد هذه الأمراض أثناء تناول بريمولوتين نور ٥ ميليغرام يجب التوقف فوراً من تناول المتصخم بعد الأخذ في الاعتبار بعناية كل الخطر الضريبة للتنمية لدوبن المتصخم

- معلومات أخرى

يمكن حدوث أصبرا خلع حالة وضعية أكلنا. عامة لدو التصبيت الثاني كل لديهن هذا النوع من نوع الصناع مثل. عند حدوث الخلف الفعل الصبيات الثاني لديهن عند ذلك يجب عليهن قلت التعرض للشمس أو الأشعة فوق بنفسجية بعناية بتناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام

الرحم الثاني لديهن الكتف في ناوبهن الفعل بحضور ترافية فريبة توقفي من تناول الدواء مع حالة الهوة الشديدة للاعتبار

رماد ملاحظة.

العلاج بريمولوت نور ٥ ميليغرام لديه لديه أثر مانع للحمل لمستخدم طريقة غير هرمونية إذا كنت ترغبين منع الحمل اتبع الإرشادات الموجودة للوثائق كاملاً أيضاً معهدة بطريقة كيوت-أوميبه و طريقة درجات الفرارة كاملاً! إذا كنت ليس لديك نزف استحقاقي في فترات منتظمة تقريباً ٢٨ يوم يبدأ بعد تناول هذا النظام من العلاج (أقطر أقماري) و على الرغم من التدابير المتخذة للحمل يمكن أن يكون هناك حمل لا تستمري في العلاج. قبل إجراء فحص للتشخيص الطبي.

أحظري طبيبك. إذا كان لديك أمراض السكري (السكري) لأن هذا الدواء يمكن يتطلب مراقبة عدية في بعض حدوث التصخم من أو بريمولوتين أصبرات بعد استقامة أصبرات حرارية لإبتلال احتياجات حيث أن الآثار الجانبية لبريمولوتين بريمولوتين بريمولوتين و الأثر الوضع في الزئبق الإكليكية (أصبرية) أو بعد التنقلة التي تحتوي خواص استقامة أو تأثير أو تغيير في التوصيات الموجودة لتناوله.

أقطاب الوضوعة بأشكل نشرت من تتحدى عادة حدوث عادة بينما بدء تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام. رماد من طبيبك. هذا مطلوب أيضاً إذا كانت أحد هذه المعلم أيها عائلة. أو في وقت في الماضي.

فقط تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام بعد تقييم حذر للمخاطر – الفوائد في حالة

- الثهاب الخثار القلبي الثهاب فقدان الوزن مصحوبا بتكون جلطة دموية في هذه المنطقة!
- كان لديك في الماضي شكل من أشكال انقطاع الدورة الشهرية أمراض الانصمام الخثاري مثل خثار وريدي عميق
- يجب عن تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام في حالة
- الوبقان الثهاب الكبد أو الحكة على الجسم بالكتلة!
- زيادة في نوبات الصرع
- زيادة حاد في ضغط الدم!
- الصداع
- إذا كان يتم ملاحظة من ضيف الفرز الفيسي و ليس لديك نزف استحقاني في فترات منتظمة بكل ٢٨ يوم تقريباً !

مستحيل تناول العلاج من قبل طبيبك على نتائج بعد التشخيص التفريقي الطبي. "رماد الملاحظة" بأمرين!

تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام مع أدوية أخرى

رماد أخطار طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناولين / تستخدمين أو تتناولين / استخدمتين حديثاً أو أدوية أخرى. على النحو نصوح بعد تكاوية عقد.

كمنت الأدوية الفاتح تناولها العلاج الحمل السكري (السكري) يمكن أن تنفير.

بعض الأدوية يمكن أن تقلل فاعلية بريمولوت نور ٥ ميليغرام هذه الأدوية تشمل الأدوية التي تسرع من امتطاف بريمولوت نور ٥ ميليغرام مثل الأدوية التي تعالج الصرع مثل فينتوين بريمجنول. بريمجنول. كاربامازيبين وكلكساريتون و الدين (مثل بيشيتسين. بيشيتسين) أو مضادة حيوية مثل الريفامبين أو مشتقات طبية عشبية التي تحتوي عشبة سان جون (Hypericum perforatum) (اسم تناولها أسماء أخطار الإكتشاف)

بريمولوت نور ٥ ميليغرام يمكن أيضاً أن يسبب خلل في امتطاف مستحضرات دوائية أخرى

لا تتناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام مع أدوية تحتوي على

ملاحظة. راهني أيضاً نشرة عبوة العلاج الخاصة لتحديد احتمال حدوث أي تداخلات.

- الإختبارات المعملية

تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام يمكن أن يؤثر في نتائج بعض الإختبارات المعملية

فترة الحمل والإرضاع من الثدي

لا تتناولي بريمولوت نور ٥ ميليغرام خلال فترة الحمل أو بينما بدء الإرضاع من الثدي

أخبري عن طبيبك أو الصيدلي المتصخم قبل تناول أي دواء

القدرة على قيادة السيارة أو تشغيل الماكينات.

لا توجد ضرورة لأي تدابير احترازية خاصة

معلومات هامة عن بعض مكونات بريمولوت نور ٥ ميليغرام

هذا المستحضر الطبي يحتوي على لاكتيز. لهذا السبب. رماد تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام فقط بعد استشارة طبيبك إذا كنت تعاني انت تعاني من عدم التحمل لبعض السكريات.

٣ – كيفية تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام

تناولي دائماً بريمولوت نور ٥ ميليغرام تماماً وفقاً لتعليمات طبيبك. يجب عليك مراجعة طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكدة

الجرعة المعتادة هي:

- نزف بدء بالفتل الوظيفي

تناولي ١ قرص من بريمولوت نور ٥ ميليغرام لثلاثة مرات يومياً لمدة ١٠ أيام. يسهل بتوقف النزف من الهيئل خلال ٢ – ٣ أيام. في معظم الحالات لا يتم الحاجة لأكثر من ٥ أيام. لحسب أصبرات. تحتاج إلى العلاج. بعد مع ذلك تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام خلال فترة ٢٨ – ١٠ أيام بالتكامل. سوف يحدث نزف انسحابي تشبيري بعد ٢ – ٤ أيام من نهاية العلاج و هو مشابه للحيض الطبيعي من حيث شدة النزف و مدته

نزف قبلي يحدث يتم تناول الأقراص

قد يحدث أحياناً نزف أقل بعد بدء تناول النزف من الهيئل. في هذه الحالة يجب أن تتوقفي في الإعتبار أن يكون السبب أو العامل مصحوبي الذي هو غير مرتبط مع هذه حالة. بالاضافة التناسلية (مثل سلاق سرطان لعنق

في حالة نزف انسحابي شديد

إذا لم يتوقف النزف الهيئلي برغم تناولك للأقراص بشكل صحيح كما هو موضح. يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن يكون السبب أو العامل مصحوبي الذي هو غير مرتبط مع هذه حالة. بالاضافة التناسلية (مثل سلاق سرطان لعنق

الرحم أو سرطان لبطانة الرحم. ورم خبيثي أورم حميد ثلاثياته الحمليلة) بناءً إيهقاس تلقائي حمل بطني أو انتقال خارجي) قبل يمكنك إتخاذ تدابير أخرى لعقلهم اقلاث. هذه نقطة يتطبق أيضاً في حالة نزف الرحم الشديد نسبياً بعد أن تؤخذ في الأول

طريقة التناول:

يجب أن تتناول الأقراص صحيحة – سليمة أخبر مفصولة أو مكسورة! لا تحطم الأقراص! مع كمية كافية من سائل (مفضل مع كوب ماء للشرب)

إذا كان لديك انطباع أن اثر بريمولوت نور ٥ ميليغرام شديد جداً أو ضعيف جداً. أخبري طبيبك.

إذا تناولتي بريمولوت نور ٥ ميليغرام أكثر مما يجب:

الرئيسات الأنسية الفقيرة بالحديد الفقيرة في تناول الدواء أو عرضتها بالبريمولوتين أصبحات. لم تظهر أي مخاطرة لآثار ضارة غير مرغوبة في حالة تناول غير مقصود للجرعة الفائضة.

لا يوجد تدابير خاصة يوصى بها في حالة الجرعة الزائدة بخلاف الجرعة. من تناول المتصخم أو تخفيض الجرعة. في مجموع سبع حبوب. عند عندما يتناول الطبيب أو الأم يكن دائما أبلاغ عاملة بينه.

إذا كان لديك أي أسئلة إضافية على تناول هذا المتصخم اسأل طبيبك أو الصيدلي

٤ – الآثار الجانبية المحتملة

مثل كل الأدوية بريمولوت نور ٥ ميليغرام يمكن أن يسبب آثار جانبية. بالرغم من انها لا تحدث مع كل شخص. يستحسن معدل الفوري الأدنى لتنفيذ تكرار الآثار الجانبية

شائع جداً	أكثر من ١٠ مرضى تعافتي			
شائع	أقل من ١ في ١٠ لكن أكثر من ١ في ١٠٠ مريضة تعالج			
غير شائع	أقل من ١ في ١٠٠ لكن أكثر من ١ في ١٠٠٠ مريضة تعالج			
نادر	أقل من ١ في ١٠٠٠ لكن أكثر من ١ في ١٠٠٠٠ مريضة تعالج			
نادر جداً	أقل من ١ في ١٠٠٠٠ مريضة تعالج أو غير متعرف عليهن			

تفاعلات غير ملائمة محتملة

التفاعلات الغير ملائمة تذكر أكثر في الشهور الأولى لتناول مستحضرات بريمولوت و نصح أقل تكراراً خلال سير العلاج

صفة للتفاعلات الغير ملائمة المذكورة هي في هذا الوبر المتصخم مثل بريمولوت نور ٥ ميليغرام. كانت هناك تقارير أخرى تذكر غير مرتبط بين متناولين مستحضرات بريمولوت نور ٥ أو لا يمكن دائما أبلاغ عاملة بينه.

التفاعلات الغير ملائمة مبوبة في الجدول الآتي وفق MedDRA (مفهوم التصنيف الهيوميات (MedDRA SOCs) اسامي معدلات الفيوض في النبضات من الرصد بعد الترميم و من البيانات المنشورة

الفيوض الجهوية	شائع	غير شائع	نادر	نادر جداً
اضطرابات الجهاز المناعي			تفاعلات التأقية الزائدة (فرط الحساسية)	
اضطرابات الجهاز العصبي	صداع	شقيقة		
اضطرابات العين				اضطرابات الإبصار
اضطرابات التنفس الصدر وأعضاء الصدر سدرية و منصفية			قصر النفس مع ضائقة تنفسية (ضيق النفس)	
اضطرابات الجهاز الهضمي الغثيان	غثيان			
اضطرابات الجلد و الأنسجة الجلدية			شري (إرتيكاريا) طفح	
اضطرابات عامة و مالك مكان الإعطاء	احتباس السوائل في الأنسجة (وذمة)			

يصف المتصخم هذه الحالات الغير ملائمة الرافعات و اقناث بات الصلة هي الوصف الأكثر ملائمة ضمن مجموعة المصطلحات المميه له MedDRA

من المتوقع حدوث نزف من الهيئل بقدرة متنوعة

غير شائع نزف مرئي قبل الفيض امثل نزف الدمي) حيض مؤلم (عسر الطمث) نزف في الدمي (الم الدمي) الكتلة. نعب و بيانة الثدي

مع خلاف ملاحات الاستروجل (الذكورة) الحلق الغم – حب الشباب) في حالات معرفاتي يكن حدوث تغيرات تتعلق بالتصخم لدى بعض بحساسية ضائعة لتفاعلات استروجينية (ذكورية) و عموماً في الصبيات في مهنة الفتاة أو الفتاة يجب مراعاة الوثوق التوقف عن العلاج أو عدم التوقف عند أول علامات نفير الصبية (نعب قبلي للصوت. عشبة الصوت. بيانة الثدي) و في الجبهة.

في حالات نادر يمكن إمتثال خثار (فيوض) يمكن أن يحدث تغيرات لوظيفة الكبد. ركود صفراوي مع أو بدون يرقان (ركود صفراوي مع أو بدون يرقان) زيادة في عوامل التجلط و في حالة الدم

بكل أيضاً أو خثار قلبي تغيرات في مختلف قياسات (كلينيكية أصبرية) – كيمياوية في الدم الآتي ليس لديهن مع ذلك أو أهمية بالتوصية مباشرة.

يمكن أن يحدث تغيرات غير مرغوبة لمستويات الشحم في الدم عند تناول صبرات أخرى ٥ ميليغرام و أكثر!

بالاضافة في حين حدوث الحد من تناول مركبات استروجين / بريمجستوجين و مع حين الأصبرام الفقرات مثل الثهاب الغرض الفقرة مثل جلطة دموية الثهاب الغرض الفقرة الصبرام الذي يتعلق جلطة دموية في المعلج (خثار مخاصي) و تكون جلطة دموية (خثار)

مع أو بدون بريمولوت نور ٥ ميليغرام لا يحتوي أو استروجين. بما لديهن الثهاب تعافين بريمجستوجين بغيره يسبب أيضاً مشاهدين. بالمكان كتمت وظيفي.

مع ذلك بريمولوت نور ٥ ميليغرام لا يحتوي أو استروجين. بما لديهن الثهاب تعافين بريمجستوجين بغيره يسبب أيضاً مشاهدين. بالمكان كتمت وظيفي.

مع ذلك بريمولوت نور ٥ ميليغرام لا يحتوي أو استروجين. بما لديهن الثهاب تعافين بريمجستوجين بغيره يسبب أيضاً مشاهدين. بالمكان كتمت وظيفي.

في حالات نادرة مشيرة الذي فيها أمراض الانصمام الخثاري مثل خثار وريدي عميق كان مرتبط مع تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام بنا على ذلك يجب أن يشمل تقييم العلاج لهذا المتصخم احتمال زيادة مخاطرة الخثار.

عقبة لا توجد أمراض الانصمام الخثاري في التاريخ الطبي

أيضاً في حالات نادرة لا ملاحظة عقب تناول الهيوميات. الكتم على الثقة الفعالة لبريولوت نور ٥ ميليغرام لحظة تنبيه بتغيرات كمية جيدة في حين أقل تكرارا كثيرة كمية جيدة. الى في حالات منفردة تسببت لنزف داخل التجويف البطني مهلة للحيلة لهذا السبب. يتحدث جيداً بالمتعلق طبيبك. إذا حثيت عن شكوكي غير مخافة في منطقة الشرسوفي (فوق المعدة) الكتم لا تخفض فجوة بعد عدة قصيرة.

لهذه الأسباب توقفي عن تناول بريمولوت نور ٥ ميليغرام انظري أخبري بعنوان "عناية خاصة مع بريمولوت نور ٥ ميليغرام"

إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية شديدة أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مبوبة في هذه النشرة الرجاء اعطار طبيبك أو الصيدلي.

٥ – حفظ بريمولوت نور ٥ ميليغرام

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي و نظر الأطفال.

لا يتم تناوله بعد تاريخ انتهاء المفعول الذي على الكرتونة الفارميه

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

٦ – معلومات إضافية

ماذا يحتوي بريمولوت نور ٥ ميليغرام

المادة الفعالة هي نورثيسثيرون أسيتات.

١ قرص يحتوي على ٥ ميليغرام نورثيسثيرون أسيتات.

الكتلة الأخرى هي

لاكتيز مشبع الذرة بيلفيدون ٢٥٠٠٠ نقلة و سيلات المغنيسيوم

ما هو مظهر بريمولوت نور ٥ ميليغرام و ما هي محتويات العبوة:

بريمولوت نور ٥ ميليغرام أقراص مفتوحة هي عبوات شرائط مصنوعة من رقائق كلوريد الفيلي فينايل الشفافة و طبقة رقيقة من الألومنيوم

أقراص لاكتيز من طريق الفم

- ١٢ قرص
- ٢٤ قرص
- ٥٠ قرص
- ٥٠٠ قرص

المصنع:

شيرج م.م.و.ب أنتل أند كو بريكشن كي جي

دي – ٩٤٢٧٦ – فاير أنقيبة

الجزء المشركة.

ملر فايما إيه جي

دي – ١٣٤٢١ – برلين ألمانيا

تم أخر تحديث لهذه النشرة في أكتوبر ٢٠٠٧

مراجع خاصة

يمكن الفتر على معلومات مفصلة إضافية بمناجها الطبيب. في منشورات خاصة تخص هذا المتصخم.

ONE 80260882