

جنتيل^(٤) جل

كربومر 0.22% (INN) وهيبروميلوز 0.3% (INN)

الشكل الصيدلاني
جل معقم للعين

المكونات

يحتوي 1 جرام من الجِل على:
كربومر 980 2.2 مجم، هيبروميلوز 3 مجم.
مادة حافظة: صوديوم بربورات تتراهيدرات 0.28 مجم (مادة حافظة تختفي بشكل فريد)
السواغ: كمية كافية

الخواص الدوائية

جنتيل^٤ جل هو جل للعين طويل المفعول لترطيب وتزليق سطح العين لجميع المرضى الذين لديهم غناء في العين بسبب حالات جفاف في العين. يحتوي هذا المستحضر على مادة حافظة تختفي بشكل فريد، هي صوديوم بربورات. ينحل صوديوم بربورات بالماء، وهو أحد المكونات في تركيبة جنتيل^٤ جل، معطياً كميات ضئيلة للغاية من بيروكسيد الهيدروجين، الذي يزاوّل مفعولاً مضاداً للجراثيم. النظام الدائري الفريد المضاد للجراثيم يمنع تلوث الزجاجاة المفتوحة مع تجنب تفاعلات الحساسية المفرطة المتعلقة بالمادة الحافظة. بمجرد تقطيره في العين، ينحل بيروكسيد الهيدروجين بسرعة بالإنزيمات الموجودة في أنسجة العين معطياً ماء وأكسجين.

خواص الحرائك الدوائية

لم يتم إجراء دراسات.

الاستعمال المقصود

سائل بديل للدموع لتخفيف حالات جفاف العين، وكذلك لعلاج عدم ثبات طبقة الدموع.

تعليمات خاصة بالاستعمال

البالغون والمسنون: اغسل يديك. ضع نقطة واحدة في كل عين (تجنب ملامسة طرف العبوة للعين) وارمش عدة مرات.
يمكن استعمال جنتيل^٤ جل بواسطة مرتدي العدسات اللاصقة (الليثة أو الصلبة)، غير أنه يوصى بنزع العدسات قبل التقطير.

موانع الاستعمال

لا تستعمله إذا كانت لديك حساسية لأي من المكونات.

الاحتياطات

استشر طبيب العيون القائم على رعايتك قبل تغيير الدواء وقبل استعمال أي دواء للعين مع العدسات اللاصقة. لا تجعل طرف قطارة الأنبوبة يلامس إطلاقاً أي سطح بما في ذلك العين، حيث أن هذا قد يلوّث الجِل.
الأطفال: لم يتم إجراء دراسات في الأطفال.

التحذيرات

لا تستعمله إذا كان خاتم اكتشاف العبث على الأنبوبة تالفاً. إذا شعرت بعناء مستمر أو تهيجات توقف عن استعمال المستحضر واستشر طبيب العيون القائم على رعايتك. لا ينبغي استعمال جنتيل^٤ جل أثناء الجراحة.

الأثار على القدرة على القيادة أو تشغيل الآلات

أي مريض يشعر بغشاوة في الإبصار يجب أن يمتنع عن القيادة أو تشغيل الآلات.

الأعراض الجانبية

جنتيل^٤ جل قابل للتحمل بشكل جيد جداً بواسطة المستخدمين، ولكن توجد بعض التقارير عن حدوث حرقة ولسع، وحساسية، واحمرار العينين بعد التقطير. إذا لاحظت أي من هذه التفاعلات، أوقف الاستعمال واستشر طبيب العيون القائم على رعايتك.

التأثرات الدوائية

لم يتم إجراء دراسات على التآثرات الدوائية.

عدم التوافق

غير معروف.

تجاوز الجرعة

لم يتم الإبلاغ عن أي حالة لتجاوز الجرعة.

فترة الصلاحية واحتياطات خاصة بالتخزين

لا تستعمله لأكثر من شهر واحد بعد الفتح. يمكن تخزين الأنبوبة غير المفتوحة حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة بالعلامة "EXP". اغلق الأنبوية فوراً بعد الاستعمال.

احتياطات خاصة بالتخزين

انظر العبوة الخارجية.
يُحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

أحجام العبوات

أحجام العبوات مختصة بالبلد.

هذا دواء

– الدواء مستحضر يؤثر على صحتك ، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يُعرّضك للخطر.
– اتبع بدقة وصفة الطبيب ، وطريقة الاستعمال المنصوص عليها ، وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
– الطبيب والصيدلي هما الخياران بالدواء وينبغه وضرره .
– لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
– لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

تُحفظ الأدوية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدالة العرب

تاريخ آخر مراجعة للنشرة

نوفمبر 2002

الصانع

انظر العبوة الخارجية.

(م) = علامة تجارية مسجلة

نوفارتس فارما، شركة مساهمة، بازل، سويسرا