

Redoxon

01 14200 EFA
6.9002.15 12

Trade Mark

ROCHE

Vitamine C

Propriétés

Prophylaxie et traitement des déficits en vitamine C. Stimule le métabolisme intermédiaire et la respiration cellulaire. Action stimulante et tonifiante.

Indications principales

Scorbut. Etat général déficient. Cicatrisation trainante des plaies. Diathèses hémorragiques (par exemple gingivite). Diminution de la résistance aux infections. Fatigue printanière. Grossesse. Allaitement.

Posologie

Prophylaxie: 5–15 gouttes ou 1 comprimé à 200 mg par jour.

Traitement par voie buccale: 20–40 gouttes, 1 ou plusieurs comprimés à 200 ou 500 mg, ou 1 comprimé effervescent à 1 g par jour.

Traitement intensif des cas graves (scorbut déclaré, saturation en vitamine C lors d'infections aiguës – grippe, pneumonie – lors de plaies, de brûlures, de fractures et d'ulcère de la cornée): 1–2 comprimés effervescents par jour.

Traitement par voie parentérale: cas bénins, 100–200 mg s.c., i.m. ou i.v. par jour; cas graves, 1–2 ampoules à 500 mg i.m. ou i.v. ou 1 ou plusieurs ampoules à 1 g i.v. par jour ou plusieurs fois par semaine.

Mode d'emploi pour le flacon compte-gouttes

Le dosage se fait sans peine, grâce au compte-gouttes placé dans le col du flacon: Tenir le flacon *verticalement*, l'ouverture en bas. Si la solution ne s'écoule pas immédiatement, agiter légèrement le flacon, le tapoter ou le retourner plusieurs fois.

Les comprimés à croquer à 200 mg contiennent 0,5 g de sucre et les comprimés effervescents 1,6 g. Les gouttes ne renferment pas de sucre.

Présentation

Gouttes à 20% (200 mg par ml)	20 ml
Comprimés à croquer à 200 mg	20
Comprimés effervescents à 1 g	10
Ampoules de 5 ml à 500 mg	5
Ampoules de 5 ml à 1 g	5

Médicament: tenir hors de portée des enfants

Fabriqué en Suisse par

F. Hoffmann-La Roche SA, Bâle

Roche