

Comprimés anti-douleurs

Composition 250 mg de paracétamol, 150 mg de propyphénazone et 50 mg de caféine.

Propriétés, effets «Saridon» consiste en une combinaison de substances ayant un effet analgésique et antipyrrétique, auxquelles on a adjoint une faible dose de caféine. Cette combinaison permet un début d'action rapide, ainsi qu'une sédation de la douleur durant plusieurs heures.

Indications Douleurs: céphalées et douleurs dentaires, troubles de la menstruation, migraines, douleurs nerveuses, inflammatoires, post-opératoires et rhumatismales, affections fébriles (grippe, etc.).

Posologie et mode d'emploi *Prise isolée:* adultes: 1-2 comprimés; enfants d'âge scolaire: $\frac{1}{2}$ -1 comprimé.
En cas de besoin, la prise isolée peut être répétée trois fois au cours des 24 heures.
Prendre les comprimés avec beaucoup d'eau, ou bien un autre liquide.
Les analgésiques ne doivent pas être pris de façon continue et à fortes doses, sans avoir consulté un médecin.

Restrictions d'emploi Il ne faut pas prendre «Saridon» en cas de troubles sévères de la fonction hépatique ou rénale, lors de déficit congénital en glucose-6-phosphate déhydrogénase (symptôme: anémie hémolytique), porphyrie hépatique aiguë, ainsi qu'en cas d'allergie avérée envers les substances contenues dans «Saridon». Il faut exclure du traitement par «Saridon» les nourrissons ainsi que les enfants d'âge préscolaire. Il convient par ailleurs de rappeler le principe médical qui veut que l'on s'abstienne d'administrer des médicaments en début de grossesse, sauf nécessité impérieuse.

Effets indésirables «Saridon» est généralement bien toléré. Des réactions allergiques (éruptions cutanées, urticaire) ont été occasionnellement constatées après prise de «Saridon».

Interactions De même qu'avec toutes les médications destinées à combattre la douleur, il ne faut pas simultanément absorber d'alcool, étant donné que les réactions individuelles peuvent être imprévisibles.

Conservation Le médicament ne peut être utilisé que jusqu'à la date indiquée sur le récipient par EXP.

Présentation Comprimés 10, 250

Médicament: tenir hors de portée des enfants

Fabriqué en Suisse par

F. Hoffmann-La Roche SA, Bâle

