

PROCOMIL SPRAY

SPRAY AVEC EFFET RETARDATEUR POUR HOMMES

PROCOMIL SPRAY est incolore et non-toxique.

Composition p. 100 ml : Lidocaine base USP 10 g

Indications :

Anesthésie locale de la surface cutanée et de la membrane muqueuse. Grâce à sa tolérance excellente, il peut également être utilisé en cas d'éjaculation précoce.

Contre-indications, effets secondaires et indésirables :

Rien n'a été observé à ce jour, si l'on s'en tient à la prescription.

Mode d'emploi :

Sauf prescription contraire, appliquer 1 à 3 pulvérisations courtes de **PROCOMIL SPRAY** aux endroits respectifs selon l'intensité de l'effet désensibilisant désiré. L'effet se manifeste quelques minutes après l'application.

Précaution d'emploi :

Pour usage externe seulement! Ce produit ne doit pas être appliqué en cas d': hypersensibilité connue contre l'un des ingrédients.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS !

NE PAS UTILISER PRES D'UNE FLAMME!

CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET A L'ABRI DE LA LUMIERE DU SOLEIL!



WALTER RITTER GmbH + Co. KG
Germany / Alemania / Allemagne