

ميترولاغ

التركيب النوعي و الكلي

المادة الفعالة

ميترونيدازول ٢٥٠ غ

(ميترونيدازول بنزوات: ٤ غ)

السواغ

تيلوز، أفيسيل، غليسرين، توين ٨٠، إتانول، صوديوم سكارين، ميتيل باراين، بروبيل باراين، سوربيتول، نكهة الليمون، مياه غير معدنية.

الشكل الصيدلاني

معلق للشرب، قارورة سعة ١٠٠ مل

الزمرة الإستوائية

ضد الطفيليات - ضد الخمج

الخواص - طريقة العمل

إن ميترونيدازول دواء اصطناعي يعتبر علاجاً للإلتهابات الراجعة إلى البروتوزوا مثل: الأميبيا، جيارديا لامبليا، و تريكموناس فجايناليس. ولذا يوصى باستعماله لعلاج الإمعاء و أميبيا الكبد و أنواع التهابات الأحليل و الفرج الناشئة عن تريكموناس فجايناليس: و في الحالة الأخيرة يوصى به لعلاج المريض و الشريك في نفس الوقت.

إن ميترونيدازول فعال جداً كذلك في علاج البكتيريا التي لا تحتاج للأوكسيجين مثل فيزوبكتيريوم، كلوستريديوم، ومختلف أنواع نظائر البكتيريا، و على أي حال فليس له تأثير على البكتيريا التي تستطيع العيش في أكثر من بيئة و لذا فإن استعماله لا يؤثر على هذه المتعضيات التي توجد في جسم الإنسان.

إن حالات المقاومة ضد الميترونيدازول تكاد تكون نادرة و يتم امتصاصه بسرعة و بالكامل تقريباً من مجرى المعدة و الإمعاء. و يتم الوصول إلى أقصى درجات التركيز في الدم بعد حوالي أربع ساعات من تناوله. و يتم تمثيل حوالي نصف الجرعة بسرعة و استبعاد 50% منه بواسطة الكلى. يخترق الدواء الشيمة و يوجد في حليب الأم بكميات تتناسب مع تركيز مصل المُرْضعة.

الأثار الجانبية

قد تظهر اضطرابات معدية معوية بسيطة مثل الغثيان، التقيؤ و الإسهال، تشنجات في البطن، طعم معدني في الفم، وفقدان الشهية، ولكن تلك الآثار مؤقتة وتخف بسرعة. قد تقل الكريات الدموية البيضاء أثناء العلاج (و يوصى بالانتظام في مراقبة تركيبة الدم أثناء العلاج المطول). واستثنائياً إرتكاسات تحسسية: حكة، هب، شري (طفح جلدي شبيه بالطفح الناتج عن لسعة القراص)، حمى، خرب عصابي وعائي، صدمة إستهدافية، اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي و المحيطي، حالات إلتهاب البكرياس قابلة الإلتكاس.

إختلال في صيغة الدم وخاصة نقص غير عادي في مستوى الكريات البيض في الدم، واعتلالات عصبية محيطية (اضطراب في التمييز الحسي) قد تحدث مع الجرعات الكبيرة و / أو المعالجة الطويلة الأمد و تختفي تدريجياً مع وقف المعالجة.

إحتياطات الإستعمال

يجب تقادي تناول ميترونيدازول أثناء الرضاعة.

على المرضى الإمتناع طيلة فترة العلاج عن شرب الكحول الذي قد يسبب التقيؤ و المغص المعدي. لتقادي أية تدخلات دوائية محتملة و بالأخص مع الديسولفيرام، مضادات تخثر الدم عن طريق الفم (مثل الوارفارين)، الليثيوم، السيكلوسبورين، يجب بانتظام إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني عن كل دواء آخر قيد التناول.

موانع الإستعمال

عدم إنتظام تركيبة الدم.

إضطرابات الجهاز المركزي العصبي.

يمنع استعمال ميترونيدازول خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل. وخلال الأشهر اللاحقة يجب قصرتناول الدواء عن طريق الفم على الحالات التي يثبت أن استعمال الدواء محلياً فيها غير مناسب.

الإستطبابات

داء المشعرات.

أميبية الإمعاء و الكبد.

داء الجيارديات.

إلتهاب المعدة المتفرح الحاد.

الوقاية و معالجة الإلتهابات التي تسببها البكتيريا التي تستطيع العيش بدون أوكسيجين.

المعالجة الوقائية قبل و بعد جراحة النساء و جراحة المعدة و الإمعاء.

المقادير

داء الأميبيا:

الأطفال: ٣٠ إلى ٤٠ ملغ لكل وزن في اليوم، يعطى المقدار اليومي موزعاً على ٣ جرعات تؤخذ على الأفضل مع وجبات الطعام. مدة المعالجة هي عادة ٧ أيام متتالية.

داء الجيارديا:

للأطفال:

- من ٢ إلى ٥ سنوات: ٢٥٠ ملغ (١٠ مل) في اليوم.

- من ٥ إلى ١٠ سنوات: ٣٧٥ ملغ (١٥ مل) في اليوم.

- من ١٠ إلى ١٥ سنة: ٥٠٠ ملغ (٢٠ مل) في اليوم.

يعطى المقدار اليومي في جرعة أو جرعتين مع وجبات طعام على الأفضل لمدة ٥ أيام متتالية.

الإصابات الخمجية بجرثيم لا هوائية:

للأطفال: ٢٠ إلى ٣٠ ملغ لكل وزن في اليوم.

في جميع الأحوال يجب التقيد تماماً بوصفة الطبيب.

طريقة الإستعمال

يجب رج القارورة قبل كل استعمال.

حفظ الدواء

يجب عدم استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة الخارجية.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز ٢٥° بعيداً عن الضوء.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

Chaoul Pharmaceuticals

(CHA-PHA) S.A.L. - Lebanon

Under license from

Lagap Pharmaceuticals - Switzerland

 **CHAPHA**
PATIENT-CENTRIC SOLUTIONS