

MOTILAT[®]

Domperidone

*propriétés:

Motilat (Domperidone) à:

- Une action dopamino-bloquante périphérique.
- Une action antiémétique puissante.
- Il s'oppose au reflux des particules solides ou liquides dans le sens doudéno-oesophagien.
- Augmente la vitesse de vidange de l'estomac.
- Provoque un élargissement du pylore au moment de son ouverture maximale, sans perturber la motilité de ce sphincter.

* Indications:

Traitement symptomatique des nausées et vomissements, en particulier:

- Affections hépatodigestives.
- En Pédiatrie : régurgitations chroniques post-prandiales, vomissements satellites d'affections infectieuses, vomissements acétonémiques.
- Traitements des manifestations dyseptiques pouvant être liées à un trouble de la motricité digestive
- Nausées causées par la lévodopa ou la bromocriptine administrée pour le traitement de la maladie de Parkinson.
- Nausées et vomissements induits par radiothérapie.

* Posolaogie et Mode d'administration:

Motilat doit être pris 15 à 30 minutes avant les repas. Une dose supplémentaire tardive nocturne peut être nécessaire.

* Adultes:

- Symptômes dyspeptiques: 10 mg (1 comprimé ou 10 ml) 3 à 4 fois par jour. Si nécessaire, la dose peut être doublée
- Conditions aiguës et subaiguës. Tout particulièrement nausées et vomissements : 20 mg (2 comprimés ou 20 ml) 3 à 4 fois par Jour.

*** Enfants:**

- Symptômes dyspeptiques: 2.5 ml/10 kg du poids du corps. 3 fois par jour et si nécessaire avant le coucher
- Conditions aiguës et subaiguës. 5 ml/ 10 kg du poids du corps 3 fois par jour et si nécessaire avant le coucher.

*** Contre-Indications:**

- Hémorragie gastro-intestinale.
- Perforation digestive.
- Patients ayant présentés des dyskinésies.

*** Précautions d'Emploi:**

- Utiliser avec précaution chez les patients présentant une insuffisance hépatique.
- Grossesse et l'allaitement: Sous prescription médicale.

*** Interactions Médicamenteuses:**

- L'usage concomitant avec des médicaments anticholinergiques est à déconseiller.

*** Effets Indésirables:**

La plupart de ces effets disparaissent spontanément après:

- Le traitement ou sont aisément tolérés.
- Gynécomastie. Troubles menstruels.
- Crampes abdominales.
- Eruptions cutanées.

***Form et présentations:**

Comprimé (blanc) dosé 10mg de dompéridone: Boite de 30.
Suspension oral à 1 mg/ml: Flacon de 100ml. Modèles pour usage hospitalier disponibles.

Ceci est un Médicament

- Un médicament est un produit qui affecte la santé et sa consommation contraire aux indications peut être dangereuse pour votre santé.
- Suivre strictement la prescription médical et les instructions du pharmacien qui vous a vendu le médicament.
- Le médecin et le pharmacien connaissent le médicament , ses bienfaits et les risques.
- Ne pas interrompre le traitement prescrit sans avis médical.
- Ne pas reprendre le traitement sans avis médical.

Fabrique par industries *RAM PHARMA* ceutiques, P.O.Box 211, zone Industrielle, Sahab 11512 Jordan.