

Vous devez consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :
En l'absence d'amélioration au bout de 2 jours de traitement, en cas d'apparition de fièvre, de vomissement, en cas de présence de sang ou de glaire dans les selles, en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation c'est-à-dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce médicament est un complément des règles diététiques :

- **se réhydrater** par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres) ;
- **s'alimenter** le temps de la diarrhée,
 - en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou les boissons glacés,
 - en privilégiant les viandes grillées, le riz.

ULTRA-LEVURE® 50 mg étant constitué de cellules vivantes : ne pas le mélanger avec un liquide ou un aliment trop chaud (plus de 50°C), glacé ou alcoolisé.

En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ne pas associer ce médicament à un antifongique (médicament actif contre les champignons).
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose, lactose.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

Adultes et enfants de plus de 6 ans : 4 gélules par 24 heures en deux prises. Chez l'enfant de moins de 6 ans, du fait du risque de fausse route, il est recommandé de ne pas avaler les gélules mais de les ouvrir et d'en verser le contenu dans une boisson ou un aliment.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

La lyophilisation de la substance garantit la stabilité et la vitalité de *Saccharomyces boulardii*.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tous les médicaments, ULTRA-LEVURE® 50 mg, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

6. CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de l'humidité.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Octobre 2005.

BIOCODEX

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION

ULTRA-LEVURE® 50 mg, gélule

Saccharomyces boulardii

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

*Saccharomyces boulardii** 50,00 mg

* cellules de levure lyophilisées

Pour une gélule n°2 de 150 mg

Excipients : lactose monohydraté, stéarate de magnésium, saccharose.

Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane (E171), dioxyde de soufre.

FORME PHARMACEUTIQUE

Gélule. Flacons (verre) de 20 et 50 gélules.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTI-DIARRHEIQUE

Flora de substitution

(A : appareil digestif et métabolisme)

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 GENTILLY

France

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué, en complément de la réhydratation, dans le traitement symptomatique d'appoint de la diarrhée.

3. ATTENTION

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS être utilisé :

- En cas d'allergie connue à l'un de ses constituants,
- Chez les patients porteurs de cathéter veineux central.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrose-isomaltase (maladies métaboliques rares).

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Il est recommandé de ne pas ouvrir la gélule dans l'environnement de patients porteurs d'un cathéter veineux central, pour éviter toute colonisation, en particulier manipulée (apportée par les mains), du cathéter.

En effet, il a été rapporté chez des patients porteurs d'un cathéter veineux central, même non traités par *S. boulardii*, de très rares cas de fongémies (passage de la levure dans le sang) se traduisant le plus souvent par de la fièvre et des hémocultures positives à *Saccharomyces*.

ULTRA
LEVURE®

Saccharomyces boulardii

50
mg