

# Stresam®

CHLORHYDRATE D'ÉTIFOXINE

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

### Dénomination

STRESAM®, gélule

### Composition

Chlorhydrate d'étifoxine..... 50 mg

Excipients : lactose, talc, cellulose microcristalline, silice colloïdale, stéarate de magnésium

### Forme pharmaceutique

Boîte de 24 ou 60 gélules.

### Classe pharmaco-thérapeutique

ANXIOLYTIQUE.

### Nom et adresse du titulaire

BIOCODEX

7 avenue Gallieni - 94250 Gentilly - FRANCE

## DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé pour diminuer les diverses réactions émotionnelles et corporelles (boule dans la gorge, palpitations, sensation d'étouffement...) qui accompagnent l'anxiété.

## ATTENTION !

### Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- état de choc
- insuffisance hépatique sévère
- myasthénie
- insuffisance rénale sévère

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Mise en garde spéciale

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

### Précautions d'emploi

L'absorption simultanée de boissons alcoolisées est à déconseiller.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Interactions médicamenteuses et autres interactions

**AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.**

## Grossesse - Allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**

## Conducteurs et utilisateurs de machines

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence liés à ce médicament.

**Excipients à effet notoire** : lactose

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

### Posologie

La posologie est variable d'un sujet à l'autre. Elle ne dépend pas de la gravité des troubles mais des réactions de chacun. Seul le médecin peut la définir.

### Mode et voie d'administration

Voie orale.

Avaler les gélules avec un peu d'eau.

### Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

L'administration des gélules sera répartie au cours de la journée en 2 ou 3 prises.

### Durée du traitement

**DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN**

### Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas d'intoxication lors d'une absorption massive accidentelle de Stresam, il est nécessaire de prévenir d'urgence votre médecin.

### Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Dans ce cas, il n'est pas recommandé d'augmenter la dose suivante.

### Risque de syndrome de sevrage

L'arrêt du traitement n'entraîne pas de phénomène de sevrage (le sevrage est un état de privation ou de manque ressenti après l'arrêt de certains médicaments avec réapparition ou aggravation des troubles).

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- Légère somnolence, survenant en début de traitement, et disparaissant spontanément au cours de la poursuite de celui-ci.
- Eruptions cutanées rares, manifestations allergiques très rares à type d'urticaire ou d'œdème de Quincke.

**SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.**

## CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

**Date de révision de cette notice**: Janvier 2006.