

Locagel®

Diclofénac diéthylamine

Propriétés:

Locagel® est un anti-inflammatoire nonstéroïdien possédant une activité analgésique et anti-rhumatismale.

Appliqué localement, il produit un effet de confort et rafraîchissement.

Il pénètre dans la partie inflammée provoquant une réponse clinique caractérisée par une diminution de l'inflammation.

Locagel® réduit également la sensibilité et la douleur liées au mouvement.

Composition:

Diclofénac diéthylamine

Excipients: Cétomacrogol 1000, Carbomère 934 P, Diethanolamine, Alcool isopropylique, Propylène glycol, Lavande, Eau purifiée, Huile minérale, Caprylique/Caprique Triglycerides (Triglycerides Chaîne médiane).

Indications:

Locagel est indiqué dans le traitement local de :

- Maladies rhumatismales localisées, notamment, l'arthrose, les douleurs du dos, et des articulations périphériques.
- Lombagie.
- Formes rhumatismales localisées des tissus mous:

Bursite, ténosynovite, et le syndrome de l'épaule main.

- Inflammation des ligaments, tendons, muscles et articulations due à un traumatisme; comme les entorses, ecchymoses, et la pression imposée sur les muscles et articulation.

Posologie et mode d'administration:

Locagel® doit être appliqué 3 à 4 fois par jour, en massant délicatement sur les parties affectées.

Précautions:

- Il doit être appliqué uniquement sur une peau saine, éviter les plaies et tout contact avec les yeux et les muqueuses.
- En cas d'application sur zones étendues pendant une période prolongée des effets secondaires systémiques pourraient apparaître.
- Ne pas le prendre par voie orale.

Contre-indications:

- Hypersensibilité au Diclofénac, à l'acide salicylique, aux AINS, au propylène-glycol et à isopropanol.

Interactions médicamenteuses:

Aucune interaction médicamenteuses n'a été rapportée jusqu'à présent.

Effets secondaires:

- Prurit, érythème, rash et douleurs cuisantes.
- Réaction de photosensibilité ont été rapportées dans certains cas.

Présentations:

Locagel® gel: Tubes de 30g et 50g. Chaque gramme contient du Diclofénac Diéthylamine équivalent à 10 mg de Diclofénac Sodique.

Médicament autorisé n°. D/ 098/21 A 004/98.

(Ceci est médicaments maintenir hors de la portée des enfants)

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions, vous expose à un danger.
- respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi prescrit, ainsi que les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin, et votre pharmacien connaissent le médicament et ses contre-indications.
- Ne le reprenez pas sans l'avis de votre médecin.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite