

باي- بروفينيد®

١٥٠ مجم أقراص محززة



كيتوبروفين

برجاء قراءة النشرة كاملة بعناية قبل أن تبدأ في تناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تريد قراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، أو يساورك أي شك، فاسأل طبيبك أو الصيدلي لمزيد من المعلومات.

- تم وصف هذا الدواء لك، لا تعط العقار لأي شخص آخر، حتى إذا كان يعاني من نفس الأعراض التي تعاني أنت منها، فقد يضر بهم.
- إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو إذا لاحظت أية آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة، فيرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

محتويات هذه النشرة:

١. ما هو عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة؟ وفيه يُستخدم؟
٢. ما هي المعلومات التي عليك معرفتها قبل تناول عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة؟
٣. كيفية تناول عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة
٤. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
٥. كيفية تخزين عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة
٦. معلومات إضافية

١. ما هو عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة؟ وفيه يُستخدم؟

- التصنيف ضمن مجموعة العلاج الدوائي
- مضادة للالتهاب، مضاد للروماتيزم، غير ستيرويدي
- دواعي الاستعمال العلاجية
- يحتوي هذا الدواء على أدوية غير استرويدية مضادة للالتهاب: عقار باي بروفينيد. يُنصح به للبالغين (أكثر من ١٥ عاماً):
- في العلاج طويل الأمد:
- بعض حالات الروماتيزم الالتهابي المزمن.
- بعض حالات التهاب المفاصل الشديد.
- في العلاج قصير الأمد:
- بعض حالات التهاب المفاصل (التهاب الأوتار، التهاب الجراب، ألم حاد بالكتف).
- بعض حالات التهاب المفاصل عن طريق ترسب البورات، مثل: النقرس.
- الآلام الحاد لالتهاب المفاصل.
- الآلام الحادة أسفل الظهر.
- الآلام الحاد المصحوب بتهيج الأعصاب، مثل: عرق النسا.
- الآلام والوذمة المصاحبة للرُضخ.
- في علاج الصداع النصفي مع أو بدون هالة (الهالة: إحساس شخصي يسبق نوبة الصداع النصفي، يتغير بشكل كبير من شخص لآخر، ويؤثر على السمع والؤية وما إلى ذلك).

٢. ما هي المعلومات التي عليك معرفتها قبل تناول عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة؟ قائمة المعلومات التي من الضروري معرفتها قبل تناول الدواء إذا كان طبيبك قد أخبرك بأنك لا تتحمل بعض أنواع السكريات، فاتصل به قبل تناول هذا الدواء. مواقع الاستعمال

- لا تتناول عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة في الحالات التالية:
- بعد مرور ٥ شهور من الحمل (٢٤ أسبوعاً من انقطاع الطمث).
- الحساسية لعقار باي بروفينيد أو أي من مكونات المنتج،
- تاريخ مرضي من الربو الناجم عن استخدام هذا الدواء أو الأدوية ذات الصلة، لا سيما مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى والأسبرين
- النزيف الهضمي المتكرر، النزيف الدماغي المتكرر أو وجود نوع آخر من النزيف المستمر حالياً.

- قرحة بالمعدة أو الأمعاء.
- الأمراض الكبدية الشديدة.
- الأمراض الكلوية الشديدة.
- الأمراض اللفظية الشديدة.

في حالة الشك، من الضروري استشارة طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. احتياطات للاستخدام: تحذيرات خاصة: تَوَخَّ حذراً خاصاً مع عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة: تحذيرات خاصة:

- يجب ألا يتم تناول هذا الدواء إلا تحت الإشراف الطبي.
- قبل استخدام هذا الدواء، اتصل بطبيبك إذا كان لديك:
- تاريخ مرضي من الربو الذي يصاحبه التهاب أنف مزمن، أو التهاب الجيب المزمن أو أورام في الغشاء المخاطي الأنفي، قد يؤدي استخدام هذا العقار إلي ضيق بالتنفس أو نوبات ربو، وخاصة في بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (انظر لا تتناول عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة :
- اضطرابات الكلى، العلاج المضاد للتخثر أو العلاج المتزامن المضاد للتضائخ الدوائية: لأن هذا الدواء يمكن أن يسبب أحياناً خطورة بالجهاز الهضمي.
- تاريخ الجهاز الهضمي (قرح المعدة أو الإثنا عشر، التهاب القولون التقرحي، مرض كرون).
- تاريخ من الحساسية الجلدية عند تعرضها لأشعة الشمس أو الأشعة فوق بنفسجية.
- أمراض بالقلب، أو الكبد أو الكلى
- العلاج المدمر للبول أو الجراحات الحديثة
- أثناء العلاج، في حال وجود:

- علامات على الإصابة بعدوى، اتصل بطبيبك.
- علامات تدل على وجود حساسية تجاه هذا الدواء، لا سيما نوبات الربو أو الغثري أو تورم الوجه والعنق بشكل مفاجئ، فتوقف عن تناول العلاج واتصل فوراً بالطبيب أو خدمة الطوارئ الطبية.
- نزيف الجهاز الهضمي (خروج دم من الفم، وجود دم في البراز أو تغير لون البراز إلى اللون الأسود)، فتوقف عن

تناول العلاج واتصل فوراً بالطبيب أو خدمة الطوارئ الطبية. مخاطر القلب والأوعية الدموية: مضادات الالتهاب غير الستيرويدية قد تسبب زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة. احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية، والتي يمكن أن تكون قاتلة. قد يزيد هذا الخطر مع مدة الاستخدام. المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية قد تكون في خطر أكبر.

لا ينصح باستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في تسكين الألم لفترة ما قبل أو بعد عمليات تحويل مسار الشريان التاجي. مضادات الالتهاب غير الستيرويدية زيادة خطر حدوث أضرار معوية خطيرة بما في ذلك التهاب، نزيف، قرح، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى الموت. لا يوصى باستخدام هذا الدواء في المرضى الذين لا يمكن تحمل لسر الجلأكتوز أو نقص بايزيم اللاب لاكتاز أو متلازمة سوء امتصاص الجلوكوز أو الجالاكتوز (أمراض استقلابية نادرة). احتياطات للاستخدام:

يحتوي هذا الدواء على أدوية غير ستيرويدية مضادة للالتهاب: كيتوبروفين. يجب ألا تتناول أدوية أخرى تحتوي على مضادات الالتهاب غير الستيرويدية و/أو أسبرين بالتزامن مع هذا الدواء. اقرأ نشرات الأدوية الأخرى التي تتناولها بعناية للتأكد من عدم وجود مضادات الالتهاب غير الستيرويدية و/أو أسبرين. التداخلات مع منتجات دوائية أخرى تناول أو استخدام أدوية أخرى لتجنب التداخلات الدوائية المحتملة بين العديد من المنتجات الدوائية، لا سيما مع مضادات التخثر الفموية ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى، بما في ذلك الجرعات المرتفعة من الأسبرين، الهيبارين، الليثيوم، الميتوتريكسات (بجرعات تتجاوز ١٥ مجم/ الأسبوع)، من الضروري إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك بانتظام إذا كنت تتخضع لأي علاج آخر. التداخلات مع الأطعمة والمشروبات لا يوجد.

التداخلات مع المنتجات العشبية أو العلاجات البديلة لا يوجد. الاستخدام أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية الحمل والرضاعة الطبيعية

الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل (١٢ أسبوعاً من انقطاع الطمث أو ١٢ أسبوعاً بعد أول يوم من آخر طمث)، قد يصف لك طبيبك هذا الدواء، إذا لزم الأمر. من ٢،٥ إلى ٥ أشهر من الحمل (١٢ إلى ٢٤ أسبوعاً من انقطاع الطمث)، سيستخدم هذا الدواء فقط بناءً على نصيحة طبيبك ويتم تناوله لفترة قصيرة. لا ينصح على الإطلاق باستخدام المطول لتلك الأدوية. بعد ٥ شهور من الحمل (بعد ٢٤ أسبوعاً من انقطاع الطمث)، يجب ألا تستخدم هذا الدواء مهما كانت الظروف: لأنه يؤثر على الجنين وقد تكون له عواقب وخيمة خاصة على مستوى القلب والرئة والكلى حتى ولو تم تناول جرعة واحدة. إذا تناولت هذا الدواء أثناء حملك لأكثر من خمسة أشهر، فقمي بالتحدث مع طبيب النساء/التوليد من أجل أن يتم توجيهك بالشكل السليم.

الرضاعة الطبيعية

يُمر هذا الدواء إلى لبن الأم؛ لذا يجب عدم استخدامه أثناء ممارسة الرضاعة الطبيعية كإجراء احترازي. استشرى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء. التأثير في القدرة على قيادة واستخدام الآلات

في حالات نادرة، قد يسبب تناول هذا الدواء: دوأراً أو غثاساً أو تشنجات أو اضطرابات بصرية. ينصح بعدم القيادة أو تشغيل الآلات في حالة ظهور أي من هذه الأعراض. قائمة بالسواغات التي لها تأثير معروف معلومات هامة عن بعض مكونات عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة: يحتوي هذا الدواء على لاكتوز.

٣. كيفية تناول عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة؟

تعليمات للاستخدام الصحيح لا يوجد. الجرعات، طريقة و/أو أسلوب التناول، معدل تكرار التناول ومدة العلاج

الجرعات

مخصص للبالغين أكبر من ١٥ عاماً. في جميع الحالات، لا تتجاوز الجرعة القصوى والتي تبلغ قرصين لك ٢٤ ساعة. تعتمد الجرعة على دواعي الاستعمال. • طب الروماتيزم: تتباين الجرعة من قرص واحد إلى قرصين بمقدار ١٥٠ مجم، أو ١٠٠ إلى ٣٠٠ مجم في اليوم. • علاج نوبات الصداع النصفي: • تناول العلاج بأسرع ما يمكن بعد ظهور النوبة. • ابدأ العلاج بنصف قرص (٧٥ مجم) • يجب الشعور بفعالية العقار بشكل عام في غضون ساعتين من التناول. • إذا لم تتعافى بعد الجرعة الأولى، فيجب عدم تناول جرعة ثانية أثناء النوبة نفسها. يمكنك تناول علاج آخر غير مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الأسبرين. • في حالة التعافي بعد الجرعة الأولى ثم إعادة ظهور الألم في غضون ٢٤ ساعة، يمكن تناول جرعة ثانية بشرط احترام حتمية وجود فاصل زمني قدره ١٢ ساعة على الأقل بين الجرعتين. • إذا كانت الجرعة التي قدرها ٧٥ مجم غير فعالة، فيمكن تناول جرعة قدرها ١٥٠ مجم (قرص واحد) أثناء النوبة التالية. طريقة التناول للاستخدام عن طريق الفم. يجب بلع الأقراص كاملة مع كوب كبير من الماء.

تكرار تناول الدواء

يتم تناول الأقراص على جرعة واحدة أو جرعتين، أثناء الوجبات إن أمكن، أو إذا تعذر ذلك فيتم تناولها مع وجبة خفيفة. على أي حال، امنتل بشكل صارم إلى أوامر طبيبك.

مدة العلاج

على أي حال، امنتل بشكل صارم إلى أوامر طبيبك. أعراض وتعليمات في حالة الجرعة الزائدة إذا تناولت عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم، أقراص مُحزَّزة أكثر مما يجب: في حال تناول جرعة زائدة أو التسمم العرضي، توقف عن تناول العلاج واستشر الطبيب فوراً. تعليمات في حال إغفال جرعة واحدة أو أكثر إذا أغفلت تناول عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم، أقراص مُحزَّزة: لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيتها. مخاطر متلازمة الانسحاب لا يوجد.

٤. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

وصف الآثار الجانبية مثله مثل كافة الأدوية، قد يكون لعقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة آثار جانبية، على الرغم من عدم تعرض الجميع لها. • قد تحدث تفاعلات عكسية كما يلي: • طفح جلدي: طفح جلدي، حكة، أرتكاريا. تفاقم الأرتكاريا المزمن. • الجهاز التنفسي: نوبة ربو، صعوبة في التنفس خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الأسبرين أو تجاه مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى، • عامة: نادراً جداً ما يحدث تورم الوجه والعنق (وذمة وعائية)، صدمة حساسية. • كما قد يحدث أيضاً: • نزيف الجهاز الهضمي (انظر تحذيرات خاصة). يكون هذا أكثر شيوعاً عند استخدام جرعة مرتفعة، • التفاعل الجلدي عند التعرض للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية، • يشكل استثنائي، يمكن أن يحدث تقشر للجلد، انتشار سريع بشكل خطير للغاية في الجسم

في كل هذه الحالات، تَوَقَّف عن العلاج فوراً وأبلغ طبيبك.

• أثناء العلاج، قد يحدث أيضاً ما يلي: • اضطرابات الجهاز الهضمي: غثيان، قيء، إسهال، إمساك، ألم في المعدة، شعور غير مريح بالجهاز الهضمي، وبشكل أكثر ندرة التهاب الأمعاء. • صداع، دوخة، غثاس، اختلاجات (تشنجات) على نحو غير معتاد واضطرابات مزاجية، طنين في الأذنين، مشاكل بالروية، ارتفاع ضغط الدم، تساقط الشعر، وذمة. • في كل هذه الحالات، يجب عليك إخبار طبيبك. • لوحظ حالات من قرح المعدة وانقباض الأمعاء وأمراض الكلى والتهاب الكبد. • قد تتطلب بعض التعديلات البيولوجية فحصاً للدم ووظائف الكلى. إذا لاحظت آثاراً جانبية غير المدرجة في هذه النشرة، أو أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً يُرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

٥. كيفية تخزين عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة يحفظ بعيداً عن متناول وروية الأطفال. لا تتعدى تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العبوة الخارجية. يحزن تحت درجة ٣٠ م في مكان جاف إذا لزم الأمر، يحزن م بعض علامات التلف الواضحة. يجب عدم التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف أو مع المخالقات المنزلية. اسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. سوف تساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة.

٦. معلومات إضافية

القائمة الكاملة للمواد الفعالة والسواغات

ما هي محتويات عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة؟

المادة الفعالة هي:

كيتوبروفين ١٥٠,٠٠٠ مجم لكل قرص محزر واحد.

المكونات الأخرى هي:

الطبقة البيضاء:

لاكتوز أحادي الهيدرات، نشا القمح ، سيليكا غروية مائية، ستيرات الماغنسيوم، بودره الجيلاتين .

الطبقة الصفراء:

هيدروكسي إيثيل السليلول، فوسفات هيدروجين الكالسيوم، ريبوفلافين صوديوم فوسفات ، ستيرات الماغنسيوم.

الشكل الصيدلاني والمحتويات

ما هو عقار باي بروفينيد ١٥٠ مجم أقراص مُحزَّزة؟ وما هي محتويات العبوة؟ يأتي هذا الدواء على هيئة أقراص محززة، عبوة بها ١٠٠ أو ١٠٠٠ شريط برتقالي (بي في سي- الومينيوم)يحتوي كل منهما على ١٠٠ اقراص و نشره .

انتاج سانوفي إيجيبت ش م م

٣ شارع المصانع، الزيتون

تم الموافقة على هذه النشرة في ١٩ نوفمبر ٢٠١٧