



# Doli® rhume, comprimé

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMÉDICATION destinée à être utilisée sans consultation, ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
- Lisez attentivement la notice et, pour toute précision, comme en cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

.....pour un comprimé  
Paracétamol .....500 mg  
Chlorhydrate de pseudoéphédrine .....30 mg  
Quantité correspondant à pseudoéphédrine base ..... 24,57 mg  
Excipients: amidon de blé, amidon de pomme de terre, carboxyméthylamidon sodique, lactose, stéarate de magnésium.

### FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé - Boîte de 16.

### CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

ANTALGIQUE périphérique/ANTIPYRÉTIQUE

DÉCONGESTIONNANT NASAL par voie systémique (R : Système respiratoire).

Ce médicament est une association d'un principe actif ANTALGIQUE (il calme la douleur) et ANTIPYRÉTIQUE (il fait baisser la fièvre) et d'un VASOCONSTRICTEUR NASAL par effet alpha-sympathomimétique (il débouche le nez).

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

#### (Indications thérapeutiques)

Ce médicament contient du paracétamol et de la pseudoéphédrine.

Il est indiqué dans le traitement de courte durée des sensations de "nez bouché" avec maux de tête et/ou fièvre, au cours des rhumes.

### ATTENTION !

### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (Contre-indications)

Ce médicament est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 12 ans.

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie au paracétamol,
- allergie à la pseudoéphédrine,
- maladie grave du foie,
- maladie grave du cœur (hypertension artérielle sévère, angine de poitrine sévère),
- risque de glaucome,
- risque de rétention urinaire liée à des troubles uréto-prostatiques (difficultés à uriner),
- en association avec l'iproniazide (IMAO non sélectif).

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sauf avis contraire de votre médecin, dans les cas suivants :

- traitement par la guanéthidine (antihypertenseur),
- pendant la grossesse en cas de détresse foetale ou d'hypertension artérielle maternelle,
- pendant l'allaitement.

*EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### MISES EN GARDE SPÉCIALES

*NE LAISSEZ PAS CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.*

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans. Vous devez interrompre le traitement en cas de sensation d'accélération du cœur, palpitations, nausées.

### N'UTILISER CE MÉDICAMENT QU'AVEC PRÉCAUTIONS (Précautions d'emploi)

*PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN*, afin qu'il adapte votre traitement :

- en cas de maladie du cœur (notamment d'angine de poitrine ou d'hypertension artérielle), de maladie de la thyroïde (hyperthyroïdie), de maladie du foie ou de maladie des reins.

*CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN* en cas :

- d'écoulement nasal purulent,
- de persistance ou d'apparition de fièvre,
- d'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement.

*En cas d'anesthésie prévue, arrêtez le traitement et prévenez l'anesthésiste.*

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

*AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS*, notamment avec certains antidépresseurs (iproniazide) et la guanéthidine,

*SIGNEZ SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.*

*En outre, la plus grande prudence est recommandée lorsque sont consommés, conjointement avec ce médicament, certains antidépresseurs (moclobémide, toloxatone) ; dans ce cas, respectez scrupuleusement les doses de ce médicament préconisées dans la notice d'utilisation.*

Ce médicament contient du **paracétamol** et de la **pseudoéphédrine**.

D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. chapitre posologie).

## SI VOUS ÊTES ENCEINTE OU SI VOUS ALLAITEZ:

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**La présence de pseudoéphédrine conditionne les précautions d'emploi de ce traitement pendant la grossesse. Il ne vous sera prescrit par votre médecin que si nécessaire.**

**Grossesse :** en cas de besoin réel, ce médicament peut être utilisé durant la grossesse. Respectez les doses et la durée de traitement préconisées dans la notice d'utilisation. En cas de détresse du foetus, ou d'hypertension artérielle maternelle, la prise de ce médicament est déconseillée.

**Allaitement :** la pseudoéphédrine passe dans le lait maternel. Ce médicament est déconseillé chez la femme qui allait, en raison de possibles effets cardio-vasculaires (tachycardie) chez le nourrisson.

## SPORTIFS ATTENTION

La pseudoéphédrine peut induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

## LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE DU MÉDICAMENT PAR LE PATIENT

Amidon de blé (traces de gluten).

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans (soit 35 kg).

### POSOLOGIE

**Adulte :** 1 comprimé, à renouveler si nécessaire au bout de 4 heures, sans dépasser la posologie maximale de 6 comprimés par jour. En cas de nécessité, il est possible de prendre 2 comprimés par prise. La posologie quotidienne maximale est de 3 g de paracétamol et 180 mg de pseudoéphédrine.

**Enfants de 12 ans à 15 ans (35 à 50 kg environ)** un comprimé à renouveler si nécessaire toutes les 6 heures, sans dépasser la posologie maximale de 4 comprimés par jour.

### MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

#### VOIE ORALE.

Les comprimés doivent être avalés tels quels, avec un grand verre d'eau.

**ESPACER LES PRISES D'AU MINIMUM**  
chez l'adulte : 4 HEURES  
chez l'enfant : 6 HEURES.

En cas de maladie grave des reins : 8 HEURES.

### DURÉE DU TRAITEMENT

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

### CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de surdosage accidentel ou d'intoxication, **ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MÉDECIN.**

**QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS DU MÉDICAMENT (Effets indésirables)**  
COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT

PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- peuvent survenir des réactions allergiques ou une éruption sur la peau, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.
- au cours du traitement, il est possible que surviennent exceptionnellement les symptômes suivants :

• sécheresse buccale, palpitations, insomnie, anxiété, agitation, maux de tête, sueurs,

- rarement hallucinations,
- crise aiguë de glaucome chez les sujets prédisposés,
- troubles urinaires avec difficultés à uriner (en cas d'anomalie de l'urètre ou de la prostate), taux anormalement bas de certains éléments du sang pouvant se manifester par des saignements de nez ou des gencives (plaquettes), dans ce cas, un contrôle du bilan sanguin peut être envisagé.

Il faut en avertir votre médecin.

**SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT ET, EN PARTICULIER, CEUX QUI NE SERAIENT PAS MENTIONNÉS DANS CETTE NOTICE.**

### CONSERVATION

**NE LE PRENEZ PAS APRÈS LA DATE LIMITE D'UTILISATION INSCRITE SUR L'EMBALLAGE.**

**A.M.M. n° 910 347 1**

" إنـهـذا دـوـاء "

- الدـوـاء مـسـتـحـضـر وـلـكـنـ لـيـسـ كـفـيرـهـ مـنـ الـمـسـتـحـضـرـاتـ.
- الدـوـاء مـسـتـحـضـر يـؤـثـرـ عـلـىـ صـحـلـكـ وـأـسـهـلـكـ خـلـافـاـ التـعـلـيـمـاتـ يـعـرـضـ لـلـخـطـرـ.
- اـتـبـعـ بـدـقـةـ وـصـفـةـ الـطـبـيـبـ وـطـرـيـقـ الـإـسـتـهـالـ الـمـصـوـصـ عـلـيـهـ وـتـعـلـيـمـاتـ الصـيـدـلـانـيـ الـلـذـيـ صـرـفـهـ لـكـ.
- فـاقـطـيـبـ وـصـيـدـلـانـيـ هـاـ الـخـبـرـانـ يـنـفـعـهـ وـضـرـهـ.
- لـاـ تـقـطـعـ مـنـ الـعـلاـجـ الـمـحـدـدـ لـكـ مـنـ طـفـاءـ نـفـسـكـ.
- لـاـ بـدـ لـاـ تـرـدـ عـلـيـهـ بـدـونـ اـسـتـهـارـ الـطـبـيـبـ.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

### CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

**NE LAISSEZ JAMAIS LES MEDICAMENTS A PORTEE DE MAIN DES ENFANTS**

Fabriqué par :  
**Aventis Pharma SA**