نشرة دوائيّة : معلومات للمستخدم فلاجيل[®] 250 ملغ

أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مترونيدازول

الرجاء قراءة هذه النشرة بدقة قبل البدء بإخذ هذا الدواء. • إحتفظ بعراد النشرة بدقة قتل البواعيا معيدا. • إذا كان ندايت استلة إضافية أو غكوف، الرجاء إسال الطبيب أو الصيدي للحصول • قد أو نمن عدا البرادات التحصيل الا تعطه لأي أحد أغر لأنه قد يؤديه. • قد واحت هذا البراد الت الحصيلية أو يطال العطه لأي أحد أغر لأنه قد يؤديه. • في ما تقاضاً مد التأليرات البيانية أو يطال الاحتف أي تأثيرات جانبية غير مذكورة - فرد التشرة، الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي.

يڭ هذه النشرة : 1. ما هو فلاجيل وما هي دواعي استعمال

ب معرفتها قبل آخذ فلاجيل

- د. تا مو شربين ونا مي دو...
 1. الملومات الواجب معردتها ق
 3. كيف يُؤخذ فلاجيل
 4. التأثيرات الجانبية المحتملة

5. كيف يُحفظ فلا جيل
 6. معلومات إضافية

ما هو فلاجيل وما هي دواعي استعماله

فلاجيل هو مضاد حيوي مضاد للبكتيريا والطفيليَّات بنتمي إلى مجموعة الأدوية 5 – نيتروي

يُستعمل لعلاج بعض حالات الخمج البكتيريَّة التي تسببها البكتيريا والطفيليَّات التي تتأثَّر بفلا جيل (تُسمَّى «كالثات حيَّة دقيقة حسَّاسة»).

1. المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ فلاجيل

موانع الاستعمال: لا تأخذ فلاجيل إذا:

البدازول أو أيَّ دواء بنتمي إلى محمومة الانميدازول (محمومة المضادات الحيويَّة التي كثت مصائا بحساسية ضدً التر لمستحصل بعضام هما البروليدارون والي والم المسيان عجلوها البينيدارون والمعلومة المسادت. تتضمّن الثانونيدارون أو أني من المركبات الأخرى بلا هذا السواء الواددية النسم 6. إذا كان المريض ظلما من المراعس الستّ سلوات (راجع هترة «تحذيرات ومحاذيره).

محاذير مناسبة للاستعمال: تحذيرات خاصة تحذيرات ومحاذير للاستعمال قبل أن نأخذ فلاجهل. أعلم طبيبك إذا كنت تعاني من: - اضطرابات عصبية.

- اضطرابات عد - اضطرابات نف - اضطرابات یلا - إذا أصبت سابا يے اندم. سابقًا بالتهاب السحايا بلة خلال فترة العلاج بالترونيدازول.

أعلم بلبيك على الفردية حال تترّضت لإحدى الفتائل التابية **لحلال فترة العلاج يقلاجيل.** من الجرعة الآلي، تواجه عقر التركن الركاني لمسيس عاد ومنفاع (اسمة الآية، طرب وعالي) قد بسبك العرارش الثالية، شيق ب التكمر، دورا، نشارة إنصاء، أو روز المولية (أولية هم، التأثيرات الجليئية المتنقة)، بق حال حصول هذه العرارش، وقد عن أم هذا الدواء لأن مياكنه قد تكون بق خطر والتعلى بالعليب على القرر.

ية حال أسبت في بداية الملاج باحمرار أو بالتشار بقر على جسلت كلّه، مع حس، يجب الشك بإلسانيت بارتكاس خطير يُعرف بالبُنّار الطلحي الملمُ (زاجع قسم التأثيرات الجانيّة الخطائية): أعلم طبيلت على القور لأنّه يجب إيقاف العلاج، وية حال حصول هذا الارتكاس. يُسُبُ أيِّ استعمال أخر المترونية اوزن لوحمه أو بالانشراك مع مادة فاعقة أخرى بلا العراء (له.

سِيَّة مثل صعوبة في تنسيق الحركات أو ارتباك أو نوبات صرع، أو جب أن تنتبه في حال حصول أيَّ إشارات أو تفاقم محتمل لاضطرابات عد ہے، پے جب جب من سوی ہی سرب رو سم محل محص محص محص محم ہے۔ مصوبہ کے الکلام او اسرب او رجفہ او حرکات چرا رائیڈ کہ العینی رکنلٹ تأثیرات آخری علی البینی والقدمین مثل النظار والوخر واللہ بالبرد والخدر وسفت حاصّہ السی، مذا لاسطیر ایات ترول عادۃ عند إیتاف العلاج، لذلك من العِمّ التوقّف من أخذ الدواء و الطبیب علی الفرر (راجو قسم «التأثیرات الجائیمَّة الحقظة).

من الجرعات الأولى، فن يتغيّر سلوكك ويبرّ شك للخطر، بخاصة إذا عاليت يج السابق من مشاكل تفسيّة. يج هذه الحالة، يجب عليك التوقّف عن أخذ الدواء ومراجعة العليب (راجع قسم «التأثيرات الجائية المتفلة»).

ت للا السابق من انسلر ابات بلا الدم أو تلقّيت علاجًا عالي الجرعة و/أو طويل الأمد، قد يصف لك طبيبك فحوصات دم عاديّة مدادك الدموي الكامل. یة حال عاد التحقق من

ب أو مختبر التحليل أنَّك تأخذ هذا الدواء إذا كان عليك الخضوع للحص مخبريَّ طِبي، فأخذ المَترو وصات الخبريَّة (فحص اللولبيَّة)، عبر إطلاق تثيجة إيجابيَّة خاطئة لفحص معيَّز (فحص نلسون) نصر. نثائج الف

الأحضال يُنيّ إسلام الغرّ اس للأشال ما بين السادسة من السر يسبب خطر الاعتقاق. توجد أشكال وعبارات من الضاء الحيوي هذا خا تصدّحال ال الطبيب أو الصيداني قبل أهد فلا جيل.

ا**دويية أخرى وفلاجيل** أعلم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ حاليًا أو أخذت مؤخَّرًا أو قد تكون تأخذ أيَّ أدوية أخرى.

أعلم العليب إذا كنت تأخذ: - أدوية تحقوي على الكمول سبب خطر الترأمن لتأثيرات جانييَّة مثل احمرار الويه وا - اليوسولفان (الذي يوسف لعلاج بعض أنواع اصتطرابات الدم ولتحضير زرع نتيَّ العظ - الديسولفيرام (الستعمل للحاول دون الانتكاس لدى المرضي المتميّن على الكمول) . ب خطر الثمرُّض لتأثيرات جانبيَّة مثل احمرار الوجه والشعور بالحرَّ والتقيَّرُ وزيادة سرعة القلب، ير زرع نقيّ العظم) ،

يت ين ---حي يجب المادي استهلاك الكمول في خلال فترة العلاج يسبب خطر التعرّض لتأثيرات جانبيَّة مثل احمر از الزجه والشعور بالحرّ والتقيُّو وزيادة سرحة التقليب

الحمل والارضاع عند الشرورة، يمكن أخذ هذا الدواء، لإخلال نثرة الحمل، ولكن يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب أو الص عليك تشاعي الارضاع بج خلال نفرة العلاج بهذا الدراء. والا تتحاج الذر هذا الدوار. يدلى قبل أخذه. و دي سري سره مسلي وسي يبت عيد دعية مسلم و سيبية و عليه المسلم . إذ الملاج بهذا الدواء. تعتقدين نفسك حاملاً أو كتبِ تقوين الحمل، يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب أو الصيدتي قبل أخذ

قيادة السيَّارات واستعمال الآلات يجب عليك أن تدرك، بخاصة إذا كنت تا النظر بسبب استعمال هذا الدواء.

معلومات مهمَّة حول بعض مركّبات فلا جيل يهكن استعمال هذا الدواء لدى الترضي الذين يعانون من التقوّط الشحا جدًّا وبالتالي يُعتبر آمنًا للمرضي المصابين بالتقوّط الشحمي التقاشي. مي الثلقائي. بمكن أن يحتوي نشا القمح على الغلوتن ولكن بكميَّة ضئيلة

وجود خطر تعرّضك لدوار وتشوّش ذهني وهلوسات ونوبات واضطر ابات ف

3. كىف يُؤخذ فلاجيل

يسينيت لو تركيم مدينوني مذا الدرة موقعة اللاجيل الواجب أغذها مذا الدرة موقعة البالين والأطفال إلى السادسة من يقوف مدار الجرية على معرف ولعل الزمن المالي. – لدى الباليني 150 مالي الزموم الى 1.5 (اليوم. – لدى الأطفال 375 مغير/اليوم. – 20 لى 40 مغير/كغير/اليوم. سة من العمر أشكال دوائيَّة تناسبهم أكثر

, لديه/لديها إشارات سريريَّة أو لا.

ية بعض الحالات، من الضروري أن يُعالج شريكك الأحوال، تقدّد بوصفة الطبيب.

كيف يجب أخذ فلاجيل

عن طريق الفم. إبلع الأقراص مع كوب من الماء.

ما هو عدد مرّات استعمال فلاجيل من مرّتين إلى 3 مرّات بق اليوم حسب اا يين ب الخمج الذي يُعالج،

مدَة العلاج بفلاجيل ما هي

اكتريكين للضاد الحريم بمذا فقالأن

لين يكن النشاء المريونية ما عمارة بجب المساعة بانتقاع حيب البرعان الوسوطة وللمنة التي يمدفعا الطبيب. لا ينهل اعتماء المرز أو أن عامل أحل الذ عليف منافي معر السب لا يوم إلى الحرك بالمناه المبري ركن الى مائة الخمي قسيا ان يوز كر معنيه المريمة أو يلقات الملاح على ما الشهر وسوف يؤكر شما شاه. حالات حاصة بيب أن يوم ملح الما المبرك المائة حصي مشيطا طلياتي العام أنها ويقاع جاء الأمية (حالة خمع سشيطا طلي

الاا أخذت جرعة مفرطة من فلاجيل، إذا كنت تنتيأ أو نواجه صعربة لا تسبق حركاتك أو نتمر بالتهيان، استشر الطبيب الذي قد يقرّر وصف علاج لك.

4. التأثيرات الجانبيَّة المحتملة مثل الأدوية كلُّها، قد يسبِّب **فلاجِيل** تأثيرات جانبيَّة لا تُصيب المرضي كلُّهم

ا يشكر بان كمنية، (يشكر بان كمنية، (يالي السار بايد منية ليس خطيرة، «لا أوجاع المدة والقبان والقبّرة والإسهال، (يالي السار بالي الي الي الي الي المثلر التاريخ عامة الارك والي عنها) - التهام اليزياني الي تكون بين اليفان العارج - تؤير فين الشان أو تقيير في مظهره (قد يكون السبب نمواً عطريًا) .

تأثيرات على الجلد والأغشية المخاطيّة ،

هيو مع احمرار الوجه، حكَّة، طفح جلدي مع حرارة أحيانًا،

ص)، تورُّم إرجيَّ مقاجنَ لِلا الوجه والمثق (خزب وعائي) وصدمة إرجيَّة بِمكن أن تهدَّد الح تتها قبل أخذ فلا جيل +)، لبيه بطفع القرّاص ات الواجب معرفة

> مك كلَّه مع بثور ومع حمى (البُّثار الطفحي المعمَّم الحاد) بالات نادرة جدًا من الاحمرار الذي ينتشر على حالات نادرة جدًا من الاحمرار الذي ينتشر على جسمك كلَّه م (راجع قسم «الملومات الواجب معرفتها قبل أخذ فلاجيل»).

مكن أن ينتشر على الجسم كلُّه بسرعة طفح بثاري مع تقشَّر الجلد وأن يهدُّد الحياة (النكروز الجلدي السام، تتاذر ،

Flagyl*

، تعطيبي، لأماد الف (اعنا لى) مع تأثيرات على اليدين والقدمين مثل التثمَّل والوخز والشعور بالبر

، نخدر صداع، دوار، بر

تريات سرم. تشوّن ذعني. منظر ابت مسيحة، أكرة بالاعلال الدماغي أو متلازمة العليم، مع موارض تعديّن التدوّن الدعني واسطر ابات في الوم واصطر أمان في السلوك وسعونه، في هسي المركات واسطر التان في التلق واسطر الماني في الشغر ومركات غير ارابت في الو ورجعة، عاددا ما تزريل هذه الاسلوك الما والي وقد تترافق مع تعييرات في قصومات الرئين المنطقيسي. يتن عراحات الدادية عار الووكات (رابع ضم الملومات الواجب معرفتها قبل أغذ فلاجيل)،

شطر ابات عا

المطرابات للإالتقصيلة (جنون المثلثة، ومام) يُممثل أن تترافق مع أفكار انتصاريّة ومعاولات انتحار (رابيع قسم «الملومات التاريب معرفتها قبل أغذ فلا جهل»)، ميروا تشكيّلية.

<mark>ضطرابات لإ الرؤية</mark> ، - اضطرابات مؤقفة لية الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية واذدواج الرؤية وقصر النظر وضعف النظر وتغييرات لج رؤية الألوان. التهاب الع

اضطرابات الدم: – انخفاض غير طيبه

يح تعداد صفيحات الدم، وانخفاض غير طبيعي أو هيوط كبير في عدد بعض خلايا الدم البيض (العدلات) .

ق**ائيرات على الكيد ،** – ارتفاع الزيمات الكبد (نافلان الأمين، الفرسقاناز القاوي) . – حلات نادرة جدًا من من مرض الكبد الغطير (يترافق مع يرفقان ^أميانًا) ، بخاصة خلاك من قصور الكبد الذي يتطُب زرغًا .

نائيرات أخرى

ا تلوَّن البول بالبنِّي المائل إلى الاحمر از بسبب الدواء.

الإفادة عن التأثيرات الجانبيَّة ذا أصبت بأيَّ تأثيرات جانبيَّة، أعلم الطبيب أو الص دلى ويتضمَّن ذلك أنَّ تأثيرات جانبيَّة غير مذكورة فِ هذه التشرة. إذا أصب بالإفادة عن التأثيرات الجانبيَّة، يمكنك المساعدة على تزويد المزيد من الملومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيف يُحفظ فلاجيل

يحيد المعلمة الوقال ومقارفهم. لا تسلق الوار بينيا من نشر الأطلال ومقارفهم. لا تسلق العراب لم انتشاء تاريخ السلاحية الفرن على القلاف الخارجي لا يحقق العراب حرارة العرض الرواحي بينيا عن القرر. لا درم أن أورفية العام المنتذاة أو مع الشابات التوانية. إسأل السيدتي عن كيفية التخص من الأورية التي ام عد تحتاج إليها، هن شأن هذه الإجرابات صاية البيئة.

نصائح صحيَّة / تثقيف ص

. ويجعل بعض العلاجات بالمض

طيع مقاومة مرض يبدو ه

.لي الذي صرفها لك

ں وزراء الص واتحاد الصيادلسة العرب.

ما الذي يجب عليك مدرقته، حول الشادت الجوزية إن المذاد الحيوية هذا لا مداوية خلات الغني التي منيبا التكتريا، ومي ليت هذاته بمناورة خلاف الخبع ال التلك هذا الذاتي عليها وضعا العاد الحيوية ذاته لا بناية بالمعالك وبالسالير من الذي علي منه. إن الكتيريا فالارة على القادة أو على الثقالار بالرغم من مقول الغذاء الحيوي، يُعرف هذا بالقاوية ويعمل بعض العاد وزراد هذا القادية حيس السعال القداد الحيوية كثيرًا أو عندما لا تكون ضرورية. وزراد هذا القادية حيس السعال القداد الحيوية كثيرًا أو عندما لا تكون ضرورية. 1. الجيوم هذي سو

1) استميل فقط مشارة ⁻ميرياً عندما يصفه لك طبيبك. 2) تقيّد بدقة بالرسطة. 4) لا تشعل مجداً منابة حيرياً بدون رصفة طبيّة حتّى إن كنت تعتقد أنّك تستطيع مقار 4) لا تعتقد الينام، علاجك، أعد كل الطب الفتوحة إلى الصيدتي كي يتخلص منها بالطريقة الثار

ستحضر يوثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر. تبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الم

• الطبيب و الصيدلي هما الخيبران في الدواء و في نفعه و ضرره. • لا نقطع مدة العلاج المحددة لله من تلقاء نفسك. • لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الادوية في متناول الاطفال.

ان هذا الدواء

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي فلاجيل 250 ملغ. أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة المادة الفاعلة هي،

....250 ملغ

د المْلَف بطبقة رقيقة.

- د - . ا**يلركيات الأخرى هي،** نشا الفح- بوفيدون كامي 30. ستبارات المفنيزيوم، هيروميلوز. ماكروغول 20000 .

كيف هو شكل فلاجيل، أقراص مغلَّفة بطبقة رقيقة ومحتويات العلبة

يأتي هذا الدواء على شكل أفراص مغلّفة بطبقة رقيقة. علب من 20

الشركة حاملة رخصة التسويق sanofi-aventis France 82, avenue Raspai 94250 Gentilly - France

أوقات التثاول الصحيحة،
 مدة العلاج،

لذلك، بغية الحفاظ على فعاليَّة هذا الدواء :

الشركة المسنعة sanofi-aventis S.A. Ctra. C-35 – La Batlloria a Hostalrie, Km 63,09 17404 - Riells i Viabrea (Gerona) - Spain

تاريخ المراجعة الأخيرة على هذه النشرة، تموز 2015.