## نشرة دوائيَّة ، معلومات للمستخدم

## فلاجيل" 500 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

مترونيدازول

### الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بدقة قبل البدء بأخذ هذا الدواء.

ه احتما بيدة الشرة هند تحاج إلى قرائها مجداً. 9- اكان لبناء أسلة المنافقة مكون الرجاء الباليين أو الصيدان للمصول على الزير من الطوات. 9- يومان علقه أحد التأثيرات الجانية أو بلع ملكا لأجم أخر لأنه قد يؤديه حتى ولو كانت موارض مرضه مطاقة ليوارشان. 9- هال علقه أحد التأثيرات الجانية أو بلغ مالا لاحقت أي تأثيرات جانية غير مذكورة في هذه التشرة، الرجاء إعلام العيب أو السيدار

## في النشرة :

ما هو فلاجيل وما هي دواعي استعماله
الملومات الواجب معرفتها فيل أخذ فلاجيل
كيف يؤخذ فلاجيل
ليفية فلاجيل

- - 5. كيف يُحفظ فلاجيل لمات اضافية . 6

## ما هو فلاجيل وما هي دواعي استعماله

فلاجيل هو مضاد حيوي مضاد للبكتيريا والطفيليَّات ينتمي إلى مجموعة الأدوية 5 - نيترويميدازول. يُستعمل لعلاج بعض حالات الخمج البكتيريَّة التي تسببها البكتيريا والطفيليَّات التي تتأثَّر بفلا جيل (تُسمَّى ،كالنات حيَّة دقيفة حسَّاسة؛).

1. المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ فلاجيل

- موانع الاستعمال: لا تأخذ فلاجيل إذا:

- 9 كافذ فلاحيل إذاء. كنت ممالاً بحسابية شد الترونيدازول أو أي دواء ينتمي إلى مجموعة الإيميدازول (مجموعة المعادات الح التي تعمّن الترونيداوري أو أي من التركنات الأخرى في هذا الدواء الواردة في التسم 6. إذا كان البريض ما دون عمر الست سلوات (راجع نقرة شخيرات ومعاذيره).

### محاذير مناسبة للاستعمال؛ تحذيرات خاصة

تحذيرات ومحاذير للاستعمال قبل أن تأخذ فلاجيل، أعلم طبيبك إذا كنت تعاني من:

اضطرابات نفسيَّة، اضط ابات لغ الدم

مابقًا بالتهاب السحايا في خلال فترة العلاج بالمترونيدازول. ، إذا أص

أعلم طبيبك على الفور في حال تعرّضت لأحد المشاكل التالية في خلال فترة العلاج بفلا جيل:

يسيسه من جريعية من حريق منه منه سنة منهم يعرف المراح منه جريعي من مراح مراحيي منها. من الجرية الألبي أوبا خطر الترض (كان تحسيس عاد ونقاعات اصنعة أقلق من عالي أعد ونقلي علي المراحن الثالثة تعني لج هذا الدواء لأن حيات قد تكون في خطر واتصل بالطبيه على الفور. مول هذه العوارض، توقّف عن أخذ

لج حال أصبت لجداية الملاح باحدراد أو بانتشار بقر على جسك كلًه، مع جمى بعب الثلث يُواصابته بارتكان خطير يُبرك بالبُنّار الطفم. المُم أراجع ضم التأثيرات الجانيّة المتنفة)، أعلم طبيك على الثير لأنّه يجب إيقاف العلاج، ولاّ حال حصول مذا الارتكاس، يُمتع أيّ استممال أخر للشروئيدازول لوحد أو بالانشراف م مادة فاعلة أخرى بلا الدوانة.

بجب أن تثنيه في حال حصول أي إشارات أو تفاقم محتمل لاضطر ابات عصبيَّة مثل صعوبة في تنسبق الحركات أو ارتباك أو تشوُّش، أو نوبان يجب المرابع عن الصراني بينان و منه المرابع المرابع به الميتين والمان في حيات المرابع من المرابع و المرابع و موسد المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المالية المرابع المالية المرابع المرابع المرابع المرابع والمتقارة الطبيب على المرار (الجوهم التأثيرات الجانبية الحصلة).

عات الأرلى، قد يتبنّى سلوكك ريبرّ ضك للخطر، بخاصة إذا عانيت في السابق من مشاكل تنسيّة. في هذه الحالة، يجب عليك التوقُّض الدواء ومراجعة الطبيب (راجع شم، التأثيرات الجائبيّة للحضلة»). عن أخذ الدواء ومراجعة الطب

ا. الا حال عانيت الإليباني من اضطر أنات الدم أو تلقَّبت علاجًا عالى الحرعة و/أو طويل الأمد، قد يصف لك طبيبك فحوصات دم عاديَّة

للتحقق من تعدادك الدموي الكامل. المار الطبيب أو مختبر التحليل أنّت الخذ هذا الدراء إذا كان عليك الخضوع للتحص مخبريّ علي، فأخذ الترونيد إزرل قد بتداخل مع بعض تتائج الشورصات الخبريّة (فتحص اللولييّة)، عبر الطلاق نتيجة إيجابيّة خاطئة لتحص محبّي (فتحص تلسوّن).

الاطفال يتم إعماد الأقراص للأطفال ما دون السادسة من العمر بسبب خطر الاختفاق. توجد أشكال عيارات من المضاد الحيوي هذا خاصة بالأطفال الصغار.

## تحدَّث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ فلاجيل.

أدوية أخرى وفلاجيل

-ري معرى ر- بيني أعلم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ حاليًا أو أخذت مؤخَّرًا أو قد تأخذ أي أدوية أخرى.

### ash. . إذا كت

مر معهد ، -أدوية تحتوي على الكحول بسبب خطر التعرّض لتأثيرات جانبيَّة مثل احمرار الوجه والشعور بالحرّ والتقيَّة وزيادة سرعة القلب، ظم)، اليوسولفان (الذي يوصف لعلاج بعض أنواع اضطر ابات الدم ولتحظ ير زرعنة الديسوافيرام (المستعمل للحؤول دون الانتكاس لدى المرضى المدمنين على الكحول).

۔ جي ح ، سوں يجب قادي استهلاك الكمل لخ خلال فترة العلاج سبب خطر التعرّض لتأثيرات جانبيَّه مثل احمرار الوجه والشمور بالحرّ والتقيُّو وزيادة سرعة القلب.

ا**لحمل والارضاع** عند المسرود، يمكن أخذ هذا الدواء بع خلال شرة الحمل، ولكن يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذه. عليك تفاصل أو رضرصة أو كنت متتدين تنسك حاملاً أو كنت تتوين الحمل، يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ

## مذا البُواء.

قيادة السيّارات واستعمال الألات . بخاصة أذا كنت تقود أو تستعمل آلات، وجود خطر اتماً ضلك لدوار وتشُمُّن ، وهلوسات واختلاحات واضحل إيات في النظر ى غليك أن تدرك

## ا هذا الد

معلومات مهمية حول بعض مركبات فلاجيل

سويات مهمة حول يعمل مرتبات مرجيل يمكنك أخذ هذا الدواء إذا كنت تعاني من التغوّط الشحم يُعتبر آمنًا للمرضى المسابين بالتغوّط الشحمي التلقائي. ، التلقائي. يمكن أن يحتوي نشا القمح على الغلوتن ولكن بكميَّة ضنَّيلة جدًّا وبالتال

## 3. كيف يُؤخذ فلاحيا،

**ما هي كميَّة فلاجيل الواجب أخذها** هذا الدواء هو فقط للبالغين وللأطفال في السادسة ه بِما فوق. تتوافر للأطفال ما دون السادسة من العمر أشكال دوائيَّة تتاس واء هو فقط لل هما النواء قو للعد تبايتر ونج معان في المنادسة عن المعرومة فو يتوقف مقار الجرعة على عمرك وعلى البرض المالية: على سبيل الإشارة، بيلغ مقد ال الجرعة المادية: • لدى البالغير: 2010 ماغ /اليوم إلى 2غ/اليوم. • لدى الأطفال: 500 ماغ /اليوم إلى 20-40 ملغ/كلغ/اليوم.

لِهُ بعض الحالات، من الضروري أن يُعالج شريكك/شريكتك، أكان لديه/لديها إشارات سريريَّة أو لا.

في مطلق الأحوال، تقبَّد يوصفة الطير

# **کیف یجب أخذ فلاجیل** عن طریق الفم.

إبلع الأقراص مع كوب من الماء.

ما هو عدد مرّات استعمال فلاجيل من مرَّة إلى 3 مرَّات في اليوم حسب الخمج الذي يُعالج. .

## ما هي مدَّة العلاج بفلاجيل

ما هي هذه العلاج يسر جين لكي يكون النماء الحيري هذا فقالا بجب استماله بانتظام حسب الجرعات التوصوفة وللمدّة التي يحدّدها الطبيب. لا يبني اختماء الحرارة أو أي عارض أخر أنك ففيت فأي شعرر بالنمب لا يعرد إلى الملاج بالنصاد الحيري ولكن إلى حالة الخمع تنسها، لذلك ض الجرعة أو إيقاف العلاج على هذا الشعور وسوف يؤخَّر شه . لن يؤثر ا

حالات خاصة: يجب أن يدوم علاج داء الجيارديَّات (حالة خمج يسبَّبها طفيليُّ) لخمسة أيَّام، وعلاج داء الأميبة (حالة خمج يسبِّبها طفيليُّ) وبعض أنواع التهاب المهار 7 أيَّام وعلاج داء الشَّعْرات (حالة حَمج سبَّبها طفيليَّ) يتمَّ بجرعة وحيدة.

إذا أخذت جرعة مفرطة من فلاجيل، إذا كنت تتقياً أو تواجه معوية للا تنسيق حركاتك أو تشعر بالتهيان، استشر الطبيب الذي قد يقرّر وصف علاج لك

### التأشرات الحاميية الحتملة فلاجيل تأثيرات جانبيَّة لا تُصيب المرضى كلُّهم. لأدوية كلُما، قد س

### إضطرابات هضمنة ،

Flagyl

ت خطيرة، مثل أوجاع المدة والغثيان والتقيُّو والإسهال. الفم. النهاب الفم. اضطرابات في حاسة الذوق، فقدان ال ستار بات نصفتية المستخطرة مثل أوجاع المدة والقيان والتق - انطمار ابات مضنية لعست خطيرة مثل أوجاع المدة والقيان والتق - انتهاب الينكرياس لكنه يزول بعد إيقاف العلاج. - تقير لون اللسان أو تعيير في مظهره (شد يكون السبب نموًا فطريًا) .

### تأثيرات على الجلد والأغشية المخاطيَّة ،

هيومع احمرار الوجه، حكَّة، طفح جلدي مع حرارة أحيانًا، · شُرَى (أَنفَعَ جَلديَ شبيه بطفع القرَّاس)، تَوَرَّم إرجيُ مناجئ لله الوجه والعنق (خزب وعاني) وصدمة إرجيةً بمكن أن تسبُّب الوفاة (رابح شم "الملومات الواجب معرفتها قبل أخذ فلا جيل ")،

> ه كلَّه مع بثور ومع حمى ( الْبُتَّار الطفحي الممَّم الحاد ) ت نادرة جدًا من الاحمرار الذي ينتث (راجع قسم والملومات الواجب معرفتها قبل أخذ فلاحبا و).

## يمكن أن ينتشر على الجسم كلُّه بسرعة طفح بثاري مع تقشُّر الجلد وأن يهدُد الحياة (النكروز الجلدي السام، تناذر ستيفنز حونسون).

إضطرابات الجهاز الع ضرر في أعصاب الأطراف (اعتلال عص والخدر وضعف حاسّة اللمس. ي حسِّي محيطي) مع تأثيرات على اليدين والقدمين مثل الثنمَّل والوخز والشعور بالبرد

صداع، ۔ دوار،

ىر. تشوّش،

شتوى. المطرابات عميمية، تُمرف بالإعطال الدماغي أو متلازمة الغنيم مع عوارش تشمّن التشوّن واضطرابات في الوعي واضطرابات في السؤك وسمونية لإ تشبق الحركات واضطرابات في الفظ واضطرابات في الشية ومركات غير راديّة في العينين ورجفة، عادة ما تزرل هذه الاضطرابات عند إيقاف العلاج وقد تتراقق مع نثييرات في قصوصات الرئين للتنطيسي، أفيد عن حالا انادة حياً، من الوقات راجع قسم الملومات الواجب معرفتها قبل أخذ هلاجيل). لتهاب السحايا غير البكتيري.

### طرابات عقليَّة :

سوست. اضطرابات في الشخصيَّة (جنون العظمة، وهام) بُحتمل أن تترافق مع أفكار انتحاريَّة ومحاولات انتحار

(راجع قسم ، المعلومات الواجب معرفتها قبل أُخَذ فلاجيل،)، a.1581.1.

### ضطرابات في الرؤية :

وقِقتة في الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية وازدواج الرؤية وقصر النظر وضعف النظر وتغييرات في رؤية الألوان، - اضطر ایات ہ تلف / التهاب الع

### اضطرابات الدم،

ن غير طبيعي في تعداد صفيحات الدم، وانخفاض غير طبيعي أو هبوط كبير في عدد بعض خلايا الدم البيض (العدلات).

ت**أثيرات على الكبد،** - ارتفاع انزيمات الكبد (ناقلات الأمين، الفوسفاناز القلوي) ،

ن مرض الكبد الخطير (يترافق مع يرقان أحيانًا)، بخاصة حالات من قصور الكبد الذي يتطلَّب زرعًا. والاصنادية وألم

تأثيرات أخرى: تلوَّن النول بالنيُّم. الماقل التي الاحمر إن سبب الدواء.

لإفادة عن التأثيرات الجانبيّة ام هادة عن الماليزات الواسيية إذا أصبت بأي تأثيرات جانبيّة، أعلم الطبيب أو الصيدلي ويتضمّن ذلك أيّ تأثيرات جانبيّة غير مذكورة في هذه النشرة. بالإفادة عن التأثيرات الجانبيّة، يمكنك الساعدة على تزويد المزيد من الملومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيف يُحفظ فلاجيل

٢. يَّة المدوَّن على الغلاف الخارجيّ.

احفة الطرّرِفَّ في الأكثر المنتخرجة منوية. لا ديم أن أنوية بالانادات المناجع بينيا عن النور: مدة الإجراءات حماية البيئة.

حيَّة / تثقيف م

ح ص

عا منيد بنده بالوصف. 44 لا تسلم معرف أشداً جيوياً بدن رسفة طبية حتى ان كنت تعتقد أنك تستطيع مقاومة مرغر 44 لا تعط أبدأ مشادك الجيوي لأحد أخر نقد لا يلائم مرضه. 5) هند انتهاء علاجك، أعد كل العلب الفتوحة إلى الصيدلي كي يتخلص منها بالعاريقة الناسبة.

for you Follow

• Do

ما الذي يجب عليك معرفته حول الضادات الجيوية. إن المذادات الحيوية فقائه في تداوية حالات الخيو التي تشبيها البكتريا، وهي ليست فقائه في مقاومة حالات الخيج التي تسبيها الغيرو لذلك فقد اختار طبيبك وصف الضاد الحيوي هذا لك لأنه يقاسب حالتك ويتاسب الرض الذي تعاني منه. إن البكتريا قادرة على البقاء أو على التكاثر بالرغم من مغمول الضاد الحيوي، يعرف هذا بالقاومة ويجل بعض العلاجات بالضادات

.500 ملغ

ان هذا الدواء

ر بوثر على سحتك و استهلاكه خلافا للته

يعرنيك الخطر. انبع بهذة وصف العليب و طريقة الاستعمال المعروم عليها ولعيات الصبيل الذي مرطيا الله. العليم و ضرره. لا تفلم مرف العلام المحديدة لله من تقلقه نفسك + لا تقرم مرف الدوام بيرن استشراف تطليب. + لا تقرر مرد الدوام بيرن استشراف تطليب.

جلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلسة العرب.

6. معلومات إضافية

ا**يركيات الأخرى هي:** نشأ الفسم. بوفيدون كابي 30. ستيارات الغنيزيوم، هبروميلوز، ماكروغول 20000 .

يأتي هذا الدواء على شكل أقراص مغلَّفة بطبقة رقيقة في علب من 4 أقراص أو 14 قرصًا.

كيف هو شكل فلاجيل، أقراص مغلَّفة بطبقة رقيقة ومحتويات العلبة

# ماذا يحتوي فلاجيل 500 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة المادة الفاعلة هي:

قد لا تكون أحجام العلب كلُّها مسوَّقة في بلدك.

الشركة حاملة رخصة التسويق

الحيويَّة غير فعًال.

أوقات التناول الص
مدة العلاج.

. 2) تقبّد بدقّة بالوصفة.

sanofi-aventis France 1 -13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris – France

الشركة المسنّعة Sanofi Aventis S.A. Ctra. C-35 – La Batlloria a Hostalric, Km 63,09 17404 - Riells i Viabrea (Gerona) - Spain

تاريخ الموافقة الأخيرة على هذه النشرة : أيار 2015.

لذلك، بغية الحفاظ علي فعاليَّة هذا الدواء: [] استعمل فقط مضادا حيويًا عندما يصفه لك طبيبك.

THIS MEDICAMENT

which affects your health, and its contrary to instructions is dange

, strictly the doctor's prescription, the meth-and the instructions of the pharmacist who 

eat the same prescription without consult

ks. terrupt the period of treatment

out of reach of children

Council of Arab Health Min Union of Arab Pharm

تزداد هذه الماومة بسبب استعمال المضادات الحيويَّة كثيرًا أو عندما لا تكون ضروريَّة.