

نيفاكين 100 ملغ قرص قابل التجزئة

كبريتات الكلوروكين

التعريف بالدواء

أسم الدواء : نيفاكين 100 ملغ قرص قابل التجزئة

التكوين النوعي والكمي :

كل قرص قابل التجزئة يحتوي

مادة فعالة : كبريتات الكلوروكين 136 ملغ
ما يعادل كلوروكين قاعدي 100 ملغ

سواغ : نشا الفصح، سكر شروي بلوري، سيليوس هلامي صلب، ستيارات المغنيسيوم، جيلاتين.

الشكل الصيدوي : قرص قابل التجزئة – علية فيها 20 قرصاً أو 100 قرص.

الترميز (الاستوائية) : ضد البكتريا (المرادى) (P) (الطفيليات) (M) (الجهاز الحركي) (D) (الجلد)

الحالات التي يستعمل فيها هذا الدواء (لواعي الاستعمال)

■ كعلاج ضد البرداء : الوقيامة من داء البرداء ومعالجتها (البرداء وباء منتشر في البلدان الاستوائية وسببه طفيلي مجهري منقول عن طريق وخرزة بعوضه). قد يكون لهذا المرض عواقب خطيرة ويستوجب معالجته بسرعة. في بعض المناطق قد يكون الطفيلي اكتسب مقاومة لتأثير الكلوروكين (جنوب شرق آسيا، المنطقة الشمالية لجنوب أمريكا)، بعض البلدان الأفريقية) وبالتالي فلا يكفي هذا الدواء للوقاية من النوبات البرداءية أو معالجتها. يجب قبل السفر لهذه المناطق استشارة طبيب أو مركز متخصص.

■ عند يوصف كل طبيب هذا الدواء لحالات أخرى.

انتبه

الحالات التي لا يستعمل فيها هذا الدواء (موانع الاستعمال) :

يمنع استعمال هذا الدواء في الحالات التالية :

■ خلل في شبكة العين أو مجال البصر. قد يوصف الطبيب هذا الدواء في حالة نوبة برداءية حادة بعد أن يكون قد قُوم فوائد ومخاطر العلاج عند المريض.

■ سوابق تحسس للكلوروكين أو مشتقاته أو لإحدى مكونات الدواء.

■ عند الشك فإنه من الضروري استشارة طبيب أو الصيدلاني.

تحذيرات خاصة :

■ أن استعمال الكلوروكين لدى مرضى البريفيربية المتقطعة وهو مرض نادر قد يسبب نوبة حادة من البريفيرية.

■ يجب إبلاغ الطبيب في حال الإصابة بهذا المرض.

■ قد يُطلب إجراء فحص كامل للعين قبل بدء أي علاج طويل الأمد ويجب إعادة هذا الفحص على الأقل سنوياً.

■ لكن عند احتمال إصابة شبيكة قد تستدعي وقف المعالجة.

■ في حال الإصابة بالصدفية فإن تناول الكلوروكين قد يزيد من تفاقم الإصابة.

■ يجب استعمال هذا الدواء بحذر في حال وجود داء الصرع إذا ن تناولوه قد يسبب النوبات.

■ احتياطات الاستعمال : يجب عدم ترك الدواء في متناول الأطفال. يجب إبلاغ الطبيب في حال وجود مرض شديد في الكبد أو قصور كلوي حتى يمكنه تكيف المعالجة مع حالتك. عند الشك فإنه من الضروري استشارة طبيب أو الصيدلاني.

■ التفاعلات الدوائية وغيرها من التفاعلات : تقادى أية تفاعلات دوائية محتملة يجب بانتظام إبلاغ طبيب أو الصيدلاني عن كل علاج آخر قيد التناول. يجب تناول الكلوروكين بعيداً عن مرصد تناول الأدوية الواقية للغشاء المعدي الومعي (أكثر من ساعتين إذا أمكن) لأنها تقلل من امتصاص الكلوروكين من الجهاز الهضمي.

■ الحمل والإرضاع : في الأماكن تناول هذا الدواء أثناء الحمل أو الإرضاع إذا قرر طبيبك ضرورة ذلك، نك هذا هناك دلائل تثبت سلامة الكلوروكين في المعالجة طويلة الأمد بجرعات عالية عند المرأة الحامل. عموماً يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء أثناء الحمل وفترة الإرضاع.

■ السائقون والعاملون على الآلات : يجب انتبهه على سائقي المركبات والعاملين على الآلات عن احتمال حدوث اضطرابات بصرية عارضة وتصحهم بعدم قيادة المركبات والعمل على الآلات في حال حدوث مثل هذه الاضطرابات. بيان بالسواغ الواجب الإبلاغ عليها لاستعمال بدون مخاطر عند بعض المرضى : نشا الفصح (غلوتين)

كيف يستعمل هذا الدواء

الوقاية من البرداء (التواجد في بلد حيث احتمال الإصابة بالمرض واردة) يجب أن تبدأ المعالجة يوم السفر

وتستمر طوال مدة الإقامة وإعلاء 4 أسابيع بعد العودة.

الدلالة فقط :

- للبالغين : قرص واحد في اليوم.

- للأطفال فوق 10 كلغ ووزن $1,7$: ملغ لكل كلغ وزن في اليوم. الشراب شكلاً أكثر ملاءمة لمعالجة الأطفال.

ملاحظة: الوقيامة بهذا الدواء غير كافية في البلدان حيث طفيلي البرداء مقاوم للكلوروكين. يجب قبل السفر استشارة طبيب أو مركز متخصص.

■ في حال عدم الاستجابة بالإصابة بنوبة بردائية (حمى، قشعريرة، تورع عام، تقوّج) يجب استشارة طبيب فوراً.

■ في حال عدم إمكان استشارة الطبيب خلال 24 ساعة يمكن. للدلالة فقط، معالجة النوبة البرداءية كالتالي :

لدى البالغين (من 60 كلغ وما فوق) :

في اليوم الأول 600 ملغ (6 أقراص) في جرعة واحدة ثم بعدها بست ساعات 300 ملغ (3 أقراص)، وفي الثاني 300 ملغ (3 أقراص) في جرعة واحدة في نفس الوقت يومياً. للأطفال دون 6 سنوات من العمر يوصى بسحق الأقراص وبلعها مزججة مع لبن أو سائل سحلي.

ملاحظة: الوقيامة بهذا الدواء غير كافية في البلدان حيث طفيلي البرداء مقاوم للكلوروكين. إذا لم يظهر أي تحسن خلال 48 إلى 72 ساعة رغب إجراء الجرعة المطلوبة فيجب مراجعة الطبيب فوراً.

■ للاضطرابات الأخرى : فإن التقادير تختلف طبقاً للمرض ويجب الرجوع على وصفة الطبيب في جميع الأحوال يجب التقيد تماماً بوصفة الطبيب.

■ كيفية الاستعمال وطريق الإعطاء : عن طريق الفم.

عدد مرات الإعطاء وطريق الإعطاء : لتفادي الغثاقين والتقيؤ يجب تناول الأقراص بعد الطعام ولتجنب اضطرابات التماس التي قد يسببها الدواء يفضل تناوله بعد وجبة الصباح أو الظهر في جميع الأحوال يجب التقيد تماماً بوصفة الطبيب.

مدة المعالجة : راجعوا بند "المقادير"، في جميع الأحوال يجب التقيد تماماً بوصفة الطبيب.

طريقة التعامل مع قرص الجرعة : يجب مراجعة الطبيب فوراً في حال تناول جرعة مفردة أو التسمم العارض. فرط الجرعة حالة خطيرة يجب خاصة مع سريعي التأثر. لذلك يجب عدم تجاوز المقادير الموصوفة.

التأثيرات السامة التي قد تحدث عند تناول جرعة مفردة : اضطراب في البصر، صداع، غثاقين، تقوّج، نذول، نقص الضغط الشرياني، توقف القلب والتنفس. في حال تناول جرعة مفردة يجب نقل المريض بدون إبطاء إلى وحدة العناية مكثفة لإعضاعه لمعالجة عرضية فورية ومراقبة حثيئة. لقد ثبت أن الإعطاء المبكر للحقنة

الدريناثيل (0,2 ملغ عن طريق التسريب البطني) وديازينام (0,5 ملغ لكل كلغ وزن عن طريق التسريب على مدى 10 دقائق) قد تزيد من فرص إنقاذ المريض.

طريقة التعامل مع حالة نسيان تناول جرعة أو أكثر : في حال نسيان تناول جرعة أو استفراف الجرعة بكاملها أو جزء منها يجب فوراً تناول الجرعة التي نسيبت أو الكمية التي استفرقت.

التأثيرات غير المرغوبة : تميل كل مادة فعالة قد يسبب هذا الدواء عند بعض الأشخاص تأثيرات نوعاً ما عموماً درجة تحمل الكلوروكين جيدة والتأثيرات الجانبية نادرة ومعقدة وقابلة الإنعكاس:

■ حكة، طفح حبيبي، شرى، اضطراب الجلد بدون قرص والأخص الأطفال والأشخاص المساعية، تساقط الشعر، وذمة عصبية زعانية، احتمال تاقام الداء الصدفية وتحسنها عند وقف العلاج.

■ اضطرابات عصبية (الخلجات)، اضطرابات صمعية عظيمة.

■ صداع، غثاقين، قلق، عدوانية، أرق، اختلال ذهني، هلوسة.

■ اضطرابات هضمية: غثاقين، تقوّج، اسهال.

■ اضطرابات في السمع : طنين آذني، انخفاض السمع، إصابة العصب السمعي.

■ اضطرابات في البصر : رؤية غشبية عابرة، تكثف القرنية.

■ اختلال في صيغة الدم.

■ في حالة المعالجة بجرعات عالية ولمدة طويلة :

- إصابة الشبيكية.

- خلل في نظم القلب، حرمان قلبي.

يجب عدم استشارة طبيب أو الصيدلاني وبالإعظام عن كل تأثير غير مرغوب أو مزعج غير مذكور في هذه النشرة.

حفظ الدواء : يجب عدم استعمال الدواء بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية المذكور على العبوة الخارجية.

احتياطات خاصة للحفظ : يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

تاريخ مراجعة النشرة : سبتمبر / أيلول 2000.



Rhône-Poulenc Rorer
Spécia - France