

التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها، فمن شأن هذه الإجراءات في حماية البيئة.

- كما مع كل الأدوية التي تُعطى عن طريق الحقن، يجب معالجتها محلول التسريب بصرياً قبل كل استعمال ويجب التخلص من المعاليل التي تحتوي على رواسب.

الخلص:
يجب التخلص من كل المواد التي استعملت للتخفيف والحقن وفقاً للإجراءات المتبعة.
لا ينبغي رمي أي دواء في مصرف المياه، أطلب من الصيدلي

7 مل لها كبسولة أرجوانية من الألتوينوم وغطاء بلاستيك أرجواني يفتح بتفتتة.
تحتوي كل علبة على قارورة واحدة من 4 مل من الركازة (80 مل من الدوسيتاكسيل).
قد لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

حامل رخصة التسويق
Aventis Pharma S.A.
20 avenue Raymond Aron
92165 Antony Cedex
France

الصنف
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt am Main
Germany

التاريخ الأخير الذي تمت فيه مراجعة هذه النشرة هو أيام 2016

ان هذا الدواء

مستحضر ي bowel على سمعته واستوكيله، خلاها التعبارات بمرضى المعلم، الذي مررها للدكتور.
• الطبيب والصيدلي هما المخبران في الدواء.
• لا ت Consumption هذه المحددة ذلك من قناع تنسك.
• لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
• لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
وأتحاد الصيادلة العرب

- تليف رئوي (تثبب وسماكة على مستوى الرئتين مع صبغ في التنفس)
- تشوش في الرؤية بسبب تورم شبكتة العين (وذمة البقعمة الصفراء الكيسية الشكل)
- انخفاض مستوى الصوديوم في الدم.

الإفادة عن التأثيرات الجانبية
إذا شعرت بأى تأثير جانبى أعلم طبيبك أو الصيدلى أو المرضى، وينطبق هذا أيضًا على أي تأثير جانبى غير ذكره في هذه النشرة.
بالإفادة من التأثيرات الجانبية، تساهم في تزويد المزيد من المعلومات حول سلامه الدواء.

5. كيف يحفظ تاكسوتير
احفظ هذا الدواء بعيدًا عن نظر الأطفال ومتداولهم.
لا تستعمل هذا الدواء بعد انتقاء تاريخ الصلاحية المدون على علبة الكرتون الخارجيه وعلى لاصقة القارورة بعد كلمة EXP. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.
لا تحفظ الدواء في حرارة تفوق 25 درجة مئوية.
احفظه في عبوته الأصلية بعيدًا عن النور.
استعمل القارورة بعد فتحها مباشرةً. في حال لم تستعمل القارورة على الفور، تكون أوقات الحفظ وظروفه قيد الاستعمال من مسؤلية المستعمل.
من وجة النظر الأحيائية المجهري، يجب أن تتم إعادة التشكيل/التخفيف في ظروف مطهرة متحكم بها.
استعمل الدواء ما أن يضاف في داخل كيس التسريب. في حال عدم الاستعمال الفوري، تكون أوقات الحفظ وظروفه قيد الاستعمال من مسؤلية المستعمل ولا ينبغي عاده أن تكون أكثر من 6 ساعات في درجة حرارة ما دون 25 درجة مئوية بما فيها ساعة التسريب.

أقيم البرهان على الشبات الفيزيائي والكميائي قيد الاستعمال محلول التسريب المحضر على التحوم الموصى به لغاية 48 ساعة في أكياس لا تحتوي على فينيل لكتوريد المتمدد عندما يحفظ محلول بين درجتين مئويتين 8 درجات مئوية.

محلول التسريب دوسيتاكسيل هو مفترض المحلول قد يتبلور في الوقت. في حال ظهور بلورات، لا ينبغي الاستمرار في استعمال المحلول ويجب رميه.
لا ينبغي رمي أي دواء في مصرف المياه، أطلب من الصيدلي التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها، فمن شأن هذه الإجراءات في حماية البيئة.

6. محتوى العلبة ومعلومات أخرى
ماذا يحتوي تاكسوتير
المادة الفاعلة هي دوسيتاكسيل تحت شكل ثلاثي التبيه يحتوي كل مل من الركازة لتحضير محلول التسريب على 20 مل من الدوسيتاكسيل.
- المركبات الأخرى هي بوليسيروبات 80، إيثانول 2-ائي (راجم القسم 2) وحامض الستريك.
كيف هو شكل تاكسوتير ومحظى العلبة الخارجية تاكسوتير 80 مل/4 مل، ركازة لتحضير محلول التسريب هو محلول أصفر باهت إلى أصفر ضارب إلى البنى.
تأتي الركازة في قارورة زجاجية صافية عديمة اللون من

- من وجة النظر الأحيائية المجهري، يجب أن تتم إعادة التشكيل/التخفيف في ظروف مطهرة متحكم بها، كما يجب استعمال محلول التسريب على الفور. في حال عدم الاستعمال الفوري، تكون أوقات وظروف الحفظ قيد الاستعمال من مسؤلية المستعمل.
- عندما يضاف محلول التسريب دوسيتاكسيل على التحوم الموصى به في كيس التسريب، يمكن تأمين استساعات إذا خطط في حرارة ما دون 25 درجة مئوية. يجب استعماله في غضون 6 ساعات (بما فيها ساعة التسريب داخل الوريد).
- بالإضافة إلى ذلك، أقيم البرهان على الشبات الفيزيائي والكميائي ل محلول التسريب المحضر حسب التوصيات، لغاية 48 ساعة في أكياس لا تحتوي على فينيل لكتوريد المتمدد عندما يحفظ محلول بين درجتين مئويتين 8 درجات مئوية. محلول الدوسيتاكسيل للتسريب هو مفترض الشبع لذلك قد يتبلور مع الوقت. في حال ظهور بلورات، لا ينبغي الاستمرار

التأثيرات الشائعة جداً (يمكن أن تصيب أكثر من شخص من أصل 10):

- حالات خمج، انخفاض في عدد كريات الدم الحمر (قردم) أو كريات الدم البيضاء (التي تلعب دوراً مهمَا في محاربة الخمج) والصفيرات
- حمى: في هذه الحالة ينبغي بك إعلام الطبيب على الفور
- ارتکاسات تحسسيّة على التحوم الموصوف أعلاه
- فقدان الوعي (فهم)
- أرق
- شعور بالخدер أو بالوخز أو بالألم في المفاصل أو العضلات
- صداع
- تغير حساسة النوم
- التهاب المينين أو زيادة تدمع العينين
- تورم بسبب ضفت التصريف المقامي
- ضيق نفس
- تصريف أتفقي: التهاب الحلق والأذن؛ سعال
- نزف من الأنف
- تقرّحات في الفم
- اضطرابات هضمية تتضمن الغثيان والتقيّء والإسهال، إمساك
- ألم في البطن
- سعر هضم
- تساقط شعر: في أكثرية الحالات، ينمو الشعر مجددًا بشكل طبيعي عند إيقاف العلاج، وبعض الحالات (عدم مرات غير محدد) تمت ملاحظة خسارة شعر دائمة.
- احمرار وتورم راحتي اليدين أو أخص القدمين (قد يحصل هذا كذلك على الذراعين أو الوجه أو الجسم) مما قد يسبب تقطّعاً جديداً
- تغير في لون الأظافر التي قد تقلّع
- ألم في العضلات؛ ألم في الظهر أو العظام
- تغير أو غياب الدورة الشهرية
- تورم اليدين والقدمين والساقيين
- تعب أو عوارض شديدة بعواض الزكام
- زيادة أو خسارة في الوزن.

التأثيرات الشائعة (يمكن أن تصيب شخصًا على الأكثر من أصل 10):

- داء المبيضات المفوي (مرض القلاع)
- تجفاف
- دوار
- انخفاض في ضفت الدم؛ تسارع دقات القلب أو عدم انتظامها
- قصور قلبي
- التهاب المريء
- تجفاف في الفم
- سمية أو ألم عند البلع
- نزف
- ارتفاع انتيمات الكبد (وياتالي الحاجة إلى إجراء تحوصات دم منتظمة).
- التأثيرات غير الشائعة (يمكن أن تصيب شخصًا على الأقل من أصل 100):
- إغماء
- ارتکاسات جلدية في موقع الحقن، التهاب الوريد أو تورم
- التهاب المفاصل، المعن القيق؛ ثقب مموي
- خثرات دم.

التأثيرات غير المعرفة معدل الحصول:
• مرض الرئة الخلالي (التهاب في الرئتين بسبب سعال وسعوبات في التنفس. يمكن أن يحصل التهاب الرئتين أيضاً عندما يستعمل الملاج بالدوسيتاكسيل مع علاج بالأشعة)

جرعة من 140 مل من الدوسيتاكسيل، 7 مل من ركازة دوسيتاكسيل لتحضير محلول للتسريب.

• إسحب بطريقة تطهيرية الكمية المطلوبة من الركازة لتحضير محلول للتسريب بواسطة محنة مناسبة فيها معيار مزدوجة بآية 21 ج.

في قارورة تاكسوتير 80 مل/4 مل بليغ تركيز الدوسيتاكسيل 20 مل/4 مل.

• ثم احقن بعقة واحدة (مرة واحدة) في داخل كيس أو قارورة تسريب من 250 مل تحتوي إماً على محلول غلوكون 5% أو على محلول كلوريد الصوديوم 9 مل/4 مل (0.9%) للتسريب. في حال كان من المطلوب تسريب جرعة أكبر من 190 مل من الدوسيتاكسيل، استعمل جمًّا أكبر من ناقل التسريب كي لا يتم خطأ تركيز 0.74 مل/مل من الدوسيتاكسيل.

• امزج محتوى كيس أو قارورة التسريب بدوبياً عبر الدوران اليدوي. كل قارورة مخصصة لاستعمال واحد فقط ويجب استعمالها بعد فتحها مباشرةً. في حال عدم الاستعمال الفوري، تكون أوقات وظروف الحفظ قيد الاستعمال من مستعمل. قد يكون من الصعب استعمال الدوسيتاكسيل وتغييرها. لذا يُنصح باستعمال قفازات. أكثر من قارورة واحدة من الركازة لتحضير محلول للتسريب للحصول على الجرعة الموصوفة للمريض. مثلاً، تتطابق توصيات لاستعمال آمن:

الدوسيتاكسيل هو دواء مضاد للسرطان وكما مع أي مركبات يتحمل أن تكون سامة، يجب اعتماد المطرد عند لاستعمال الدوسيتاكسيل وتغييرها. لذا يُنصح باستعمال قفازات. في حال لمست ركازة تاكسوتير أو محلول التسريب الجلد، يجب على الفور غسل الجلد جيداً بالصابون والماء. وفي حال

نشرة دوائية : معلومات المستعمل TAXOTERE® 80 مل/4 مل، ركازة لتحضير محلول للتسريب دوسيتاكسيل

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بعناية قبل استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.
- احتفظ بهذه النشرة حتى تحتاج إلى قرائتها مجدداً.
- في حال كان لديك أي سوال آخر، اطلب المزيد من المعلومات عن طبيبك أو الصيدلي في المستشفى أو المرض.
- في حال شعرت بأى تأثير جانبى، أعلم الطبيب أو الصيدلي أو المذكور في هذه النشرة. راجع القسم 4.

ماذا تحتوي هذه النشرة:
1. ما هو تاكسوتير وما هي دواعي استعماله
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال تاكسوتير
3. كيف يستعمل تاكسوتير
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة
5. كيف يحفظ تاكسوتير
6. محتوى العلبة ومعلومات أخرى

1. ما هو تاكسوتير وما هي دواعي استعماله
دوسيتاكسيل هو مادة تدخل في تكوين تاكسوتير.
أدوية أخرى وتنطبق هذا أيضًا على أي تأثير جانبى غير المذكور في هذه النشرة.

الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلي في المستشفى إذا كنت تأخذ حالي أو أخذت مؤخرًا أي دواء آخر بما فيها تلك التي حصلت عليها بدون وصفة طبية، لأن تاكسوتير أو الدواء الآخر قد لا يعطي مفعوله كما يجب وقد تصبح أكثر عرضة للتعرض لتأثيرات جانبية.

الحمل والإرضاع والخصوبة
سوف يعطيك تاكسوتير عن طريق التسريب في أحد أوردةك إذا كنت تعاني من الإدeman على الكحول أو من الصرع أو من ضعف كيدي. راجع فيما يلي.

عدد مرات الاستعمال
يجب عليك تناول تاكسوتير مرة واحدة كل 3 أسابيع. يمكن أن يفترط طبيبك الجرعة وعدد مرات تناولك إياها حسب فحوصات دمك وحالتك العامة واستجابتك مع تاكسوتير. يشكل خاص الرجال أن تعلم طبيبك في حال تعرّضت لإسهال أو لقرحة في الفم أو لشعور بالخدер أو بالوخز أو بالتشنج أو لحمى وأن تعطيه تناول فحوصات دمك. فمن شأن هذه المعلومات أن تسمح له بالاتخاذ القرار بشأن ضرورة تغيير الجرعة أولاً.

إذا كان لديك أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي في المستشفى.
لا ينبغي لك الحمل خلال فترة العلاج بهذا الدواء وعليك استعمال وسيلة فعالة لمنع الحمل خلال فترة العلاج، لأن تاكسوتير قد يؤذي الجنين.
في حال حملت خلال فترة العلاج يجب عليك أن تعلم الطبيب على الفور لا ينتهي بك الإرضاع في خلال فترة علاجك بتاكسوتير.
إذا كنت رجلاً تعالج بتاكسوتير لا يهدرك الإنجاب خلال فترة العلاج وبعد سنتها أشهر كما يجب عليك السؤال عن كيفية حفظ المني قبل الملاج لأن الدوسيتاكسيل قد يؤثر على الخصوبة لدى الرجال.
قيادة السيارات واستعمال الآلات
لم يتم دراسة التأثيرات على القدرة على قيادة السيارات واستعمال الآلات.
يحتوي تاكسوتير على الإيثانول (الكحول)
يحتوي هذا الدواء على 50% (بالحجم) من الإيثانول الالاماني (الكحول)، أي لغاية 1.58 غ من الإيثانول الالامي في القارورة الواحدة، مما يعادل 40 مل من البيره أو 17 مل من النبيذ في القارورة الواحدة.
إنه مؤذن للذين يعانون من الإدeman على الكحول.
يجب أخذ هذا المحتوى بعين الاعتبار إذا كنت حاملاً أو مرضعة ولدي الأطفال وفهات المرض الذين لديهم خطير مرتفع مثل المرض الذين يعانون من اضطرابات في الكبد أو من داء الضرب.
يمكن أن يكون لكميّة الكحول في هذا الدواء تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي (قسم الجهاز العصبي الذي يتعتى على الدماغ والنخاع الشوكي).
قد تؤثر كمية الكحول في هذا الدواء على تأثيرات على المرضى الآخرين.
قد يكون لكميّة الكحول في هذا الدواء تأثير على قدرتك على القيادة أو على استعمال الآلات.
إذا كنت مصاباً بحساسية (فرط حساسية) ضد الدوسيتاكسيل أو ضد أحد المركبات الأخرى التي يحتوي على تاكسوتير.
إذا كنت مصاباً بحساسية (فرط حساسية) ضد كريات الدم البيضاء.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال تاكسوتير
لا ينتهي بك استعمال تاكسوتير
إذا كنت مصاباً بحساسية (فرط حساسية) ضد الدوسيتاكسيل أو ضد أحد المركبات الأخرى التي يحتوي على تاكسوتير.
إذا كان عدد كريات الدم البيضاء لديك منخفضاً جداً.